

Matematicko-fyzikálny časopis

Štefan Schwarz; Dorota Krajiňáková
O totálne nekomutatívnych pologrupách

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 9 (1959), No. 2, 92--100

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126728>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1959

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O TOTÁLNE NEKOMUTATÍVNYCH POLOGRUPÁCH

ŠTEFAN SCHWARZ a DOROTA KRAJŇÁKOVÁ, Bratislava

Pologrupou nazývame neprázdnu množinu elementov S , medzi ktorými je definované asociatívne násobenie.

Nech je $a \in S$. Ak v postupnosti

$$a, a^2, a^3, \dots$$

existuje len konečný počet rôznych elementov, hovoríme, že element a je konečného rádu. Ak každý element pologrupy S je konečného rádu, nazývame pologrupu periodickou. V takej pologrupe existuje ku každému $a \in S$ také číslo $\varrho = \varrho(a)$, že $a^\varrho = e$, kde e je idempotentom.

Štruktúra takýchto pologrúp je opísaná v práci [2]. Tu zhrnieme iba niektoré poznatky, ktoré budeme v ďalšom potrebovať.

Nech $E = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ je množina všetkých idempotentov $\in S$. Ak $a^\varrho = e_\alpha$, hovoríme, že element a patrí k idempotentu e_α . Množinu všetkých elementov patriacich k idempotentu e_α označíme znakom K_α . Pologrupa S dá sa potom písať ako súčet disjunktných množín $S = \sum_{\alpha \in A} K_\alpha$. Ku každému e_α existuje jediná maximálna grupa G_α , ktorá má e_α za jednotkový element. Zrejme je $G_\alpha \subseteq K_\alpha$. Pre každé $a \in K_\alpha$ je $ae_\alpha = e_\alpha a$. Ďalej je $K_\alpha e_\alpha = e_\alpha K_\alpha = G_\alpha$. Tie a len tie elementy $a \in K_\alpha$, ktoré splňujú rovnicu $ae_\alpha = e_\alpha a = a$, patria do G_α .

Ak S je komutatívna pologrupa, je každé K_α pologrupou. Ak S nie je komutatívne, nemusí byť každé K_α pologrupou (pozri [2] príklad na strane 10). Existujú však aj také typy nekomutatívnych pologrúp, v ktorých sú všetky K_α pologrupy. Túto vlastnosť majú napr. tzv. totálne nekomutatívne periodické pologrupy zavedené v práci [2] (pozri [2], veta 5).

Úlohou tejto práce je vyšetrovať štruktúru takýchto pologrúp.

I

Definícia. Nech S je periodická pologrupa, ktorá má aspoň dva idempotenty. Budeme hovoriť, že S je totálne nekomutatívna, ak pre každé dva idempotenty $e_\alpha \neq e_\beta$ platí $e_\alpha e_\beta \neq e_\beta e_\alpha$.

Takáto pologrupa nemôže mať zrejme nulový ani obojstranný jednotkový element. Lahko sa dokáže, že centrum takejto pologrupy je prázdne.

Súčin dvoch idempotentov nemusí byť idempotentom. Nasledujúca lemma hovorí niečo o prípade, ak to náhodou nastane.

Lemma 1. *Nech S je totálne nekomutatívna periodická pologrupa. Nech $e_\alpha \neq e_\beta$ a nech $e_\alpha e_\beta = e_\beta$; potom $e_\beta e_\alpha = e_\alpha$.*

Dôkaz. Z rovnosti $e_\alpha e_\beta = e_\beta$ vyplýva $e_\beta e_\alpha e_\beta = e_\beta$, ďalej $e_\beta e_\alpha e_\beta e_\alpha = e_\beta e_\alpha$, t. j. $(e_\beta e_\alpha)^2 = e_\beta e_\alpha$. Teda je aj $e_\beta e_\alpha$ idempotentom. Položme $e_\beta e_\alpha = e_\gamma$. Potom platí:

$$e_\gamma e_\alpha = (e_\beta e_\alpha) e_\alpha = e_\beta e_\alpha = e_\gamma,$$

$$e_\alpha e_\gamma = e_\alpha (e_\beta e_\alpha) = (e_\alpha e_\beta) e_\alpha = e_\gamma.$$

Zo vzťahu $e_\gamma e_\alpha = e_\alpha e_\gamma$ vyplýva vzhľadom na totálnu nekomutatívnosť $e_\gamma = e_\alpha$, č. b. t. d.

Veta 1. *Nech J je ľubovoľný obojstranný ideál totálne nekomutatívnej periodickej pologrupy S . Potom J obsahuje všetky idempotenty z S .*

Dôkaz. Nepriamo. Ak $S = J$, nemáme čo dokazovať. Predpokladajme, že $S - J$ je $\neq \emptyset$ a obsahuje idempotent e . Keďže J je samo periodickou pologrupou, obsahuje J aspoň jeden idempotent. Označme ho e_α . Potom je $ee_\alpha \in eJ \subseteq J$. Element ee_α nemusí byť idempotentom. Existuje však také ρ , že $(ee_\alpha)^\rho$ je nejaký idempotent e_β . Zrejme je $e_\beta \in J$ a $e_\beta \neq e$. Zo vzťahu $(ee_\alpha)^\rho = e_\beta$ vyplýva $ee_\beta = e_\beta$. Podľa lemy 1 je teda $e_\beta e = e$. Z toho vyplýva $e = e_\beta e \in J \subseteq J$, čo je v rozpore s predpokladom $e \in S - J$.

Poznámka. Predpoklad, že J je obojstranný ideál, je podstatný. Ak by sme predpokladali, že J je napr. iba pravý ideál, veta nie je pravdivá, ako ukazuje nasledujúci príklad.

Príklad 1. Nech $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ s touto multiplikačnou tabuľkou:

	a_1	a_2	a_3
a_1	a_2	a_2	a_2
a_2	a_2	a_2	a_2
a_3	a_3	a_3	a_3

Pologrupa S je zrejme totálne nekomutatívna, lebo $a_2 a_3 \neq a_3 a_2$. Množina $\{a_2\}$ je pravý ideál, neobsahuje však všetky idempotenty.

Prv, než pôjdeme ďalej, pripomenieme si: Ak nejaká pologrupa má minimálny obojstranný ideál, má ho len jeden. Periodická pologrupa nemusí mať však minimálny obojstranný ideál. To ukazuje nasledujúci príklad.

Príklad 2. Nech S je množina prirodzených čísel $S = \{1, 2, 3, \dots\}$, v ktorej je násobenie definované vzťahom $a \circ b = \max(a, b)$. Táto pologrupa je periodická, lebo každý element je sám idempotentom. Množina $J_n = \{n, n + 1, n + 2, \dots\}$ je (obojstranným) ideálom z S a takto dostaneme všetky ideály. Keďže $J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \dots$ je zrejmé, že neexistuje minimálny (obojstranný) ideál.

Ukážeme, že okolnosť vyložená v príklade 2 nemôže nastať u totálne nekomutatívnych periodických pologrúp.

Nech \mathfrak{S} je systém všetkých obojstranných ideálov z S . Systém \mathfrak{S} je neprázdny, lebo obsahuje aspoň S . Prenik N všetkých množín systému \mathfrak{S} je neprázdny, lebo podľa vety 1 obsahuje množinu E všetkých idempotentov z S . Množina N je zrejme minimálnym obojstranným ideálom z S . Dokázali sme:

Veta 2. *Totálne nekomutatívna periodická pologrupa má minimálny obojstranný ideál.*

Nech je $e_\alpha \in E$. Keďže $e_\alpha \in N$, obsahuje N aj maximálnu grupu G_α patriacu k e_α . Teda súčet všetkých maximálnych grúp leží v N . Tento výsledok možno podstatne spresniť. Ukážeme najprv, že Se_α je minimálny ľavý ideál z S . Nech L je ľubovoľný ľavý ideál z S , pre ktorý platí $L \subseteq Se_\alpha$. Keďže L je periodická pologrupa, má L idempotent e , ktorý sa dá písať v tvare $e = ue_\alpha$, $u \in S$. Teda $ee_\alpha = ue_\alpha e_\alpha = e$. Na základe lemy 1 je potom $e_\alpha e = e_\alpha$. Preto

$$L \subseteq Se_\alpha = Se_\alpha e \subset Se_\alpha L \subseteq L,$$

t. j. $L = Se_\alpha$. Množina Se_α nemá žiadny vlastný podideál z S , t. j. Se_α je minimálny ľavý ideál z S . Podobne sa dokáže, že $e_\alpha S$ je minimálny pravý ideál z S . Je známe, že v pologrupe, ktorá má minimálny pravý a minimálny ľavý ideál, je minimálny obojstranný ideál súčtom disjunktných izomorfných grúp. Pretože všetky maximálne grupy ležia v N , vyplýva odtiaľ:

Veta 3. *Všetky maximálne grupy totálne nekomutatívnej periodickej pologrupy sú navzájom izomorfné. Ich množinový súčet je minimálnym obojstranným ideálom N pologrupy S .*

Poznámka. Mohla by vzniknúť domnienka, že i všetky maximálne pologrupy K_α sú navzájom izomorfné. To nemusí byť pravda, ako ukazuje príklad 1. Tam sú maximálne pologrupy $K_1 = \{a_1, a_2\}$, $K_2 = \{a_3\}$; maximálne grupy sú $G_1 = \{a_2\}$, $G_2 = \{a_3\}$. Pologrupy K_1, K_2 nie sú zrejme izomorfné.

II

V tomto odseku budeme študovať maximálne obojstranné ideály pologrupy S .

Ideál $J \subset S$ nazývame maximálnym, ak $J \not\subseteq S$, ale neexistuje ideál J_1 , ktorý splňuje vzťah $J \not\subseteq J_1 \not\subseteq S$.

Periodická pologrupa nemusí mať vôbec žiadny maximálny obojstranný ideál. To ukazuje tento príklad.

Príklad 3. Nech S je množina všetkých prirodzených čísel $S = \{1, 2, 3, \dots\}$, v ktorej definujeme násobenie vzťahom $a \circ b = \min(a, b)$. Množina $J_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ je zrejme obojstranným ideálom z S a takto dostaneme každý obojstranný ideál našej pologrupy. Keďže $J_1 \subset J_2 \subset J_3 \subset \dots$, je zrejme, že neexistuje žiadny maximálny obojstranný ideál z S .

Na druhej strane môže mať pologrupa i nekonečne mnoho maximálnych (obojsstranných) ideálov. To ukazuje tento príklad.

Príklad 4. Nech S je množina dvojíc reálnych čísel

$$S = \{(a, a), (a, 0) \mid 0 \leq a \leq 1\}$$

a nech násobenie je definované vzťahom $(x, y) \cdot (u, v) = (x, 0)$. Idempotentami tejto pologrupy sú všetky dvojice $(a, 0)$, $0 \leq a \leq 1$. Je zrejmé totálne nekomutatívna, lebo pre každé dva idempotenty $e_\alpha, e_\beta \in S$ platí $e_\alpha e_\beta = e_\alpha$. Minimálnym obojsstranným ideálom je množina $N = \{(a, 0) \mid 0 \leq a \leq 1\}$. Maximálne pologrupy sú $K_a = \{(a, a), (a, 0)\}$. Každá množina $J_a = S - \{(a, a)\}$, $a \neq 0$, je zrejme maximálny (obojsstranný) ideál. Je ich nekonečne mnoho.

Kedykoľvek budeme v ďalšom hovoriť o maximálnom ideáli, budeme samozrejme predpokladať, že S má maximálny ideál.

Lemma 2. *Nech S je periodická totálne nekomutatívna pologrupa. Nech J je ľubovoľný maximálny obojsstranný ideál z S . Potom $S^2 \subseteq J$.*

Dôkaz. (Pozri analogicky Wallace—Koch [1], Theorem 2.) Položme $A = S - J$. Ukážme najprv, že $SaS \subseteq J$. Keby to tak nebolo, musel by existovať element a tak, že $SaS \cap A \neq \emptyset$. Pretože SaS je obojsstranný ideál, je aj $SaS + J$ obojsstranný ideál a keďže je väčší ako maximálny, je nevyhnutne $SaS + J = S$. Pretože $a \in S$ neleží v J , je $a \in SaS$. To znamená: existujú čísla $x, y \in S$ tak, že $a = xay$. Z toho vyplýva, že pre každé celé n je $a = x^na y^n$. Avšak y^n s vhodne voleným n je idempotent $y^n = e$. Keďže je podľa vety 1 $e \in J$, je $a = x^na y^n = x^na e \in x^na J \subseteq J$. To je spor s voľbou elementu a . Teda je $SaS \subseteq J$.

Z toho vyplýva ihneď: $S^3 \subseteq J$. Je totiž $S^3 = S(A + J)S = SAS + SJS \subseteq \subseteq J + J = J$. Dokážeme teraz $S^2 \subseteq J$. Predpokladajme $S^2 \not\subseteq J$. Keďže S^2 je obojsstranný ideál, je aj $S^2 + J$ obojsstranný ideál, ale keďže je väčší ako maximálny ideál J , je $S^2 + J = S$. Z toho dostávame $S^2 = S^3 + JS \subseteq \subseteq J + J = J$. To je v rozpore s predpokladom $S^2 \not\subseteq J$. Lemma 2 je dokázaná.

Poznámka. Pri dôkaze lemy 2 sme použili iba podmienku $E \subseteq J$, takže lemma 2 platí pre každú periodickú pologrupu a každý maximálny ideál obsahujúci všetky idempotenty.

Nech S je pologrupa, pre ktorú platí $S^2 \not\subseteq S$. Nech je $a \in S - S^2$. Potom je zrejmé, že $S - \{a\}$ je maximálny ideál z S . Vo všeobecnosti môžu, pravda, existovať aj maximálne ideály, ktoré nedostaneme takýmto spôsobom. Ak však S je totálne nekomutatívna periodická pologrupa, vyplýva z lemy 2, že každý maximálny ideál obsahuje S^2 . Ak ku S^2 pridáme ľubovoľnú podmnožinu z $S - S^2$, dostaneme zrejme opäť obojsstranný ideál. Aby sme dostali maximálny ideál, treba pridať všetky elementy s výnimkou jedného jediného. Teda

Veta 4. *Nech S je totálne nekomutatívna periodická pologrupa, pre ktorú platí $S^2 \subsetneq S$. Potom každý maximálny obojstranný ideál má tvar $J_a = S - \{a\}$, kde a je vhodne volený prvok z $S - S^2$.*

V ďalšom sa budeme zaoberať prípadom $S = S^2$.

Veta 5. *Nech S je totálne nekomutatívna periodická pologrupa, pre ktorú platí $S = S^2$. Potom*

a) *bud' je $S = N$ (t. j. S je jednoduchá pologrupa),*

b) *alebo $S - N \neq \emptyset$ a súčasne S nemá vôbec žiadny maximálny obojstranný ideál (t. j. žiadna rastúca postupnosť vlastných ideálov z S nemôže mať posledný člen).*

Dôkaz. Predpokladajme, že je $N \neq S$. Keby existoval aspoň jeden maximálny ideál J , bolo by $N \subseteq J \subset S$, $J \neq S$. Podľa lemy 2 by však bolo $S^2 \subseteq J$, t. j. $S = J$, čo je v rozpore s predpokladom.

Pre konečné pologrupy platí:

Veta 6. *Nech S je konečná totálne nekomutatívna pologrupa. Potom $S = S^2$ platí vtedy a len vtedy, ak S je jednoduchá pologrupa (t. j. ak $S = N$).*

Dôkaz. α) Ak S je jednoduchá, nemôže platiť $S - S^2 \neq \emptyset$, lebo S^2 by bolo vlastným podideálom z S . Teda je $S = S^2$.

β) Ak S nie je jednoduchá, je $N \subset S$, $N \neq S$. Keďže S je konečná, existuje nevyhnutne taký maximálny ideál J , že platí $N \subseteq J \subset S$, $J \neq S$. Podľa lemy 2 je $S^2 \subseteq J$, teda $S^2 \neq S$, č. b. t. d.

Z vety 4 a 5 vyplýva tiež tento dôsledok:

Dôsledok: *Nech S je totálne nekomutatívna periodická pologrupa, ktorá nie je jednoduchá. Potom nutná a postačujúca podmienka, aby nemala žiadny maximálny ideál, je splnenie podmienky $S = S^2$.*

Poznámka. Nech $S = S^2$, S je periodická a $S \neq N$. Potom možno ľahko podať konštrukciu nekonečného rastúceho reťazca ideálov spomínaného vo vete 5, tvrdenie b.

Poznamenajme najprv: Ak $S = S^2$, $S \neq N$, potom pre žiadne $a \in S - N$ nemôže platiť $a \in SaS$. Keby totiž pre nejaké $a \in S - N$ platilo $a \in SaS$, existovali by dva také elementy $x, y \in S$, že $a = xay$. Potom by bolo tiež pre každé $n \geq 1$ $a = x^na y^n$. Keďže pre vhodne volené $n \geq 1$ je $y^n = e \in N$, mali by sme $a = x^nae \in x^naN \subseteq N$, čo je v rozpore s predpokladom. Špeciálne nemôže teda platiť pre žiadne $a \in S$ vzťah $SaS = S$.

Poznamenajme ďalej: Ku každému $a \in S$ existuje také $b \in S$, že $a \in Sbs$. Keby totiž pre každé $x \in S$ platilo $a \notin SxS$, platilo by tiež $a \notin S(\sum_{x \in S} x)S = S^3 = S$, čo dáva zrejmy rozpor.

Zvoľme teraz ľubovoľný element $a \in S - N$ a nájdime také $a_1 \in S$, aby platilo $a \in Sa_1S$. Keďže $N \subseteq Sa_1S$ a Sa_1S obsahuje element a neležiacy v N , je iste $N \neq Sa_1S$. Zvoľme ďalej a_2 tak, aby platilo $a_1 \in Sa_2S$. Potom je $Sa_1S \subseteq Sa_2S$ a keďže a_2 neleží v Sa_2S , je $N \subset Sa_1S \subset Sa_2S$, pričom na žiadnom

mieste neplatí znamienko rovnosti. Opakovaním tohto postupu dostávame reťazec $N \subset Sa_1S \subset Sa_2S \subset \dots \subset Sa_kS \subset \dots$. Z konštrukcie je zrejmé, že vzhľadom na vzťah $SbS \neq S$ nemôžeme takto po konečnom počte krokov vyčerpať celú pologrupu S .

Z vety 6 vyplýva:

Veta 7. *Nech S je konečná totálne nekomutatívna pologrupa. Nech N je jej minimálny obojstranný ideál. Potom existuje také celé číslo n , že $S^n = N$.*

Dôkaz. Uvažujme o tejto postupnosti ideálov z S

$$S \supseteq S^2 \supseteq S^3 \supseteq \dots \supseteq S^i \supseteq \dots \quad (1)$$

Každý z týchto ideálov obsahuje v sebe N a N je obojstranný ideál z S^i . Každá z pologrúp S^n má nejaký minimálny obojstranný ideál N_n . Zrejme je $N_n \subseteq N$. Podľa vety 1 obsahuje N_n v sebe všetky idempotenty, t. j. množinu E . Teda má N_n v sebe aj súčet všetkých grúp $\sum_{e \in E} G_e$. Preto je $N \subseteq N_n$. Teda N je minimálnym obojstranným ideálom každej z pologrúp S^i . Postupnosť (1) má však iba konečný počet rôznych členov, teda od istého indexu n začínajúc je $S^i = S^{i+1} = S^{i+2} = \dots$. Špeciálne je $S^n = S^{2n}$, t. j. $S^i = (S^i)^2$. Podľa vety 6 je $S^i = N$, č. b. t. d.

Na záver tohto odseku ukážeme na príklade, že okolnosť spomínaná vo vete 5b môže skutočne nastať.

Príklad 5. Uvažujme o nekonečnej postupnosti rôznych elementov $\{0, a_1, a_2, \dots\}$. Zostrojme komutatívnu pologrupu T vytvorenú týmito elementami, v ktorej 0 je nulovým elementom a v ktorej platia tieto relácie $a_1^2 = 0$, $a_i^2 = a_{i-1}$ (pre $i \geq 2$).

Je zrejmé, že každý element pologrupy T rôznych od nuly sa dá písať ako súčin konečného počtu elementov v tvare $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}$, kde bez ujmy na všeobecnosti môžeme predpokladať $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n$ a $n \geq 1$. Pre ďalšie účely poznamenajme, že z definičných relácií vyplývajú tieto vlastnosti pologrupy T : a) Ak $0 \leq k < i$ ($i = 1, 2, 3, \dots$), platí $a_i^{2^k} = a_{i-k}$; b) $a_i^{2^i} = 0$ pre $i = 1, 2, \dots$; c) Pologrupa T má jediný idempotent 0 a každý element $b \in T$ je nilpotentný, t. j. ku každému $b \in T$ existuje prirodzené číslo $\rho = \rho(b)$, že $b^\rho = 0$; d) Každý element z T dá sa písať v tvare súčinu dvoch iných, t. j. $T = T^2$; e) Ak $a_i \neq 0$, neobsahuje obojstranný ideál $a_i T$ element a_i .

Dokážeme teraz, že pologrupa T nemá žiaden maximálny (obojstranný) ideál. Dôkaz vykonáme nepriamo. Predpokladajme, že M je maximálny ideál z T . Potom existuje aspoň jeden taký element $b = a_{i_1} \dots a_{i_n}$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n$, $n \geq 1$), že $b \in T - M$. Uvažujme o ideáli $M + \{b\} + bT$. Tento ideál je väčší než M , teda sa rovná T . Dokážeme však, že vzťah $T = M + \{b\} + bT$ nie je možný. Na to stačí dokázať, že element a_{i_n+1} neleží v súčte $M + \{b\} + bT$. Najprv dokážeme, že a_{i_n+1} neleží v M . Zo vzťahu $a_{i_n+1} \in M$ by vyplývalo $a_{i_n+1}^2 = a_{i_n} \in M$, teda (keďže M je ideál) $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n} = b \in M$, čo

je v rozpore s predpokladom. Ďalej je zrejmé $b \neq a_{i_n+1}$. Nakoniec, keby bolo $a_{i_n+1} \in bT$, t. j. $a_{i_n+1} \in a_{i_1} \dots a_{i_n}T \subset a_{i_n}T$, bolo by aj $(a_{i_n+1})^2 \in a_{i_n}T$, t. j. $a_{i_n} \in a_{i_n}T$, čo nie je pravda.

Uvažujme ďalej o pologrupu $E = \{e_1, e_2\}$, v ktorej je násobenie definované vzťahom $e_i e_k = e_k$ ($i, k = 1, 2$).

Zostrojme nakoniec pologrupu $S = T \times E$, t. j. množinu dvojíc (b, e_i) , $b \in T$, $e_i \in E$ s násobením $(b, e_i)(c, e_k) = (bc, e_k)$.

S je zrejmé pologrupa, majúca práve dva idempotenty, totiž $(0, e_1)$, $(0, e_2)$. Je totálne nekomutatívna a platí $S^2 = S$. Každý obojstranný ideál tejto pologrupy je tvaru $J = \{(a, e_1) \cup (b, e_2) \mid a, b \in M\}$, kde M je ideál pologrupy T a naopak každá takáto množina je obojstranný ideál z S . Keďže T nemá maximálny ideál, nemá ani S žiadny maximálny obojstranný ideál. Naša pologrupa S splňuje predpoklady vety 5b. Pritom je $N = (0, e_1) \cup (0, e_2)$ a $S - N$ je skutočne neprázdne.

III

V tomto poslednom odseku dokážeme ešte dve vety o preniku všetkých maximálnych ideálov z S . Prvá z nich je dôsledkom viet 4 a 5.

Veta 8. *Nech S je periodická totálne nekomutatívna pologrupa. Nech S nie je jednoduchá. Nech \mathfrak{M} je prenik všetkých maximálnych ideálov z S . Potom $\mathfrak{M} = S^2$.*

Dôkaz. a) Ak $S = S^2$, vyplýva z vety 5, že S nemá vôbec žiadny maximálny ideál, preto v tomto prípade nemáme čo dokazovať.

b) Ak $S - S^2 \neq \emptyset$, vieme z vety 4, že všetky maximálne ideály sú tvaru $J_a = S - \{a\}$, $a \in S - S^2$. Teda je

$$\mathfrak{M} = \bigcap_{a \in S - S^2} J_a = \bigcap_{a \in S - S^2} \{S - \{a\}\} = S^2, \quad \text{č. b. t. d.}$$

Poznámka. Analógia vety 8 pre ľavé ideály nie je pravdivá. To znamená: Ak označíme za predpokladov vety 8 znakom \mathcal{L}' prenik všetkých maximálnych ľavých ideálov z S , potom nemusí platiť $\mathcal{L}' = S^2$. To ukazuje nasledujúci príklad (duálny k príkladu 1). Nech $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ je pologrupa s touto multiplikačnou tabuľkou (pozri hore):

	a_1	a_2	a_3
a_1	a_2	a_2	a_3
a_2	a_2	a_2	a_3
a_3	a_2	a_2	a_3

Existujú dva maximálne ľavé ideály. Sú to $\{a_1, a_2\}$, $\{a_2, a_3\}$. Pritom platí:

$$\mathcal{L}' = \{a_1, a_2\} \cap \{a_2, a_3\} = \{a_2\} \neq S^2 = \{a_2, a_3\}.$$

Veta analogická k vete 8 sa dá dokázať iba vtedy, ak o maximálnych ľavých ideáloch urobíme ďalší obmedzujúci predpoklad. To bude obsahom vety 9. Najprv dokážeme túto lemmu, ktorá je podobná lemme 2.

Lemma 3. *Nech S je periodická pologrupa. Nech E je množina všetkých idempotentov z S . Nech L je taký maximálny ľavý ideál, pre ktorý je $ES \subseteq L$. Potom $S^2 \subseteq L$.*

Dôkaz. Najprv ukážeme, že $S(S - L) \subseteq L$. Predpokladajme, že to tak nie je. Potom existuje taký element $a \in S - L$, že $Sa \cap (S - L) \neq \emptyset$. Pretože Sa je ľavý ideál, ktorý nie je celý obsažený v maximálnom ľavom ideáli L , je nevyhnutné $Sa + L = S$. Teda je $a \in Sa$. Z toho vyplýva, že existuje také x , že $a = xa$. Teda pre každé celé n je $a = x^n a$. Pre vhodné n je $x^n = e$, kde e je idempotent. Zo vzťahu $a = ea$ vyplýva $a \in ES \subseteq L$. To je v rozpore s predpokladom $a \in S - L$. Teda je

$$S^2 = S\{L + (S - L)\} = SL + S(S - L) \subseteq L + L = L,$$

t. j. $S^2 \subseteq L$, č. b. t. d.

Veta 9. *Nech S je periodická totálne nekomutatívna pologrupa. Nech S nie je jednoduchá pologrupa. Nech E je množina všetkých idempotentov z S . Nech \mathcal{Q} je prenik všetkých takých maximálnych ľavých ideálov z S , z ktorých každý obsahuje E . Potom $S^2 = \mathcal{Q}$.*

Dôkaz. Nech L je maximálny ideál, pre ktorý je $E \subseteq L$. Z toho vzťahu vyplýva $SE \subseteq SL$, t. j. $SE \subseteq L$. Množina SE sa dá písať ako súčet $SE = \sum_{e, a \in E} (Se_a)$. Pri dôkaze vety 3 sme videli, že každá z množín Se_a je minimálnym ľavým ideálom a ich súčet sa rovná N . Teda $SE = N$. Množina N sa však zároveň rovná súčtu všetkých minimálnych pravých ideálov z S , t. j. $ES = N$. Preto je $ES = SE$ a teda $ES \subseteq L$. Každý z maximálnych ľavých ideálov L splňuje teda predpoklady lemy 3. Preto je $S^2 \subseteq \mathcal{Q}$. Keďže predpokladáme existenciu aspoň jedného maximálneho ľavého ideálu, je $\mathcal{Q} \subsetneq S$, teda $S - S^2 \neq \emptyset$. Nech je $a \in S - S^2$ a $L_a = S - \{a\}$. Množina L_a je maximálnym ľavým ideálom z S . Keďže a nie je idempotentom, je $E \subseteq L_a$. Preto je $E = \bigcap_{a \in S - S^2} L_a \subseteq S^2$. Teda $S^2 \subseteq \mathcal{Q} \subseteq \bigcap_{a \in S - S^2} L_a \subseteq S^2$, t. j. $\mathcal{Q} = S^2$, č. b. t. d.

LITERATÚRA

- [1] Koch R. L., Wallace A. D., Maximal ideals in compact semigroups, Duke Math. J. 21 (1954), 681 - 686.
- [2] Schwarz Š., K teorii periodičeskich polugrupp, Čech. mat. žurnal 3 (78), (1953), 7 - 21.

Došlo 28. 10. 1958.

*Katedra matematiky
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave*

О ВПОЛНЕ НЕКОММУТАТИВНЫХ ПОЛУГРУППАХ

ШТЕФАН ШВАРЦ И ДОРОТА КРАЙНЯКОВА

Выводы

Периодическая полугруппа называется вполне некоммутативной, если она содержит более одного идемпотента и если для любых двух идемпотентов $e_\alpha \neq e_\beta$ имеет место $e_\alpha e_\beta \neq e_\beta e_\alpha$.

В дальнейшем S обозначает всегда вполне некоммутативную полугруппу и E множество всех идемпотентов $\in S$.

В статье доказываются следующие теоремы:

1. S содержит всегда минимальный двусторонний идеал N и имеет место соотношение $E \subset N$.

2. Если S конечная полугруппа, то существует натуральное число $n \geq 1$ такое, что $S^n = N$.

3. Если $S^2 \neq S$, то а) пересечением всех максимальных двусторонних идеалов из S является множество S^2 , б) множество S^2 является тоже пересечением всех максимальных левых идеалов содержащих E .

4. Если $S^2 = S$, то а) или $S = N$ (значит S простая полугруппа), б) или $S - N \neq \emptyset$ и S не имеет никакой максимальной двусторонний идеал. (Возможность этого второго случая показана на примере.)

ON TOTALLY NON-COMMUTATIVE SEMIGROUPS

By ŠTEFAN SCHWARZ and DOROTA KRAJŇÁKOVÁ

Summary

A torsion semigroup containing at least two idempotents is called totally non-commutative if for every couple of idempotents $e_\alpha \neq e_\beta$ we have $e_\alpha e_\beta \neq e_\beta e_\alpha$.

In the following S denotes always a totally non-commutative semigroup and E the set of all idempotents $\in S$.

The following results are proved:

1. S contains a minimal two-sided ideal N and $E \subset N$ holds.

2. If S is finite, then there is an integer $n \geq 1$ such that $S^n = N$ holds.

3. If $S^2 \neq S$, then а) the intersection of all maximal two-sided ideals of S is the set S^2 , б) the set S^2 is at the same time the intersection of all maximal left ideals containing E .

4. If $S^2 = S$, then а) either $S = N$ (hence S is a simple semigroup), б) or $S - N \neq \emptyset$ and S does not contain maximal two-sided ideals. (The possibility of this second case is proved by an example.)