

Vojtěch Tuček

Z geometrie trojúhelníka

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 65 (1936), No. 4, D129--D136

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/109336>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1936

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.




This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

ČLÁNKY A REFERÁTY.

Z geometrie trojúhelníka.

Vojtěch Tuček (Brno).

1. Označme vrcholy trojúhelníka $A_1A_2A_3$ znaky A_{n-1}, A_n, A_{n+1} , jeho strany a_{n-1}, a_n, a_{n+1} , vnitřní úhly $\alpha_{n-1}, \alpha_n, \alpha_{n+1}$, středy stran S_{n-1}, S_n, S_{n+1} a pod. dále; znakem (S, a) rozumějme kružnici



Obr. 1.

o středu S a poloměru a . Podle kosinové věty je $a_n^2 = a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - 2a_{n+1}a_{n-1} \cos \alpha_n$, což lze psát:

$$a_n^2 = a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - 2a_{n+1}a_{n-1} \cos \alpha_n = a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - 2a_{n-1}a_{n+1} \cos \alpha_n$$

kde $a_{n-1,n+1} = A_n P_{n+1}$ značí ortogonální průmět strany a_{n-1} do a_{n+1} (obr. 1). Součinný člen $a_{n+1}a_{n-1,n+1}$ anebo $a_{n-1}a_{n+1,n-1}$ značí, jak se lze snadno přesvědčiti, mocnost vrcholu A_n vzhledem k $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$; označme ji $M_{A_n} S_n$. Potom dostaneme relaci

$$2M_{A_n} S_n = a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - a_n^2. \quad (1)$$

a) Sečtème dvě rovnice z těchto tří rovnic; dostaneme

$$M_{A_{n+1}} S_{n+1} + M_{A_{n-1}} S_{n-1} = a_n^2, \quad (2)$$

což znamená,

že strana trojúhelníka je přepona pravoúhlého trojúhelníka, jehož odvěsny mají délky tečen, vedených z koncových bodů oné strany ke kružnicím opsaným nad dvěma druhými stranami jako průměry.

Je-li v trojúhelníku $\alpha_n = 90^\circ$, je $M_{A_{n+1}} S_{n+1} = a_{n-1}^2$, $M_{A_{n-1}} S_{n-1} = a_{n+1}^2$, a_n přepona, a vztah přejde ve větu Pythagorovu.

Je-li úhel při A_n tupý, je $M_{A_n} S_n < 0$; vrchol A_n leží uvnitř kružnice $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$ a místo tečny z A_n k této kružnici třeba vzítí polovici nejkratší tětivy vrcholem A_n .

Součet všech rovnic (1) dá vztah

$$2\Sigma M_{A_n} S_n = \Sigma a_n^2, \quad (3)$$

což znamená, že součet čtverců nad stranami trojúhelníka je roven součtu čtverců nad všemi šesti tečnami, které lze vésti z vrcholů trojúhelníka ke kružnicím opsanými nad protějšími stranami jako průměry.

b) Mocnosti vrcholů trojúhelníka vzhledem ke kružnicím $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$ lze vyjádřiti ještě několika jinými výrazy. Především jest, jak známo, délka těžnice $A_n S_n \equiv t_n = \frac{1}{2} \sqrt{2(a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2) - a_n^2}$. Potom mocnost $M_{A_n} S_n = t_n^2 - \frac{1}{4}a_n^2 [= \frac{1}{2}(a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - a_n^2)]$.

Jiný výraz (obr. 1) dostaneme, uvážíme-li, že v podobných trojúhelnících $A_n P_n A_{n-1}$ a $A_n V P_{n+1}$ (kde P_n jsou paty výšek v_n a V je průsečík výšek a $\overline{VA_n} = h_n$) jest

$$v_{n+1} : a_{n+1} = a_{n-1,n+1} : h_n,$$

z čehož plyne

$$a_{n+1}a_{n-1,n+1} = M_{A_n} S_n = v_n h_n.$$

To lze dokázati jinak planimetricky, sestrojíme-li opsané kružnice v tětivových čtyřúhelnících $VP_{n-1}A_{n+1}P_n$ a $VP_nA_{n-1}P_{n+1}$, neboť tu jest A_n střed mocnosti všech tří kružnic $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$, $(H_{n+1}, \frac{1}{2}h_{n+1})$, $(H_{n-1}, \frac{1}{2}h_{n-1})$, kde H_{n+1} , H_n , H_{n-1} jsou středy úseků resp. h_{n+1} , h_n , h_{n-1} , a jdou jim všechny tři chordály $A_{n+1}A_n$, $A_{n-1}A_n$, P_nA_n . Proto je netoliko $M_{A_n} S_n = a_{n+1}a_{n-1,n+1} = a_{n-1}a_{n+1,n-1}$, ale i $A_n P_n \cdot A_n V = v_n h_n$.

Uvážíme-li konečně podobné trojúhelníky $A_n P_{n+1} P_{n-1}$ a

a součtové vztahy zní

$$M_{A_{n+1}^F} + M_{A_{n-1}^F} = \frac{1}{2}a_n^2; \quad 4\Sigma M_{A_n^F} = \Sigma a_n^2. \quad (6)$$

Spojíme-li výsledek odst. 1 a 2, jest

$$\begin{aligned} 2(M_{A_{n+1}^F} + M_{A_{n-1}^F}) &= M_{A_{n+1}^{S_{n+1}}} + M_{A_{n-1}^{S_{n-1}}} = a_n^2, \\ 4 \Sigma M_{A_n^F} &= 2 \Sigma M_{A_n^{S_n}} = \Sigma a_n^2, \\ M_{A_n^F} : M_{A_n^{S_n}} &= 1 : 2, \end{aligned}$$

s příslušnými měřickými interpretacemi. Mezi jiným plyne z úměry, že úhlopříčka ve čtverci nad tečnou vedenou z vrcholu A_n ke kružnici $(F, \frac{1}{2}r)$ má stejnou délku $\sqrt{M_{A_n^F}} \cdot \sqrt{2}$ jako tečna z téhož vrcholu ke kružnici $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$. (Obr. 2.)

b) Mocnosti bodu V .

Vzhledem ke kružnici $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$ jest

$$M_V^{S_n} = d_n h_n, \quad (d_n = \overline{VP_n}),$$

a má tutéž hodnotu pro všechny tři hodnoty indexu n , poněvadž jsou výšky $A_n P_n$ chordály všech tří kružnic a V je střed mocnosti.

Stejně nezávisí na hodnotě indexu n mocnost bodu V vzhledem k Feuerbachově kružnici (obr. 2)

$$M_V^F = \overline{H_n V} \cdot \overline{VP_n} = \frac{1}{2}d_n h_n,$$

a vzhledem ke kružnici opsané

$$M_V^{V'} = \overline{A_n V} \cdot \overline{VU'_n} = 2h_n d_n,$$

kde U'_n je průsečík opsané kružnice (V', r) s výškou $A_n P_n$; pro souměrnost kružnic $(A'_n, r)^1$ a (V', r) vzhledem k $A_{n+1}A_{n-1}$ jest $\overline{A'_n S_n} = \overline{S_n V}$!

$d_n = VP_n = P_n U'_n$. Tak dostaneme ve spojení

$$M_V^{V'} = 2M_V^{S_n} = 4M_V^F = 2d_n h_n. \quad (7)$$

Je-li trojúhelník ostroúhlý, leží orthocentrum V uvnitř všech tří kružnic; jeho mocnosti vzhledem k nim jsou čtverce nejkratších púlětív, jdoucích bodem V . Poněvadž středy V' a F — kružnice opsané a Feuerbachovy — spolu s orthocentrem V leží na centrále, kterou jest zde Eulerova přímka, je nejkratší púlětiva ve jmenovaných dvou kružnicích kolmice k Eulerově přímce v bodě V . A poněvadž jest $\sqrt{M_V^{V'}} = 2\sqrt{M_V^F}$, $2\sqrt{M_V^{V'}} = 4\sqrt{M_V^F}$, jest nejkratší tětiva v opsané kružnici, vedená orthocentrem V kolmo k $V'FV$ — v trojúhelníku ostroúhlém — rozdělena Feuerbachovou kružnicí a bodem V na čtyři stejně dlouhé úseky.

¹⁾ A'_n je střed kružnice jdoucí body A_{n+1}, A_{n-1}, V a platí pro něj:

Je-li úhel při A_n tupý, leží V vně trojúhelníka i uvažovaných tří kružnic, a z bodu V jsou možné tečny k nim. Jejich čtverce jsou pak uvažované mocnosti; tečny z V ke kružnicím (V', r) a $(F, \frac{1}{2}r)$ mají délky v poměru 2 : 1 a v témž poměru jsou i poloměry obou kružnic. Spojnice $V'FV$ je společná centrála, a proto je orthocentrum v tupouhlém trojúhelníku vnější bod podobnosti obou kružnic; tečna vedená z bodu V k jedné, dotýká se i druhé.

c) Nyní můžeme jednoduchým způsobem určit délku Eulerovy úsečky $V'V = e$.

Především dostaneme z podobných trojúhelníků VP_nA_{n-1} a $A_{n+1}P_nA_n$ (obr. 2),

$$d_n : a_{n+1,n} = a_{n-1,n} : v_n, \quad h_{n-1} : a_{n+1,n} = a_{n-1} : v_n,$$

z čehož plyne napřed

$$d_n = \frac{(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)(a_n^2 + a_{n+1}^2 - a_{n-1}^2)}{8a_n\Delta},$$

použijeme-li vedle kosinové věty pro a_{n-1} také vztahu $4a_n^2v_n = 8a_n\Delta$, kde Δ je obsah trojúhelníka.

Potom dostaneme

$$h_n = \frac{a_n(a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - a_n^2)}{4\Delta}.$$

Pak vypočteme

$$M_{V'V} = 2d_n h_n = \frac{(a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - a_n^2)(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)(a_n^2 + a_{n+1}^2 - a_{n-1}^2)}{16\Delta^2}$$

Nahradíme-li trojčleny známými výrazy z kosinové věty a Δ výrazem $\frac{IIa_n}{4r}$, je $M_{V'V} = r^2 II 2 \cos \alpha_n = r^2 - e^2$ a dostaneme

$$e = r\sqrt{1 - 8 \cos \alpha_{n-1} \cos \alpha_n \cos \alpha_{n+1}}. \quad (8)$$

d) Mocnosti těžiště T .

S ohledem na vztahy $V'T = \frac{1}{3}e$, $TF = \frac{1}{3}e$, jest $M_{TV} = \frac{1}{9}e^2 - r^2$, $M_{TF} = \frac{1}{9}e^2 - \frac{1}{4}r^2$, tedy $M_{TV} = 4M_{TF}$ (obr. 2).

Poněvadž bod T leží vždycky uvnitř kružnic (V', r) i $(F, \frac{1}{2}r)$, a Eulerova přímka jest jejich centrála, určují obě kružnice na nejkratší tětivě bodem T , kolmé k $V'V$, čtyři stejně dlouhé úseky.

Poněvadž je $TS_n = \frac{1}{3}t_n$, jest mocnost vzhledem k $(S_n, \frac{1}{3}a_n)$ $M_{TS_n} = \frac{1}{9}t_n^2 - \frac{1}{9}a_n^2$, a dosadíme-li sem dříve uvedenou hodnotu

pro t_n , dostaneme

$$M_T^{S_n} = \frac{a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - 5a_n^2}{18}.$$

• Je-li v trojúhelníku $a_n > a_{n-1} > a_{n+1} (> 0)$, nemůže být $5a_n^2 \leq a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2$. Kdyby platila tato nerovnost, platila by, s ohledem na vztah $a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 = a_n^2 + 2a_{n+1}a_{n-1} \cos \alpha_n$ a známou větou: $|a + b| \leq |a| + |b|$, nerovnost $|\cos \alpha_n| \geq \frac{2a_n^2}{a_{n+1}a_{n-1}}$. Ale

z podmínky $a_n > a_{n-1} > a_{n+1}$ vychází $2a_n^2 > a_{n+1}a_{n-1}$, tedy $|\cos \alpha_n| > 1$, což není možné pro reálné úhly. Musí tedy být $5a_n^2 > a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2$ a $M_T^{S_n}$ jest záporné; leží tedy bod T uvnitř kružnice $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$, je-li a_n nejdelsí strana. Naproti tomu těžiště může ležeti uvnitř, vně nebo na kružnici sestrojené nad nejkratší stranou. Lze totiž podobně ukázat, že může být $M_T^{S_{n+1}} \leq 0$.

Mají-li mocnosti $M_T^{S_{n+1}}$ a $M_T^{S_{n-1}}$ stejná znaménka, jest

$$|M_T^{S_{n+1}}| + |M_T^{S_{n-1}}| = \left| \frac{2(a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2) - a_n^2}{9} \right| = \frac{4}{9} t_n^2; \quad (10)$$

mají-li tyto mocnosti pro všechny hodnoty indexu n stejná znaménka, jest

$$6 \sum |M_T^{S_n}| = \sum a_n^2, \quad (11)$$

což opět umožňuje jednoduchou měrickou interpretaci uvažíme-li, že $\sqrt{M_T^{S_n}}$ značí délku příslušné tečny, případně nejkratší púltětivy.

e) Mocnosti výškových pat P_n .

Vzhledem ke kružnici $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$ jest zřejmě (obr. 2)

$$M_{P_n}^{S_n} = a_{n+1,n} a_{n-1,n} = \frac{(a_{n+1}^2 + a_n^2 - a_{n-1}^2)(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)}{4a_n^2}.$$

Tutéž hodnotu mají netoliko mocnosti $M_{P_n}^{V'}$ a $M_{P_n}^{A'n}$, ale i $M_{P_n}^{A'n \pm 1}$, neboť jest v obr. 1


$$M_{P_n}^{A'n \pm 1} = v_n d_n = \frac{v_n(a_{n+1}^2 + a_n^2 - a_{n-1}^2)(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)}{8a_n \Delta}$$

jak plyne z c), z čehož dostaneme též výraz jako pro $M_{P_n}^{S_n}$, dosadíme-li $v_n = \frac{2\Delta}{a_n}$. Je tudíž v celku

$$\begin{aligned} |M_{P_n}^{S_n}| &= |M_{P_n}^{A'n}| = |M_{P_n}^{A'n \pm 1}| = |M_{P_n}^{V'}| = \\ &= \left| \frac{(a_{n+1}^2 + a_n^2 - a_{n-1}^2)(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)}{4a_n^2} \right| \end{aligned} \quad (12)$$

a druhá odmocnina z těchto výrazů určuje délku tečen případně nejkratších púltětiv vedených patou P_n v příslušných pěti kruž-

nicích. Sestrojíme-li tečny nebo nejkratší pŕltětiny (obr. 3), do-
staneme deset koncových bodů, které určují kružnici opsanou
ze středu P_n poloměrem



Obr. 3.

$$\sqrt{|M_{P_n} S_n|} = r_n^M =$$

$$= \frac{1}{2a_n} \sqrt{(a_{n+1}^2 + a_n^2 - a_{n-1}^2)(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)}.$$

Tímto způsobem dostaneme tři kružnice (P_n, r_n^M) a můžeme
ukázati, že jejich střed mocnosti jest v průsečíku výšek V , t. j.

že se jejich tři chordály protínají v průsečíku V (obr. 3). Uvážíme-li totiž, že $\sqrt{M_{P_n} S_n}$ je nejkratší pultětiva kružnice $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$ vedená patou P_n kolmo k $A_{n+1} A_{n-1}$, že tedy jejími koncovými body jde kružnice (P_n, r_n^M) , dostaneme, že výška $P_n A_n$ je chordála kružnic $(S_n, \frac{1}{2}a_n)$, (P_n, r_n^M) , a mocnost průsečíku V má vzhledem k těmto oběma kružnicím stejnou hodnotu, kterou jsme určili v b) t. j. $M_V S_n = d_n h_n =$

$$= \frac{(a_{n+1}^2 + a_{n-1}^2 - a_n^2)(a_{n-1}^2 + a_n^2 - a_{n+1}^2)(a_n^2 + a_{n+1}^2 - a_{n-1}^2)}{32\Delta^2},$$

to je však výraz, jehož hodnota nezávisí na indexu n a tedy mocnost orthocentra V vzhledem ke všem třem kružnicím (P_n, r_n^M) jest stejná.

Isotopy.*)

Rudolf Brdicka, Praha.

Daltonovým spisem *New System of Chemical Philosophy*, který vyšel r. 1808, byla zahájena moderní éra v chemii. V něm byly položeny vědecké základy k atomové teorii.

Základním postulátem Daltonovy atomové teorie byla existence nejmenších nedělitelných částecek nazvaných atomy, z nichž je složen každý prvek. Atomy téhož prvku mají podle Daltona stejné chemické vlastnosti a jsou stejně těžké; atomy různých prvků jsou vahově rozdílné. Tento postulát je dnes pouze zpoloviny správný. Dnešní pojem prvku se sice kryje s pojmem, který měl na mysli Dalton — že totiž prvek je látka, která má konstantní chemické vlastnosti a již nelze chemicky rozdělit na další komponenty — ale postulát o stejné váze atomů téhož prvku byl přímými důkazy vyvrácen.

Je zajímavo sledovati vývoj názorů na tento problém, než se dospělo k jeho definitivnímu rozřešení.

Daltonův postulát, že vahový poměr, ve kterém se prvky slučují odpovídá poměru vah jejich atomů, obrátil na počátku XIX. stol. zřetel chemiků ke stanovení atomových vah, v nichž byla spatřována fundamentální atomová konstanta. Podle prvních hrubších stanovení byly atomové váhy celé řady prvků přibližně celistvými čísly a to vedlo anglického lékaře Prouta (1815) k vyslovení hypotézy, že veškeré atomy jsou vlastně polymery vodíku. Přesná kontrola atomových vah, kterou provedl ve svých klasických pracích německý chemik Stas, způsobila zavržení této

*) Předneseno na I. sjezdu pro středoškolskou pedagogiku a didaktiku v Praze 1936.