

# Matematicko-fyzikálny zborník

---

Václav Medek

Zobrazenie niektorých nelineárnych systémov kužeľosečiek

*Matematicko-fyzikálny zborník*, Vol. 1 (1951), No. 2,3,4, 59--67

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126370>

## Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1951

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

VÁCLAV MEDEK

## ZOBRAZENIE NIEKTORÝCH NELINEÁRNYCH SYSTÉMOV KUŽELOSEČIEK

Bodové kuželošečky roviny sa dajú jednojednoznačne zobrazit' na Body lineárneho päťrozmerného priestoru  $S_5$  (aby som rozlíšil body roviny kuželošečiek od Bodov a jednorozmerných útvarov priestoru  $S_5$ , budem tieto označovať veľkými začiatočnými písmenami). Toto zobrazenie má tieto vlastnosti (porov. Bertini, *Einführung in die projektive Geometrie mehrdimensionaler Räume*):

1. Lineárne  $n$ -mocné systémy kuželošečiek sa zobrazujú na lineárne  $n$ -rozmerné priestory  $S_n$  priestoru  $S_5$ . Pritom vzťah medzi kuželošečkami sväzku a medzi Bodmi Priamky, ktorá je obrazom tohoto sväzku, je projektívny.

2. Degenerované kuželošečky sa zobrazujú na Body nadplochy 3. stupňa  $M_4^3$ , pričom kuželošečky degenerujúce v dvojnásobne počítanú priamku sa zobrazujú na Body Veroneseho plochy  $F_2^4$ , ktorá je dvojnásobným útvarom nadplochy  $M_4^3$ .

3. Nadplocha  $M_4^3$  obsahuje dva druhy rovín. Body rovín 1. druhu sú obrazy kuželošečiek degenerujúcich vo dve priamky, z ktorých jedna je všetkým spoločná. Body rovín 2. druhu sú obrazy kuželošečiek, ktoré degenerujú vo dve priamky o spoločnom priesečníku.

4. Lineárny trojmocný systém kuželošečiek definovaný pólom a polárou, ktorá ním neprechádza, je reprezentovaný lineárnym trojrozmerným priestorom 1. druhu  $S_3$ , ktorý je charakterizovaný tým, že má s plochou  $F_3^4$  spoločnú Kuželošečku a ešte jeden Bod, ktorý na nej neleží. Kuželošečky dotýkajúce sa danej priamky v pevnom bode zobrazujú sa na lineárny trojrozmerný priestor 2. druhu, ktorý má s plochou  $F_2^4$  spoločnú Kuželošečku. Podobne vzťah lineárneho  $n$ -rozmerného priestoru  $S_n$  k ploche  $F_2^4$  charakterizuje vlastnosti  $n$ -mocného lineárneho systému kuželošečiek ním reprezentovaného.

Účelom tejto práce je odvodiť niektoré vety o zobrazení nelineárnych systémov kuželosečiek.

Veta 1. *Všetky kuželosečky, pre ktoré priamky  $tt'$  sú párom konjugovaných polár, sa zobrazujú na Body nadplochy 2. stupňa  $T_4^2$ , ktorú tvoria priestory  $S_3$  prechádzajúce jednou Priamkou. Nadplocha  $T_4^2$  obsahuje plochu  $F_2^4$ .*

*Dôkaz:* Každý sväzok kuželosečiek  $\Sigma_1$  obsahuje dve kuželosečky, pre ktoré sú priamky  $tt'$  párom konjugovaných polár. Ak obsahuje viac ako dve kuželosečky vyhovujúce tejto požiadavke, potom vyhovujú všetky a jedna z priamok  $tt'$  musí splyvať s jednou stranou spoločného polárneho trojuholníka všetkých kuželosečiek sväzku. Nech teraz všetky kuželosečky majúce pár priamok  $tt'$  za pár konjugovaných polár zobrazia sa na istú množinu Bodov  $M$ . Keďže sväzky kuželosečiek sa zobrazujú na Priamky, vyplýva z predchádzajúceho, že množina  $M$  musí byť nadplochou 2. stupňa  $T_4^2$ .

Obraz každej kuželosečky degenerujúcej v dvojnásobne počítanú priamku musí ležať na nadploche  $T_4^2$ , pretože každý pár priamok tvorí pár konjugovaných polár vzhľadom na každú kuželosečku degenerujúcu v dvojnásobne počítanú priamku. Nadplocha  $T_4^2$  obsahuje teda plochu  $F_2^4$ .

Označme  $\Xi_4$  systém kuželosečiek určených párom konjugovaných polár  $tt'$ . Všetky kuželosečky systému  $\Xi_4$  dostaneme tak, že volíme napr. na priamke  $t$  rad bodov  ${}^xT$ . Každý bod  ${}^xT$  a priamka  $t$ , ako pól a polára, určujú systém kuželosečiek  ${}^x\Sigma_3'$ , ktoré všetky prislúchajú systému  $\Xi_4$ . Ak vyčerpáme všetky body priamky  $t$  vyčerpáme všetky kuželosečky systému  $\Xi_4$ , čo priamo vyplýva z definície konjugovaných polár. Všetky systémy  ${}^x\Sigma_3'$  majú spoločný sväzok degenerovaných kuželosečiek o spoločnom vrchole v priesečníku priamok  $tt'$ . Tým sú ale vyčerpané všetky možnosti kuželosečiek spoločných všetkým systémom  ${}^x\Sigma_3'$ , pretože žiadna iná kuželosečka nemôže mať pre tú istú poláru  $t'$  dva od seba rôzne póly  ${}^x_1T'$  a  ${}^x_2T'$ . Všetky kuželosečky systému  $\Xi_4$  dostaneme však aj tým spôsobom, že volíme póly  ${}^xT$  poláry  $t$  na priamke  $t'$ . Dostávame tak systémy  ${}^x\Sigma_3$ , ktoré majú spoločný ten istý sväzok degenerovaných kuželosečiek ako systémy  ${}^x\Sigma_3'$ . Dva čiarkované, alebo nečiarkované systémy nemajú okrem uvedeného sväzku spoločnú žiadnu inú kuželosečku. Čiarkovaný a nečiarkovaný systém majú spoločný celý systém  $\Sigma_3$  kuželosečiek určený polárnym trojuholníkom  ${}^xT{}^xT'{}^oT$ , kde  ${}^oT$  je priesečník polár  $tt'$ .

Nadplocha  $T_4^2$  obsahuje teda dva systémy priestorov  $S_3$ . Dva priestory tohože systému majú spoločnú iba Priamku  $S_1$ , spoločnú všetkým priestorom  $S_3$  na nadploche  $T_4^2$ . Dva priestory rôznych systémov majú spo-

očnú rovinu, ktorá pretína nadplochu  $M_4^3$  v troch Priamkach. Okrem dvoch priestorov 2. druhu, ktoré zobrazujú systémy  ${}^o\Sigma_3$  a  ${}^o\Sigma_3'$  všetky ostatné priestory sú 1. druhu.

Prenik nadplochy  $T_4^2$  s nadplochou  $M_4^3$  okrem plochy  $F_2^4$  tvorí ešte systém kvadratických kužeľov, ktorých vrcholy ležia na Priamke  ${}^iS_1$  a majú túto Priamku spoločnú.

Bod  $T$ , ktorý je obrazom kužeľosečky degenerovanej vo dve priamky  $tt'$  leží na nadploche  $T_4^2$  a to v rovine, v ktorej sa pretínajú dva priestory  ${}^oS_3$   ${}^oS_3'$  2. druhu.

Táto veta je len špeciálnym prípadom obcejšej vety.

**Veta 2.** *Všetky kužeľosečky, ktoré sú harmonicky vpísané danej kužeľosečke  $k$ , zobrazujú sa na Body istej kvadratickej nadplochy  $K_4^2$ , ktorá obsahuje plochu  $F_2^4$ .*

*Dôkaz.* Daná je kužeľosečka  $k$  a sväzok kužeľosečiek  $\Sigma_1$ , ktorý neobsahuje kužeľosečku  $k$ . Každému bodu  ${}^xK$  kužeľosečky  $k$  odpovedá vzhľadom na sväzok  $\Sigma_1$  jeden bod  ${}^xK'$ , harmonicky sdružený k bodu  ${}^xK$ . Body  ${}^xK'$  vyplnia krivku 4. stupňa, ktorá pretína kužeľosečku  $k$  v štyroch pároch konjugovaných pólův  ${}^iK^iK'$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) vzhľadom na sväzok  $\Sigma_1$ . Uvažujme o jednom takomto páre  ${}^1K^1K'$ . Spojnici týchto dvoch bodův odpovedá vzhľadom na sväzok  $\Sigma_1$  pólová kužeľosečka  ${}^1k$ , ktorá prechádza bodmi  ${}^1K^1K'$  a pretína teda kužeľosečku  $k$  ešte vo dvoch bodoch  ${}^x_1K$   ${}^x_1K$ . Polárnym trojuholníkom  ${}^x_1K^1K^1K'$  je určená jediná kužeľosečka  ${}^x_1k$  sväzku  $\Sigma_1$  a polárnym trojuholníkom  ${}^x_2K^1K^1K'$  ďalšia kužeľosečka  ${}^x_2k$ . Kužeľosečky  ${}^x_1k$   ${}^x_2k$  sú harmonicky vpísané kužeľosečke  $k$ . Výsledok je nezávislý na voľbe ktoréhokolvek zo štyroch párov pólův  ${}^iK^iK'$ , pretože potom by musela každá ďalšia kužeľosečka  ${}^x_ik$ , harmonicky vpísaná kužeľosečke  $k$  mať jeden bod  ${}^1K$  za vrchol polárneho trojuholníka. Ale sme zistili, že tejto podmienke vyhovujú iba dve kužeľosečky, preto žiadne iné kužeľosečky sväzku  $\Sigma_1$  nemôžu byť už harmonicky vpísané kužeľosečke  $k$ .

Keby existovaly tri kužeľosečky  ${}^x_1k$   ${}^x_2k$   ${}^x_3k$  sväzku  $\Sigma_1$  harmonicky vpísané kužeľosečke  $k$ , potom by pólová kužeľosečka spojnice  ${}^1K^1K'$  mala s kužeľosečkou  $k$  päť bodův spoločných a musela by s ňou splynúť. Potom musí byť kužeľosečka  $k$  opísaná spoločnému polárnemu trojuholníku kužeľosečiek sväzku  $\Sigma_1$  a každá kužeľosečka tohto sväzku je harmonicky vpísaná kužeľosečke  $k$ .

Každému Bodu  $K$ , obrazu kužeľosečky  $k$ , odpovedá teda taká množina Bodův, ktorá má s ľubovoľnou Priamkou spoločné dva Body, alebo ju obsahuje celú. Týmto podmienkam vyhovuje iba istá nadplocha  $K_4^2$ .

Táto nadplocha musí obsahovať i plochu  $F_2^4$ , pretože kuželosečka  $k$  je harmonicky opísaná každej kuželosečke degenerujúcej v dvojnásobne počítanú priamku.

Je zrejmé, ak kuželosečka  $k$  degeneruje vo dve priamky, dostávame z 2. vety vetu 1, ako špeciálny prípad; ak kuželosečka  $k$  degeneruje na dvojnásobne počítanú priamku, dostávame:

**Veta 3.** *Všetky kuželosečky, ktoré sa dotýkajú priamky  $t$ , zobrazujú sa na istú nadplochu 2. stupňa  $T_4^2$ , ktorá má singulárnu rovinu a tvoria ju priestory  $S_3$  2. druhu.*

*Dôkaz.* Všetky kuželosečky systému  $\Xi_4$  o spoločnej tangente  $t$  dostaneme tak, že volíme dotykové body  ${}^xT$  na tangente  $t$ ; tangenta  $t$  s dotykovým bodom  ${}^xT$  určuje kuželosečky systému  ${}^x\Sigma_3$ , ktoré sa zobrazia na priestor  ${}^xS_3$  2. druhu. Všetky tieto priestory určujú nadplochu  $T_4^2$ . Všetky systémy  ${}^x\Sigma_3$  majú spoločný systém  $\Sigma_2$  degenerovaných kuželosečiek o spoločnej priamke  $t$ . Všetky priestory  ${}^xS_3$  majú teda spoločnú rovinu 1. druhu. Bod  $T$ , ktorý je obrazom kuželosečky degenerujúcej v dvojnásobne počítanú priamku  $t$ , leží tiež na nadploche  $T_4^2$ . Nadplochy  $T_4^2$  a  $M_4^3$  majú okrem plochy  $F_2^4$  spoločný ešte systém rovín 2. druhu, ktoré sú spoločné priestorom  ${}^xS_3$  a nadploche  $M_4^3$ .

**Definícia 1.** *O troch pároch konjugovaných pólov  $PP'$ ,  $QQ'$  a  $RR'$  hovoríme, že tvoria sdruženú trojicu, ak všetky body sú navzájom rôzne a  $R \equiv (PQ' \times P'Q)$ ,  $R' \equiv (PQ \times P'Q')$ .*

**Veta 4.** *Kuželosečky systému  $S$ , ktoré majú spoločné tri páry konjugovaných pólov  $PP'$ ,  $QQ'$ ,  $RR'$ , ktoré netvoria sdruženú trojicu a pár konjugovaných polár  $tt'$ , zobrazujú sa na Kuželosečku, ležiacu na nadploche  $T_4^2$ .*

*Dôkaz.* Všetky obrazy kuželosečiek, ktoré majú spoločný pár konjugovaných polár, ležia na nadploche  $T_4^2$ . Všetky obrazy kuželosečiek o spoločných pároch konjugovaných pólov  $PP'$ ,  $QQ'$  a  $RR'$  ležia v istej rovine  $S_2$ . Prenik roviny  $S_2$  s nadplochou  $T_4^2$  je Kuželosečka, ktorej Body sú obrazy kuželosečiek systému  $S$ .

Predpokladajme, že rovina  $S_2$  neleží ani v jednom z priestorov  ${}^xS_3$   ${}^xS_3'$  tvoriacich nadplochu  $T_4^2$  a nemá ani s jedným z nich spoločnú Priamku. Tento prípad by mohol nastať len vtedy, ak by sa páry konjugovaných pólov  $PP'$ ,  $QQ'$ ,  $RR'$  premietaly z priesečníka priamok  $tt'$  jednou involúciou. Potom môže mať rovina  $S_2$  s každým z priestorov  ${}^xS_3$  spoločný iba jeden Bod  ${}^xS_0$ , z ktorých ani jeden neleží na Priamke  ${}^xS_1$ . Bodom  ${}^xS_0$  a Priamkou  ${}^xS_1$  je určená rovina, ktorou prechádza jediný priestor  $S_3'$  a označíme ho  ${}^xS_3'$ . Dostávame tak jednojednoznačnú príbuznosť

priestorov  ${}^2S_3$   ${}^3S_3'$ , ktorej odpovedá jednojednoznačná príbuznosť pólov  ${}^2T$   ${}^3T'$  na priamkach  $t't'$ . Z toho vyplýva, že poláry pólu  ${}^2T$  vzhľadom na kuželosečky systému  $S$  obaľujú kuželosečku, ktorá sa dotýka priamok  $tt'$ .

*Poznámka.* Zaujímavým spôsobom dostaneme kuželosečky, ktoré sa zobrazujú na ľubovoľnú Kuželosečku v  $S_5$ . Pretože vieme, že každou Kuželosečkou môžeme položiť zborbenú, ale nedegenerovanú plochu 2. stupňa, môžeme považovať Kuželosečky za rezy týchto plôch. Zvoľme dva mimobežné rady Bodov  ${}^1S_1$   ${}^2S_1$  a určíme projektívny vzťah medzi Bodmi Priamky  ${}^1S_1$  a  ${}^2S_1$ . Spojnice odpovedajúcich si Bodov vyplnia regulus, ktorý leží v priestore  $S_3$  určenom Mimobežkami  ${}^1S_1$   ${}^2S_1$ . Priamkam  ${}^1S_1$   ${}^2S_1$  odpovedajú sväzky  ${}^1\Sigma_1$   ${}^2\Sigma_1$ , v ktorých sú si kuželosečky navzájom projektívne priradené. Nech kuželosečke  ${}^1k_x$  odpovedá kuželosečka  ${}^2k_x$ . Na Body regulu sa zobrazia potom kuželosečky všetkých sväzkov určených vždy kuželosečkami  ${}^1k_x$   ${}^2k_x$ . Pritom je dôležité, že všetky takto skonštruované kuželosečky patria systému  $\Sigma_3$ . Ak teraz určíme nejakú ľubovoľnú ďalšiu lineárnu podmienku pre kuželosečky systému  $\Sigma_3$ , dostávame v každom zo sväzkov určených kuželosečkami  ${}^1k_x$   ${}^2k_x$  vždy jednu kuželosečku. Všetky tieto kuželosečky sa zobrazujú na Kuželosečku v  $S_5$ .

*Definícia 2.* Obálke polár ľubovoľného pólu vzhľadom na všetky kuželosečky systému  $S$  budeme hovoriť polárna krivka tohto pólu.

*Veta 5.* Ak sa kuželosečky systému  $S$  zobrazujú na Krivku  $n$ -tého stupňa, potom polárna krivka ľubovoľného pólu vzhľadom na kuželosečky systému  $S$  je  $n$ -tej triedy.

*Dôkaz.* Pól  $P$  a polára  $p$  je definovaná priestorom  $S_3$  1. druhu, ktorý pretína plochu  $F_2^4$  v Kuželosečke  $K_1^2$  a ešte v jednom Bode. Ak necháme pól  $P$  pevný a poláru  $p$  meníme, dostávame síce rôzne priestory  $S_3$  1. druhu, ale všetky majú spoločnú Kuželosečku  $K_1^2$  a aj celú rovinu 2. druhu  $S_2$ , ktorá obsahuje Kuželosečku  $K_1^2$ . Nech teraz kuželosečky systému  $S$  sa zobrazia na Krivku  $L_1^n$ . Každý Bod  ${}^2L$  na Krivke  $L_1^n$  spolu s rovinou  $S_2$  určujú priestor  ${}^2S_3$ , ktorý vlastne reprezentuje poláru  ${}^2p$  pólu  $P$  vzhľadom na kuželosečku  ${}^2l$  systému  $S$ . Keď zostrojíme všetky priestory  ${}^2S_3$ , vyplnia nám nadplochu  $K_4^n$ . Že nadplocha  $K_4^n$  je naozaj stupňa  $n$  zistíme tak, že ľubovoľnou Priamkou  $S_1$  a rovinou  $S_2$  určíme nadrovinu  $S_4$ , ktorá pretne Krivku  $L_1^n$  v  $n$  Bodoch. Zvoľme teraz k pólu  $P$  ľubovoľný konjugovaný pól  $P'$ . Sostrojme ďalej ľubovoľný sväzok kuželosečiek  $\Sigma_1$ , ktorý má pár bodov  $PP'$  za pár konjugovaných pólov. V tomto sväzku existuje  $n$  kuželosečiek, ktoré majú spoločné poláry s  $n$ , prípadne s viacerými kuželosečkami systému  $S$  a bodom  $P'$  prechádza teda  $n$  polár pólu  $P$ . Pretože bod  $P$  je pevný

a bod  $P'$  ľubovoľne volený, prechádza každým bodom  $n$  tangent k polárnej krivke pólu  $P$  vzhľadom na kuželosečky systému  $S$ .

Ak Krivka  $K_1^n$  sa rozpadá v niekoľko Kriviek  $K_1^{n_1} K_1^{n_2} \dots K_1^{n_m}$ , kde

$$n_1 + n_2 + \dots + n_m = n,$$

potom aj polárna krivka pólu  $P$  zrejme sa rozpadá v  $m$  kriviek tried  $n_1, n_2, \dots, n_m$ .

*Poznámka.* Z tejto vety hneď vyplýva, že polárna krivka ľubovoľného bodu vzhľadom na kuželosečky systému  $S$  ( $PP', QQ', RR', tt'$ ), t. j. kuželosečky, ktoré majú spoločné páry konjugovaných pólův  $PP', QQ', RR'$  a pár konjugovaných polár  $tt'$ , je druhej triedy, teda kuželosečka.

*Definícia 3.* Ak systém kuželosečiek  $S$  sa zobrazuje na Krivku  $K_1^n$ , hovoríme, že systém  $S$  je stupňa  $n$ .

*Veta 6.* Najobecnější kvadratický systém kuželosečiek je systém kuželosečiek popísaný v poznámke k 4. vete.

*Dôkaz* priamo vyplýva z toho, že tam udaná Kuželosečka  $K_1^2$  bola volená v priestore  $S_5$  celkom ľubovoľne.

V súvislosti s kvadratickými systémami kuželosečiek môžeme uviesť túto vetu.

*Veta 7.* Každým Bodom  $T$  na ploche  $F_2^4$  prechádza systém Kuželosečiek, ktoré okrem Bodu  $T$  nemajú žiadcn ďalší Bod spoločný a vyplnia celú plochu  $F_2^4$ .

*Dôkaz:* Nadplocha  $T_4^2$ , na ktorej ležia obrazy všetkých kuželosečiek dotýkajúcich se priamky  $t$ , obsahuje i plochu  $F_2^4$ . Singulárna rovina nadplochy  $T_4^2$  má s plochou  $F_2^4$  spoločný Bod  $T$ . Každý priestor  ${}^xS_3$  nadplochy  $T_4^2$  má s plochou  $F_2^4$  spoločnú Kuželosečku  ${}^xK_1^2$ , ktorá prechádza Bodom  $T$ . Pretože nadplochu tvoria všetky priestory  ${}^xS_3$ , musia Kuželosečky  ${}^xK_1^2$  vyplniť plochu  $F_2^4$ .

*Poznámka.* Ak namiesto uvedenej nadplochy  $T_4^2$  uvažujeme nadplochu  $T_4^2$ , na ktorú sa zobrazujú kuželosečky, ktoré majú spoločný pár konjugovaných polár  $tt'$ , dostávame podobnú vetu: Každými dvoma bodmi  $TT'$  na ploche  $F_2^4$  prechádzajú dva systémy Kuželosečiek, ktoré vyplnia celú plochu  $F_2^4$ . Dve Kuželosečky tohože systému majú spoločné iba Body  $TT'$ , dve Kuželosečky rôznych systémův majú okrem Bodův  $TT'$  spoločný ešte jeden ďalší Bod.

*Veta 8.* Dve nadplochy  $T_4^2 U_4^2$  sa pretínajú vo variéte  $K_3^4$ , ktorú tvorí systém kvadratických zborných plůch  $K_2^2$ . Variétou  $K_3^4$  je obecně určená ešte jedna nadplocha  $V_4^2$ .

*Dôkaz.* Uvažujme jeden systém priestorov  ${}^xS_3$  na nadploche  $T_4^2$ . Každý priestor  ${}^xS_3$  tohoto systému pretína nadplochu  $U_4^2$  v zbertenej kvadratickej ploche  ${}^xK_2^2$ . Keď vyčerpáme všetky priestory  ${}^xS_3$ , dostaneme všetky plochy  ${}^xK_2^2$ , ktoré vytvoria variétu  $K_3^4$ . Variéta  $K_3^4$  musí obsahovať plochu  $F_2^4$ , pretože táto plocha je spoločná nadplochám  $T_4^2 U_4^2$ . Nadplochy  $T_4^2 U_4^2$  reprezentujú dva páry konjugovaných polár  $tt'$  a  $uu'$ . Obecne existuje ešte jeden pár konjugovaných polár  $vv'$ , ktorý s páriami  $tt'$  a  $uu'$  tvorí sdruženú trojicu párov konjugovaných polár. Všetky kužeľosečky, ktoré majú páry  $tt'$  a  $uu'$  za páry konjugovaných polár, majú i pár  $vv'$  za pár konjugovaných polár. Tento je reprezentovaný nadplochou  $V_4^2$ , ktorá tiež obsahuje plochu  $F_2^4$  a aj variétu  $K_3^4$ .

*Poznámka 1.* Dve nadplochy  ${}^1T_4^2 {}^2T_4^2$  reprezentujúce dva systémy kužeľosečiek dotýkajúcich sa tangent  ${}^1t^2t$  pretínajú sa vo variéte  $K_3^4$ , ktorá obsahuje plochu  $F_2^4$ . Túto variétu môžeme skonštruovať alebo ako prenik obidvoch nadplôch  ${}^1T_4^2 {}^2T_4^2$ , alebo tiež pomocou tejto úvahy: Všetky kužeľosečky dotýkajúce sa tangent  ${}^1t^2t$  dostaneme tiež tak, že uvažujeme o sväzkoch definovaných vždy degenerovanou kužeľosečkou  ${}^12k$ , složenou z tangent  ${}^1t^2t$  a ľubovoľnou kužeľosečkou degenerujúcou v dvojnásobne počítanú priamku. Čiže variéta  $K_3^4$  je kužeľ, ktorý dostaneme premietnutím plochy  $F_2^4$  z Bodu  ${}^12K$  na nadploche  $M_4^3$ . Je to vlastne len špeciálny prípad zobrazenia systému kužeľosečiek, dvojnásobne sa dotýkajúcich danej pravej kužeľosečky. Vtedy Bod  $K$  leží mimo nadplochy  $M_4^3$ .

*Poznámka 2.* Nadplocha  $T_4^2$  sa dá skonštruovať tiež takto: Uvažujme rovinu  $S_2$ , ktorá reprezentuje degenerované kužeľosečky rozpadajúce vždy v tangentu  $t$  a každú inú priamku roviny. V tejto rovine existuje Bod  $T$  ako obraz kužeľosečky degenerujúcej v dvojnásobne počítanú priamku  $t$ . Bodom  $T$  je daný v rovine  $S_2$  sväzok Priamok  ${}^xS_1$ . Každá Priamka  ${}^xS_1$  je obrazom sväzku kužeľosečiek, ktoré degenerujú v priamku  $t$  a ďalšiu priamku prechádzajúcu bodom  ${}^xT$  na priamke  $t$ . Bodom  $T$  na ploche  $F_2^4$  prechádza systém Kužeľosečiek. Tieto Kužeľosečky ležia v rovinách  ${}^xS_2$  prechádzajúcich Priamkami  ${}^xS_1$  roviny  $S_2$ . Každá rovina  ${}^xS_2$  s rovinou  $S_2$  určuje priestor  ${}^xS_3$ . Všetky priestory  ${}^xS_3$  vyplňujú nadkvadriku  $T_4^2$ .

Variétu  $K_3^4$  môžeme zostrojiť aj takto: Uvažujme nadkvadriku  $T_4^2 T_4^2$ : dostávame tak dve singulárne roviny  $S_2 S_2'$  a priestory  ${}^xS_3 {}^xS_3'$ , určené vždy rovinami  $S_2 S_2'$  a  ${}^xS_2 {}^xS_2'$ . Roviny  $S_2 S_2'$  a  ${}^xS_2 {}^xS_2'$  majú spoločný vždy jeden Bod. Preto ľubovoľný priestor  ${}^xS_3$  pretína ľubovoľný priestor  ${}^xS_3'$  v Priamke, ktorá prechádza priesečníkom rovín  $S_2 S_2'$



a preto priestor  ${}^xS_3$  pretína nadkvadriku  $T_4^{2'}$  v kvadratickom kuželi. Pretože jeho vrchol nie je závislý na voľbe priestoru  ${}^xS_3$ , pretínajú sa nadplochy  $T_4^2 T_4^{2'}$  v sústave kvadratických kužeľov, ktoré majú spoločný vrchol v priesečníku rovín  $S_2 S_2'$ .

Veta 9. *Systém kuželosečiek  $S (PP', QQ', tt', uu')$  sa zobrazuje na Krivku  $K_1^4$ , ktorá leží na istej kvadratickej zbertenej ploche  $K_2^2$ .*

*Dôkaz.* Všetky kuželosečky, ktoré majú spoločné dva páry konjugovaných polár  $tt'$  a  $uu'$ , sa zobrazujú na variétu  $K_3^4$  z predchádzajúcej vety. Všetky kuželosečky, ktoré majú spoločné dva páry konjugovaných póllov, sa zobrazujú na istý priestor  $S_3$ . Prenik priestoru  $S_3$  s variétou  $K_3^4$  môžeme dostať týmto spôsobom: Uvažujme systém priestorov  ${}^xS_3$  ako pri dôkaze predchádzajúcej vety. Priestor  $S_3$  má s každým z týchto priestorov spoločnú Priamku  ${}^xS_1$  a na nej dva Body  ${}^xS_o {}^xS_o'$  v priesečníkoch s kvadrikou  ${}^xK_2^2$ . Priamky  ${}^xS_1$  vytvoria regulus v priestore  $S_3$  a Body  ${}^xS_o {}^xS_o'$  Krivku  $K_1^4$  na tomto regulu. Keď nadplocha  $T_4^2$  obsahuje druhý systém priestorov  ${}^xS_3'$ , vytvoria Priamky  ${}^xS_1'$  druhý systém Priamok na kvadrike  $K_2^2$ .

Veta 10. *U systému  $S (P, Q, t, u)$  rozpadá sa Krivka  $K_1^4$  vo dve Kuželosečky.*

*Dôkaz.* Nájďme také dve Priamky  ${}^x_1S_1 {}^x_2S_1$ , na ktorých existuje vždy len jeden Bod  ${}^x_1S_o {}^x_2S_o$ . Priestory  ${}^xS_3$  reprezentujú kuželosečky dotýkajúce sa priamky  $t$  v bode  ${}^xT$ . Uvažujme bod  ${}^xT \equiv (t \cdot u)$ . Kuželosečka systému  $S$  prechádzajúca bodom  ${}^x_1T$  musí degenerovať, lebo má v tom bode dve rôzne tangenty  $t, u$ . Dalej musí prechádzať bodmi  $PQ$ . Taká je len jedna. Z toho vyplýva, že na Priamke  ${}^x_1S_1$  existuje len jeden Bod  ${}^x_1S_o$ . Ďalej uvažujme Bod  ${}^x_2T$ , v ktorom pretína spojnicu  $PQ$  tangentu  $t$ . Týmto bodom môže prechádzať tiež len degenerovaná kuželosečka systému  $S$ , lebo spojnicu  $PQ$  pretína túto kuželosečku v troch bodoch  ${}^x_2TPQ$ . A zas existuje taká len jedna. Čiže i na Priamke  ${}^x_2S_1$  existuje len jeden Bod  ${}^x_2S_o$ . Z toho ale vyplýva, že Krivka  $K_1^4$  na kvadrike  $K_2^2$  má dva dvojnité Body  ${}^x_1S_o {}^x_2S_o$ , teda sa rozpadá vo dve Kuželosečky  ${}^1K_1^2 {}^2K_1^2$ . Potom systém  $S (P, Q, t, u)$  sa rozpadá vo dva kvadratické systémy kuželosečiek.

Veta 11. *Tri nadplochy  $T_4^2 U_4^2 V_4^2$  pretínajú sa v ploche  $K_2^8$ , ktorá sa rozpadá v plochu  $F_2^4$  a plochu  $K_2^4$ . Obecne existuje celý systém plôch  ${}^xW_4^2$ , ktoré prechádzajú plochou  $K_2^8$ .*

*Dôkaz:* Nadplochy  $T_4^2 U_4^2$  sa pretínajú vo variéte  $K_3^4$ . Nadplocha  $V_4^2$  pretína variétu  $K_3^4$  v ploche  $K_2^8$ , ktorá musí obsahovať plochu  $F_2^4$ . Preto sa musí rozpadnúť v plochu  $F_2^4$  a v plochu  $K_2^4$ . Podľa 8. vety

k nadplochám  $T_4^2 U_4^2$  existuje obecne ešte jedna nadplocha  ${}^1W_4^2$ , ktorá má spoločný prenik s nadplochami  $T_4^2 U_4^2$ . Rôznymi kombináciami nadplôch  $T_4^2 U_4^2 V_4^2 {}^1W_4^2$  a nadplôch takto vzniklých dostávame systém nadplôch  ${}^2W_4^2$ , ktoré všetky majú spoločnú plochu  $K_2^8$ .

Priamym dôsledkom tejto vety je, že systém kužeľosečiek  $S$  ( $PP'$ ,  $tt'$ ,  $uu'$ ,  $vv'$ ) je, odhliadnuc od kužeľosečiek degenerujúcich v dvojnásobne počítané priamky prechádzajúce bodmi  $PP'$ , 4. stupňa. Polárna krivka ľubovoľného bodu sa rozpadá vo dva sväzky priamok o vrcholoch v bodoch  $PP'$  a v krivku 2. stupňa.

#### LITERATÚRA

- Bertini E., *Einführung in die projektive Geometrie mehrdimensionaler Räume*, Wien 1924.  
 Durell C. V., *Projective Geometry*, London 1945.  
 Dingeldey, *Kegelschnitte und Kegelschnittssysteme* (Encyklopädie der math. Wissenschaften, III, 2, 1).

#### ВЫВОДЫ

В статье рассматривается отображение конических сечений данной плоскости на точках пятимерного пространства. Сначала приведены основные свойства этого отображения. Затем рассматривается отображение четырехпараметрической квадратической системы конических сечений. В качестве примера приведено отображение системы конических сечений определенной тремя парами сопряженных поллюсов и одной парой сопряженных поляр. Главным результатом является 5 положение: Если конические сечения системы  $S$  изображаются на точках кривой  $n$ -ого порядка, то полярная кривая любой точки в отношении к коническим сечениям системы  $S$  является кривой  $n$ -ого класса. На основании этого положения составлена общая однопараметрическая квадратическая система конических сечений. Из остальных систем рассматриваются системы, принадлежащие двум или трем квадратическим четырехпараметрическим системам и удовлетворяют еще некоторым линейным условиям. Приведено также несколько конструкций многообразий, на которых эти системы отображаются.