

Mihail G. Tkachenko

О бикомпактах, представимых в виде объединения счётного числа левых подпространств. I.

Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, Vol. 20 (1979), No. 2, 361--379

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/105935>

Terms of use:

© Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, 1979

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

О БИКОМПАКТАХ, ПРЕДСТАВИМЫХ В ВИДЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЧЕТНОГО

ЧИСЛА ЛЕВЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ - I

М.Г. ТКАЧЕНКО

Abstract: Let X be compact and \mathcal{Y} be a countable family consisting of left subspaces of X such that $X = \bigcup \mathcal{Y}$. The technique necessary to prove that X is scattered and sequential, is developed.

Key words: Left and right (scattered) spaces, sequential and c -sequential spaces.

AMS: 54A25, 54D30

В настоящей работе рассматривается ситуация, когда бикомпакт X является объединением счетного семейства $\{M_i; i \in \omega\}$ своих левых (или правых) подпространств. В случае, когда все M_i -правые, легко доказывается, что бикомпакт X также будет правым (лемма 1). Более сильным результатом является теорема 1. Как лемма 1, так и теорема 1 существенно используются при изучении случая, когда подпространства M_i бикомпакта X являются левыми.

Основной в этой статье является теорема 2, доказательство которой технически наиболее сложно. Вместе с уже упомянутыми результатами эта теорема является ключом к доказательству теорем 3,4 и 5, которые представляются нам наиболее важными в этой работе (см. часть II.).

В 1977 году I. Juhász и Б. Шапировский независимо получили серию результатов, касающихся левых пространств. В частности, ими были доказаны следующие утверждения.

Пусть X - бикомпакт.

- 1) Если X - левый, то $t(X) \in \mathcal{K}_0$ (Шапировский, Juhász).
- 2) Если X - левый, то X - правый (Juhász, Шапировский).
- 3) Если X - левый, то X c -секвенциален (Шапировский).
- 4) Любое регулярное правое c -секвенциальное T_1 -пространство секвенциально (Шапировский).

Из (2), (3) и (4) вытекает (5)

- 5) Если X - левый, то X секвенциален (Juhász, Шапировский),

- 6) Регулярное левое счетно-компактное T_1 -пространство является бикомпактом (Juhász).

Утверждения (1), (2) и (5) доказаны в [1], а утверждение (6) сформулировано там без доказательства. Для полноты изложения в нашей работе приводятся принадлежащие Шапировскому доказательства утверждений (3) и (4).

Основные результаты настоящей статьи являются обобщением результатов, приведенных в пп. 1, 2, 3, 5 и 6.

Теперь - некоторые определения и обозначения.

Определение 1. Топологическое пространство X называется правым, если существует вполне упорядочение $<$ на X такое, что для каждой точки $x \in X$ правый луч $\{y \in X : x < y\}$ замкнут в X .

Нетрудно проверить, что пространство X - правое тогда и только тогда правое, когда в любом подпространстве $Y \subset X$ существует изолированная в Y точка. Такие пространства на-

знают также разреженными.

В дальнейшем используются оба термина.

Определение 2. Пространство X называется левым, если существует вполне упорядочение $<$ на X такое, что для каждой точки $x \in X$ левый луч $\{y \in X : y < x\}$ замкнут в X . Любое вполне упорядочение $<$ с таким свойством также называется левым.

Определение 3. Пространство X называется c -секвенциальным, если для любого замкнутого в X множества F и любой неизолированной в F точки x существует последовательность $N \subset F \setminus \{x\}$, сходящаяся к точке x .

Очевидно, любое секвенциальное пространство c -секвенциально.

Через $w(X)$, $t(X)$, $\chi(X)$, $\psi(X)$, $c(X)$ и $d(X)$ обозначаются вес, теснота, характер, псевдохарактер, число Суслина и плотность пространства X , соответственно.

Кардиналы отождествляются с соответствующими ординалами. Ординал считается множеством всех предшествующих ординалов. Особенно интенсивно эти соглашения используются при доказательстве теоремы 2.

Под пространством в дальнейшем всюду понимается регулярное T_1 -пространство.

Перейдем к изложению результатов. Сначала приведем доказательства утверждений (3) и (4).

Доказательство утверждения (3) (Шапировский). Пусть X - левый бикомпакт. Зафиксируем левое вполне упорядочение $<$ на X . Так как свойство пространства быть левым наследуется подпространствами, достаточно доказать, что к любой неизолированной в X точке p сходится последовательность из $X \setminus \{p\}$.

Итак, пусть $r \in [X \setminus \{r\}]$.

Положим $q = \min \{x \in X : r \in [X_x \setminus \{r\}]\}$, где $X_x = \{y \in X : y < x\}$ для каждой точки $x \in X$, а минимум в определении точки q берется относительно вполне упорядочения $<$. Мы утверждаем, что $\chi(r, X_q) = \aleph_0$. В самом деле, по пункту (1), $t(X) \leq \aleph_0$. Поэтому существует $M \subset X_q \setminus \{r\}$ такое, что $|M| \leq \aleph_0$ и $r \in [M]$.

Из определения точки q следует, что у нее нет предшественника относительно порядка $<$, а из определения множества M вытекает равенство $q = \sup M$. Поэтому $X_q = \cup \{X_x : x \in M\}$ и $X_q \setminus \{r\} = \cup \{X_x \setminus \{r\} : x \in M\}$. Но множество $X_x \setminus \{r\}$ замкнуто в X для любой точки $x \in M$, ибо точка r изолирована в X_x для каждой точки $x < q$ и $M \subset X_q$. Таким образом, точка r имеет тип $G_{\mathcal{C}}$ в пространстве X_q . Но X_q замкнуто в X и поэтому $\chi(r, X_q) = \aleph_0$. Существование сходящейся к r последовательности теперь следует из включения $r \in [X_q \setminus \{r\}]$.

Доказательство утверждения (4) (Шапировский).

Пусть X является разреженным s -секвенциальным пространством и $M \subset X$, $[M] \setminus M \neq \emptyset$. Зафиксируем на X правое вполне упорядочение $<$. Для каждого $x \in X$ положим $X_x = \{y \in X : y < x\}$.

Пусть r - минимальная в $[M] \setminus M$ точка (относительно вполне упорядочения $<$). Пусть $q = r + 1$ (то есть q является следующим за r элементом относительно вполне упорядочения $<$) и V - открытая окрестность точки r такая, что $[V] \subset X_q$. Положим $N = V \cap M$. Тогда $[N] \setminus N = \{r\}$. Таким образом, точка r неизолирована в замкнутом множестве $[N]$ и поэтому существует сходящаяся к точке r последова-

тельность $C \subset [N] \setminus \{r\} = N$. Однако, $N \subset M$, поэтому $C \subset M$.

Утверждение полностью доказано.

Лемма 1. Пусть пространство X , обладающее свойством Вэра, является объединением семейства $\{M_i : i \in \omega\}$ своих разреженных подпространств. Тогда X разрежено.

Доказательство. Достаточно доказать, что в X есть хотя бы одна изолированная точка. Так как X обладает свойством Вэра, существует $i \in \omega$ такой, что $\mathcal{O} = \text{Int}([M_i]) \neq \Lambda$. Положим $N = \mathcal{O} \cap M_i$. По определению, \mathcal{O} - открытое непустое подмножество в X , N - разреженное подпространство в X (ибо $N \subset M_i$) и N всюду плотно в \mathcal{O} . Поэтому в N есть изолированная точка r , которая будет изолирована в \mathcal{O} , ибо N всюду плотно в \mathcal{O} . Но \mathcal{O} открыто в X , поэтому r - изолированная в X точка.

Лемма доказана.

Лемма 1, очевидно, является усилением леммы 3.19 из [2].

Теорема 1. Пусть бикомпакт X является объединением цепи γ своих разреженных подпространств. Тогда X разрежен.

Доказательство. Как и в предыдущей лемме, достаточно доказать, что в X есть хотя бы одна изолированная точка. Предположим противное. Тогда стандартным образом построим непрерывное отображение $f: F \rightarrow C$ некоторого замкнутого в X множества F на канторово совершенное множество C (см. например, [3]). Так как X - бикомпакт, существует замкнутое в X множество $\phi \subset F$ такое, что $f(\phi) = C$ и $g = f|_{\phi}$ - неприводимо. Из неприводимости отображения g сразу следует, что в ϕ нет изолированных точек и что $d(\phi) = d(C) = \kappa_0$.

Положим $\mu = \{\phi \cap M : M \in \gamma\}$. Тогда семейство μ состоит из разреженных пространств и $\phi = \bigcup \mu$.

Положим $\tilde{\mu} = \{[N] : N \in \mu\}$. Поскольку семейство μ является цепью, то цепью является и семейство $\tilde{\mu}$. Далее, семейство $\tilde{\mu}$ состоит из замкнутых в ϕ множеств и $\phi = \bigcup \tilde{\mu}$, причем $d(\phi) = \aleph_0$, поэтому существует подсемейство $\lambda \subset \tilde{\mu}$ такое, что $|\lambda| \leq \aleph_0$ и $\phi = \bigcup \lambda$. Для каждого $P \in \lambda$ зафиксируем $N(P) \in \mu$ такое, что $P = [N(P)]$. Так как $|\lambda| \leq \aleph_0$ и бикompакт ϕ обладает свойством Вера, существует $P \in \lambda$ такое, что $\mathcal{O} = \text{Int}_{\phi}(P) \neq \emptyset$. Положим $M = \mathcal{O} \cap N(P)$.

Тогда M - правое (как подпространство правого пространства $N(P)$) пространство, всюду плотное в \mathcal{O} . Поэтому существует изолированная в M точка x , которая в силу плотности M в \mathcal{O} будет изолирована в \mathcal{O} , а в силу открытости \mathcal{O} в ϕ , будет изолирована и в ϕ .

Полученное противоречие завершает доказательство теоремы.

Вопрос 1. Верна ли предыдущая теорема для счетно-компактных пространств?

Можно показать, что утверждение предыдущей теоремы справедливо для регулярных счетно-компактных пространств X , удовлетворяющих неравенству $t_c(X) \leq \aleph_0$ x)

 $x) t_c(X) \leq \tau$, если для каждого замкнутого в X множества F и каждой точки $x \in F$, принадлежащей замыканию множества $F \setminus \{x\}$ существует подмножество $M \subset F \setminus \{x\}$ такое, что $|M| \leq \tau$ и $x \in [M]$. Очевидно, $t_c(X) \leq t(X)$ для любого пространства X .

Действительно, имеет место

Лемма 2. Пусть $t_c(X) \leq \kappa_0$ и F - замкнутое подмножество в X , не имеющее изолированных точек. Тогда существует замкнутое в X множество ϕ без изолированных точек такое, что $\phi \subset F$ и $d(\phi) = \kappa_0$.

Доказательство. Пусть $S_0 \subset F$, $|S_0| \leq \kappa_0$. Так как $t_c(X) \leq \kappa_0$, для каждой точки $x \in S_0$ существует счетное множество $S_x \subset F \setminus \{x\}$ такое, что $x \in [S_x]$. Полагаем $S_1 = \bigcup_{x \in S_0} S_x$. Очевидно, $|S_1| \leq \kappa_0$. Для каждой точки $y \in S_1$ существует счетное множество $S_y \subset F \setminus \{y\}$ такое, что $y \in [S_y]$. Полагаем $S_2 = \bigcup_{y \in S_1} S_y$. Очевидно, $|S_2| \leq \kappa_0$ и так далее.

Полагаем теперь $S = \bigcup_{i \in \omega} S_i$ и $\phi = [S]$. Очевидно, $|S| \leq \kappa_0$ и в S нет изолированных точек. Поэтому $d(\phi) = \kappa_0$ и в ϕ также нет изолированных точек. Очевидно, $\phi \subset F$.

Лемма доказана.

Для того, чтобы установить справедливость приведенного выше утверждения, теперь достаточно применить лемму 2 в соответствующем месте при доказательстве теоремы 1.

Вопрос 2. Во всяком ли регулярном счетно компактном пространстве без изолированных точек существует сепарабельное подпространство без изолированных точек?

• В случае положительного ответа на этот вопрос положительное решение получает также и вопрос 1.

Теорема 2. Пусть τ - бесконечный кардинал и τ - компактное пространство X является объединением семейства $\{M_\alpha : \alpha < \tau\}$ своих левых подпространств. Тогда $t(X) \leq \tau$.

Доказательство. Предположим, что $t(X) > \tau$. Тогда в

X существует свободная последовательность $N = \{x_\alpha : \alpha < \tau^+\}$ длины τ^+ - это следует из τ -компактности пространства X и результатов А.В. Архангельского из [4]. Для каждого $\alpha < \tau^+$ положим $N^\alpha = \{x_\beta : \alpha \leq \beta\}$, $N_\alpha = \{x_\beta : \beta < \alpha\}$, $\tilde{N} = \bigcap \{[N^\alpha] : \alpha < \tau^+\}$ и $K = [N] \setminus \tilde{N}$.

Теперь стандартным способом построим непрерывное отображение $g: K \xrightarrow{\text{на}} \tau^+$, где множество τ^+ наделено порядковой топологией. Именно, для каждого изолированного ординала $\alpha < \tau^+$ мы полагаем $g(x_\alpha) = \alpha$. Если же α - предельный ординал, то мы полагаем $g(x) = \alpha$ для каждого $x \in \phi_\alpha$, где $\phi_\alpha = [N_\alpha] \setminus \bigcup \{[N_\beta] : \beta < \alpha\}$.

Так как N - свободная последовательность, то $K = \bigcup \{[N_\alpha] : \alpha < \tau^+\}$, поэтому K является τ -компактным пространством и g определено на всем K .

Непрерывность отображения g легко проверяется.

Так как любое подпространство левого пространства само является левым, без потери общности можно считать, что $M_\alpha \cap M_\beta = \Lambda$ при $\alpha < \beta < \tau$.

Для каждого $\alpha < \tau$ зафиксируем левое вполне упорядочение $<_\alpha$ на M_α и положим $K_\alpha = K \cap M_\alpha$.

Тогда $K = \bigcup \{K_\alpha : \alpha < \tau\}$ и $K_\alpha \cap K_\beta = \Lambda$ при $\alpha < \beta < \tau$.

Для каждого ординала $\alpha < \tau$ и любого $x \in K_\alpha$ через $K_\alpha(x)$ мы будем обозначать множество $\{y \in K_\alpha : y <_\alpha x\}$.

Перейдем к первому этапу доказательства.

Для каждого ординала $\alpha < \tau$ существуют две возможности:

- ($i_0(\alpha)$) существует $\theta < \tau^+$ такой, что $K_\alpha \subset g^{-1}(\theta)$;
- ($ii_0(\alpha)$) $K_\alpha \setminus g^{-1}(\theta) \neq \Lambda$ для каждого $\theta < \tau^+$.

Очевидно, существует ординал $\alpha < \tau$, для которого имеет место вторая возможность, ибо $\text{cf}(\tau^+) = \tau^+ > \tau$. Пусть α_0 - минимальный такой ординал. Для него снова существуют две возможности:

(iii₀) для каждого $x \in K_{\alpha_0}$ существует ординал $\alpha < \tau^+$ такой, что $K_{\alpha_0}(x) \subset g^{-1}(\alpha)$;

(iv₀) существует $x \in K_{\alpha_0}$ такой, что $K_{\alpha_0}(x) \setminus g^{-1}(\alpha) \neq \Lambda$ для каждого $\alpha < \tau^+$.

В случае (iii₀) мы полагаем $F_0 = [\tilde{K}_{\alpha_0}]_K$, где $\tilde{K}_{\alpha_0} = K_{\alpha_0}$, а в случае (iv₀) полагаем $x_0 = \min \{y \in K_{\alpha_0} : K_{\alpha_0}(y) \setminus g^{-1}(\alpha) \neq \Lambda \text{ для каждого } \alpha < \tau^+\}$, $\tilde{K}_{\alpha_0} = K_{\alpha_0}(x_0)$ и $F_0 = [\tilde{K}_{\alpha_0}]_K$ (минимум в определении точки x_0 берется относительно вполне упорядочения $<_{\alpha_0}$).

Очевидно, в обоих случаях будет иметь место равенство $F_0 \cap K_{\alpha_0} = \tilde{K}_{\alpha_0}$, ибо $<_{\alpha_0} \upharpoonright K_{\alpha_0}$ - левое вполне упорядочение на K_{α_0} .

Пусть $\beta < \tau$ и для каждого $\gamma < \beta$ множество $F_\gamma \subset K$ уже определено, а ординал α_γ определен для каждого неопредельного $\gamma < \beta$, причем $\Lambda \neq F_{\gamma_2} \subset F_{\gamma_1}$ при $\gamma_1 < \gamma_2 < \beta$.

Если β - предельный ординал, то мы полагаем $F_\beta = \bigcap \{F_\gamma : \gamma < \beta\}$. Тогда $F_\beta \neq \Lambda$, поскольку K является τ -компактным пространством.

Пусть теперь $\beta = \gamma + 1$. Для каждого $\alpha < \tau$ существуют две возможности:

(i_{\beta}(α)) существует ординал $\theta < \tau^+$ такой, что $F_\gamma \cap K_\alpha \subset g^{-1}(\theta)$;

(ii_{\beta}(α)) $(F_\gamma \cap K_\alpha) \setminus g^{-1}(\theta) \neq \Lambda$ для каждого $\theta < \tau^+$.

Разберем две возможности.

1) γ - предельный ординал. Положим $\alpha_\gamma^* = \sup \{\alpha_\mu :$

$\mu < \gamma$, μ - неперелыйный ординал}. Если для каждого ординала α , где $\alpha_\gamma^* \leq \alpha < \tau$, имеет место случай $(i_\beta(\alpha))$, то мы полагаем $F = F_\gamma$ и перед шагом β нашего построения останавливаемся. Если же для некоторого α , где $\alpha_\gamma^* \leq \alpha < \tau$, имеет место случай $(ii_\beta(\alpha))$, то пусть α_β - минимальный такой ординал (не меньший, чем α_γ^* , разумеется).

2) $\gamma = \mu + 1$.

Если для каждого ординала α , где $\alpha_\gamma < \alpha < \tau$, имеет место случай $(i_\beta(\alpha))$, то мы полагаем $F = F_\gamma$ и перед шагом β нашего построения останавливаемся.

Если же для некоторого ординала α такого, что $\alpha_\gamma < \alpha < \tau$, имеет место случай $(ii_\beta(\alpha))$, то пусть α_β - минимальный такой ординал (большой, чем α_γ , разумеется).

Итак, в обоих случаях (1) и (2) наши действия определены. Предположим, что "остановки" не случилось.

Опять существуют две возможности :

(iii_β) для каждого $x \in K_{\alpha_\beta}$ существует $\theta < \tau^+$ такой, что $F_\gamma \cap K_{\alpha_\beta}(x) \subset g^{-1}(\theta)$;

(iv_β) существует $x \in K_{\alpha_\beta}$ такой, что для каждого $\theta < \tau^+$ будет $(F_\gamma \cap K_{\alpha_\beta}(x)) \setminus g^{-1}(\theta) \neq \emptyset$.

В случае (iii_β) полагаем $\tilde{K}_{\alpha_\beta} = K_{\alpha_\beta} \cap F_\gamma$ и $F_\beta = [\tilde{K}_{\alpha_\beta}]_K$, а в случае (iv_β) полагаем $x_\beta = \min\{x \in K_{\alpha_\beta} : (K_{\alpha_\beta} \cap F_\gamma) \setminus g^{-1}(\theta) \neq \emptyset \text{ для каждого } \theta < \tau^+\}$, $\tilde{K}_{\alpha_\beta} = K_{\alpha_\beta}(x_\beta) \cap F_\gamma$ и $F_\beta = [\tilde{K}_{\alpha_\beta}]_K$.

Очевидно, в обоих случаях будет выполняться равенство $F_\beta \cap K_{\alpha_\beta} = \tilde{K}_{\alpha_\beta}$, ибо $\langle \alpha_\beta \mid K_{\alpha_\beta} \rangle$ - левое вполне упорядочение на K_{α_β} .

Итак, наше построение полностью определено. Если это построение остановилось перед некоторым шагом β , где

$\beta < \tau$, то непустое множество F уже определено. В противном случае полагаем $F = \bigcap \{F_\beta : \beta < \tau\}$. Так как в этом случае система $\{F_\beta : \beta < \tau\}$ состоит из непустых замкнутых подмножеств τ -компактного пространства K и $F_\beta \subset F_\gamma$ при $\gamma < \beta < \tau$, то $F \neq \Lambda$.

Волею того, мы утверждаем, что $g(F)$ замкнуто и конфинально в τ^+ . Для того, чтобы доказать это заметим прежде всего, что g - замкнутое отображение, как непрерывное отображение τ -компактного пространства K на хаусдорфово пространство, в котором каждая точка имеет замкнутую окрестность, индекс компактности которой не превосходит τ .

Конфинальность множества $g(F)$ в τ^+ очевидна, если наше построение остановилось перед шагом с номером $\beta < \tau$ (тогда обязательно β - непредельный ординал) таким, что существует ординал $\mu = \beta - 2$.

Действительно, положим $\gamma = \mu + 1$. Тогда $F = F_\gamma = [\tilde{K}_{\alpha_\gamma}]_K$, причем $g(\tilde{K}_{\alpha_\gamma})$ конфинально в τ^+ (см. определение индекса α_γ). Таким образом, нам остается рассмотреть два случая:

- а) построение остановилось перед ординалом β , причем $\gamma = \beta - 1$ - предельный ординал, или
- в) построение не останавливалось вовсе.

Тогда $F = \bigcap \{F_\mu : \mu < \gamma\}$ в случае (а) и $F = \bigcap \{F_\mu : \mu < \tau\}$ в случае (в). Эта разница несущественна - положим

$$\mu^* = \begin{cases} \gamma, & \text{в случае (а);} \\ \tau, & \text{в случае (в).} \end{cases}$$

Тогда μ^* - предельный ординал, $\mu^* \leq \tau$ и $F = \bigcap \{F_\mu : \mu < \mu^*\}$. Затем, $g(F_\mu)$ замкнуто и конфинально в τ^+ , для каждого $\mu < \mu^*$, поэтому $G = \bigcap \{g(F_\mu) : \mu < \mu^*\}$ также замкнуто и конфинально в τ^+ , так как пространство τ^+ (с порядковой

топологией) τ - компактно.

Остается лишь заметить, что $g(F) = \mathcal{Q}$. Действительно, система $\{g^{-1}(i\theta)\} \cup \{F_\mu: \mu < \mu^*\}$ центрирована для каждого ординала $\theta \in \mathcal{Q}$ и мощность этой системы не превосходит τ . Поэтому ее пересечение непусто, то есть $F \cap g^{-1}(i\theta) \neq \Lambda$; следовательно, $\mathcal{Q} \subset g(F)$. Обратное включение очевидно. Этим самым конфинальность множества $g(F)$ в τ^+ доказана. Отметим, что $F \cap K_{\alpha_\mu} \subset \tilde{K}_{\alpha_\mu}$ для каждого непредельного ординала $\mu < \mu^*$, ибо $F \subset F_\mu$ и $F_\mu \cap K_{\alpha_\mu} = \tilde{K}_{\alpha_\mu}$ для каждого непредельного ординала $\mu < \mu^*$.

Положим $S = \tau \setminus \{\alpha_\mu: \mu < \mu^*, \mu - \text{непредельный ординал}\}$. Из проведенного построения следует, что для каждого $\beta \in S$ существует ординал $\theta_1(\beta) < \tau^+$ такой, что $F \cap K_\beta \subset g^{-1}(\theta_1(\beta))$. Положим также $\tilde{S} = \{\mu < \mu^*: \mu - \text{непредельный ординал и существует } \theta < \tau^+ \text{ такой, что } \tilde{K}_{\alpha_\mu} \cap F \subset g^{-1}(\theta)\}$. Для каждого $\mu \in \tilde{S}$ через $\theta(\mu)$ обозначим наименьший ординал $\theta < \tau^+$, для которого $F \cap \tilde{K}_{\alpha_\mu} \subset g^{-1}(\theta)$. Положим $\theta^* = \sup E$, где $E = \{\theta(\mu): \mu \in \tilde{S}\} \cup \{\theta_1(\beta): \beta \in S\}$ (очевидно, $|E| \leq \tau$) и $\phi = F \setminus g^{-1}(\theta^*)$.

Тогда ϕ замкнуто в F , $g(\phi)$ замкнуто и конфинально в τ^+ и для каждого $\beta \in A$, где $A = \tau \setminus \tilde{S}$, выполняются следующие условия:

- (v_β) $(\phi \cap K_{\alpha_\beta}) \setminus g^{-1}(\theta) \neq \Lambda$ для каждого $\theta < \tau^+$;
- (vi_β) для каждого $x \in \tilde{K}_{\alpha_\beta}$ существует ординал $\theta < \tau^+$ такой, что $\phi \cap \tilde{K}_{\alpha_\beta}(x) \subset g^{-1}(\theta)$.

Действительно, (v_β) выполняется по определению множества \tilde{S} , а (vi_β) - по определению множества \tilde{K}_{α_β} .

Отметим, что $\phi \subset \cup \{\tilde{K}_{\alpha_\beta}: \beta \in A\}$!

Перейдем ко второму этапу доказательства.

Для каждого $\beta \in A$ положим $L_\beta = \Phi \cap \tilde{K}_{\alpha_\beta}$. Очевидно, $\Phi = \cup \{L_\beta : \beta \in A\}$ и $L_{\beta'} \cap L_{\beta''} = \Lambda$ при $\beta', \beta'' \in A, \beta' \neq \beta''$.
Зафиксируем $\beta \in A$.

Пусть $\alpha_0(\beta)$ - произвольный ординал такой, что $\alpha_0(\beta) < \tau^+$. Ввиду условия (v_β) существует точка $x_0(\beta) \in L_\beta$ такая, что $\alpha_0(\beta) < g(x_0(\beta))$. Пусть $\mu < \tau^+$ и для всех $\gamma < \mu$ уже определены ординал $\alpha_\gamma(\beta) < \tau^+$ и точка $x_\gamma(\beta) \in L_\beta$.

Если μ - предельный ординал, то мы положим $\alpha_\mu(\beta) = \sup \{\alpha_\gamma(\beta) : \gamma < \mu\}$ и $x_\mu(\beta) = \min \{x \in L_\beta : x_\gamma(\beta) \ll_\beta x \text{ для каждого } \gamma < \mu\}$, где \ll_β есть сужение вполне упорядочения $<_{\alpha_\beta}$ на множестве L_β , а минимум в определении точки $x_\mu(\beta)$ берется относительно вполне упорядочения \ll_β .

Необходимо отметить, что ввиду условий (v_β) и (vi_β) будем иметь: $cf(L_\beta, \ll_\beta) = \tau^+$ и поэтому точка $x_\mu(\beta)$ определена.

Пусть $\mu = \gamma + 1$. Пользуясь свойством (vi_β) множества L_β , мы выбираем ординал $\alpha_\mu(\beta) > g(x_\gamma(\beta))$ так, чтобы $L_\beta(x_\gamma(\beta)) \subset g^{-1}(\alpha_\mu(\beta))$. Пользуясь свойством (v_β) , мы находим точку $x_\mu(\beta) \in L_\beta$ такую, что $\alpha_\mu(\beta) < g(x_\mu(\beta))$.

Тогда, конечно, $x_\gamma(\beta) \ll_\beta x_\mu(\beta)$.

Таким образом, множества $\{x_\gamma(\beta) : \gamma < \tau^+\}$ и $\{\alpha_\gamma(\beta) : \gamma < \tau^+\}$ построены. Из построения вытекают такие свойства:

(r_β) $L_\beta(x_\mu(\beta)) \subset g^{-1}(\alpha_\mu(\beta))$ для каждого предельного ординала $\mu < \tau^+$;

(g_β) для каждого предельного ординала $\mu < \tau^+$ множество $\{g(x_\gamma(\beta)) : \gamma < \mu\}$ кофинально в $\alpha_\mu(\beta)$.

Обозначим $C_\beta = \{\alpha_\mu(\beta) : \mu < \tau^+\}$ и $\tilde{D} = \{\mu < \tau^+ : \alpha_\mu(\beta) = \alpha_\mu(\beta'') \text{ для любых } \beta', \beta'' \in A\}$. Тогда \tilde{D} замкнуто и

конфинально в τ^+ . Действительно, \tilde{D} является пересечением замкнутых и конфинальных в τ^+ множеств $D(\beta', \beta'') = \{\mu < \tau^+ : \alpha_\mu(\beta') = \alpha_\mu(\beta'')\}$ по всем парам $(\beta', \beta'') \in A^2$, причем $|A| \leq \tau$. Замкнутость множеств $D(\beta', \beta'')$ вытекает из замкнутости множеств C_β , что следует из их построения.

Обозначим теперь через D множество всех предельных для \tilde{D} ординалов. Очевидно, $D \subset \tilde{D}$, D замкнуто и конфинально в τ^+ .

Перейдем к третьему, последнему этапу "построения противоречия".

Множество предельных ординалов, меньших τ^+ , будем обозначать через $\ell(\tau^+)$. Аналогично определяется множество $\ell(\tau)$.

Пусть $\beta \in A$. Для каждого $\mu \in \ell(\tau^+)$ положим $A_\mu(\beta) = [L_\beta(x_\mu(\beta))]_\Phi \cap g^{-1}(\{\alpha_\mu(\beta)\})$. Мы утверждаем, что $A_\mu(\beta) \neq \Lambda$ для каждого $\mu \in \ell(\tau^+)$. Действительно, из свойства (g_β) вытекает конфинальность множества $\{g(x_\gamma(\beta)) : \gamma < \mu\}$ в $\alpha_\mu(\beta)$ и поэтому $\alpha_\mu(\beta) \in [g(x_\gamma(\beta)) : \gamma < \mu]_\Phi$. Остается лишь заметить, что $\{x_\gamma(\beta) : \gamma < \mu\} \subset L_\beta(x_\mu(\beta))$ и отображение g замкнуто, поэтому $A_\mu(\beta) \neq \Lambda$.

Далее, если $x \in L_\beta \cap g^{-1}(\{\alpha_\mu(\beta)\})$, где μ - предельный ординал, $\mu < \tau^+$, то либо $x_\mu(\beta) \ll_{<\beta} x$, либо $x_\mu(\beta) = x$ - это следует из свойства (μ_β) .

Вспоминая, что L_β - левое подпространство в Φ , мы получаем: $A_\mu(\beta) \cap L_\beta = \Lambda$ для каждого $\mu \in \ell(\tau^+)$.

Положим $\beta_0 = \min A$ и $T_0 = D$. Пусть $\alpha < \tau^+$ и для каждого ординала $\gamma < \alpha$ уже определено множество $T_\gamma \subset \tau^+$, а для каждого неопредельного ординала $\gamma < \alpha$ определен индекс $\beta_\gamma \in A$, причем T_γ замкнуто и кон-

финально в τ^+ , $T_{\gamma''} \subset T_{\gamma'}$, при $\gamma' < \gamma'' < \alpha$, а система $\{A_\theta(\beta_\gamma): \gamma \neq \kappa, \gamma \in \tau^+ \setminus l(\tau^+)\}$ центрирована для каждого неопредельного ординала $\kappa < \alpha$ и каждого $\theta \in T_{\kappa\epsilon}$.

Пусть $A \setminus \{\beta_\gamma: \gamma < \alpha\} \neq \Lambda$. Если $\alpha \in l(\tau^+)$, то мы полагаем $T_\alpha = \bigcap \{T_\gamma: \gamma < \alpha\}$ и все индуктивные требования выполнены. Пусть $\alpha = \kappa + 1$. Тогда система $\{A_\theta(\beta_\gamma): \gamma \neq \kappa, \gamma \in \tau^+ \setminus l(\tau^+)\}$ центрирована.

Действительно, если κ - неопредельный ординал, то эта система центрирована по индуктивному предположению. Если же $\kappa \in l(\tau^+)$, то эта система центрирована как объединение растущих центрированных систем $\{A_\theta(\beta_\gamma): \gamma \neq \kappa', \gamma \in \tau^+ \setminus l(\tau^+)\}$ по всем неопредельным $\kappa' < \kappa$. Поэтому при каждом $\theta \in T_{\kappa\epsilon}$ мы можем выбрать точку $\psi_\theta \in \bigcap \{A_\theta(\beta_\gamma): \gamma \neq \kappa, \gamma \in \tau^+ \setminus l(\tau^+)\}$. Затем для каждого $\theta \in T_{\kappa\epsilon}$ через $\varphi_\alpha(\theta)$ обозначим какой-нибудь элемент $\beta \in A$, для которого $\psi_\theta \in L_\beta$. Тогда $\varphi_\alpha(\theta) \neq \beta_\gamma$ для каждого неопредельного ординала $\gamma \neq \kappa$. Действительно, в противном случае $\psi_\theta \in A_\theta(\beta_\gamma) \cap L_{\beta_\gamma}$ для некоторого неопредельного $\gamma \neq \kappa$. Однако, $\theta \in T_{\kappa\epsilon} \subset D$, поэтому $L_{\beta_\gamma}(x_\theta(\beta_\gamma)) \subset \bar{q}^{-1}(\alpha_\theta(\beta_\gamma))$ (см. свойство (r_{β_γ})). Следовательно, если $x \ll_{\beta_\gamma} x_\theta(\beta_\gamma)$, то $q(x) < \alpha_\theta(\beta_\gamma)$. Но $q(\psi_\theta) = \alpha_\theta(\beta_\gamma)$, поэтому либо $x_\theta(\beta_\gamma) \ll_{\beta_\gamma} \psi_\theta$, либо $x_\theta(\beta_\gamma) = \psi_\theta$. Это противоречит тому, что L_{β_γ} - левое пространство и $\psi_\theta \in A_\theta(\beta_\gamma) \subset [L_{\beta_\gamma}(x_\theta(\beta_\gamma))]_\Phi$.

Так как $|T_{\kappa\epsilon}| = \tau^+$, существует $\beta \in A$ такой, что $|\varphi_\alpha^{-1}(\{\beta\})| = \tau^+$. Через β_α обозначим наименьший такой ординал $\beta \in A$ и положим $P_\alpha = \varphi_\alpha^{-1}(\{\beta_\alpha\})$. Отметим, что множество $\{\psi_\theta: \theta \in P_\alpha\}$ кофинально в L_{β_α} , поскольку множество $\{q(\psi_\theta): \theta \in P_\alpha\}$ кофинально в τ^+ .

Теперь внутри ведущегося построения проведем еще одно

"вложенное" построение.

Пусть $\theta_0 \in P_\alpha$. Ввиду конфинальности множества $\{x_\theta(\beta_\alpha) : \theta < \tau^+\}$ в L_{β_α} существует $\xi_0 < \tau^+$ такой, что $\theta_0 < \xi_0$ и $\psi_{\theta_0} \in L_{\beta_\alpha}(x_{\xi_0}(\beta_\alpha))$. Существует $\eta_0 < \tau^+$ такой, что $\xi_0 < \eta_0$ и $L_{\beta_\alpha}(x_{\xi_0}(\beta_\alpha)) \subset \mathcal{G}^{-1}(\eta_0)$.

Пусть $\gamma < \tau^+$ и множества $\{\theta_\mu : \mu < \gamma\}$, $\{\xi_\mu : \mu < \gamma\}$ и $\{\eta_\mu : \mu < \gamma\}$ уже определены. Если $\gamma \in \mathcal{L}(\tau^+)$, то мы полагаем $\theta_\gamma = \xi_\gamma = \eta_\gamma = \sup\{\theta_\mu : \mu < \gamma\}$. Пусть $\gamma = \mu + 1$. Тогда выбираем $\theta_\gamma \in P_\alpha$ так, чтобы $\eta_\mu < \theta_\gamma$. Существует ординал $\xi_\gamma < \tau^+$ такой, что $\theta_\gamma \in P_\alpha$ и $\psi_{\theta_\gamma} \in L_{\beta_\alpha}(x_{\xi_\gamma}(\beta_\alpha))$. Существует ординал $\eta_\gamma < \tau^+$ такой, что $\xi_\gamma < \eta_\gamma$ и $L_{\beta_\alpha}(x_{\xi_\gamma}(\beta_\alpha)) \subset \mathcal{G}^{-1}(\eta_\gamma)$.

Таким образом, "вложенное" построение осуществлено.

Пусть $\tilde{T}_\alpha = \{\theta_\gamma : \gamma \in \mathcal{L}(\tau^+)\}$ и $T_\alpha = T_\omega \cap \tilde{T}_\alpha$.

Центральный момент доказательства состоит в том, что для каждого ординала $\theta \in T_\alpha$ система $\{A_\theta(\beta_\gamma) : \gamma \leq \alpha, \gamma \in \tau^+ \setminus \mathcal{L}(\tau^+)\}$ будет центрирована. Действительно, пусть $\theta \in T_\alpha$. Тогда $\theta = \theta_\gamma$ для некоторого $\gamma \in \mathcal{L}(\tau^+)$. Ввиду только что проведенного построения, $\psi_{\theta_\mu} \in L_{\beta_\alpha}$ для каждого непердельного $\mu < \gamma$. Следовательно, $Y_\gamma = \{\psi_{\theta_\mu} : \mu < \gamma, \mu \in \tau^+ \setminus \mathcal{L}(\tau^+)\} \subset L_{\beta_\alpha}$. Отсюда следует, что $[Y_\gamma]_\phi \cap A_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha) \neq \Lambda$. Докажем это. Пусть μ - непердельный ординал, $\mu < \gamma$. Ввиду выбора точек ψ_θ имеем: $\psi_{\theta_\mu} \in A_{\theta_\mu}(\beta_\xi) \subset \mathcal{G}^{-1}(\{x_{\theta_\mu}(\beta_\xi)\})$ для любого непердельного $\xi \leq \omega$, поэтому $\mathcal{G}(\psi_{\theta_\mu}) = x_{\theta_\mu}(\beta_\xi)$ для любого непердельного $\xi \leq \omega$ (в этом нет ничего удивительного, ибо $\theta_\mu \in P_\alpha \subset T_\omega \subset T_0 \subset D \subset \tilde{D}$, а по определению множества \tilde{D} , $\alpha_\theta(\beta') = \alpha_\theta(\beta'')$ для любых $\beta', \beta'' \in A$).

Однако, $\sup\{x_{\theta_\mu}(\beta_\xi) : \mu < \gamma\} = x_{\theta_\gamma}(\beta_\xi)$, ибо

$\text{supr}\{\theta_\mu: \mu < \gamma\} = \theta_\gamma$. Поскольку же $\alpha_{\theta_\gamma}(\beta') = \alpha_{\theta_\gamma}(\beta'')$ для любых $\beta', \beta'' \in A(\theta_\gamma \in \bar{D})$, мы будем иметь:

$\text{supr}\{\alpha_{\theta_\mu}(\beta_\xi): \mu < \gamma\} = \alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha)$ для любого непредельного $\xi \leq \aleph$.

Поэтому $[g(Y_\gamma)] \ni \alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha)$ и, следовательно,

$$(*) \quad [Y_\gamma]_\Phi \cap g^{-1}(\{\alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha)\}) \neq \Lambda.$$

Затем, имеет место следующее свойство:

$$(**) \quad \psi_{\theta_\mu} \in L_{\beta_\alpha}(x_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha))$$

для каждого непредельного $\mu < \gamma$.

Действительно, это сразу следует из того, что

$$(m) \quad \psi_{\theta_\mu} \in L_{\beta_\alpha}(x_{\xi_\mu}(\beta_\alpha)) \quad \text{для любого непредельного } \mu < \gamma \text{ и}$$

$$(n) \quad x_{\xi_\mu}(\beta_\alpha) \in L_{\beta_\alpha}(x_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha)) \text{ для любого непредельного } \mu < \gamma.$$

Оба свойства (m) и (n) следуют из построения.

Таким образом, мы получаем: $R_\gamma \stackrel{\text{def}}{=} [Y_\gamma]_\Phi \cap A_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha) = [Y_\gamma]_\Phi \cap [L_{\beta_\alpha}(x_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha))]_\Phi \cap g^{-1}(\{\alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha)\}) \stackrel{(**)}{=} [Y_\gamma]_\Phi \cap g^{-1}(\{\alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha)\}) \stackrel{(*)}{\neq} \Lambda$.

Далее, из включения $\psi_{\theta_\mu} \in A_{\theta_\mu}(\beta_\xi)$, которое имеет место при любом непредельном $\mu < \tau^+$ и непредельном $\xi \leq \aleph$, следует, что $\psi_{\theta_\mu} \in [L_{\beta_\xi}(x_{\theta_\mu}(\beta_\xi))]_\Phi$, поэтому $[Y_\gamma]_\Phi \subset [L_{\beta_\xi}(x_{\theta_\gamma}(\beta_\xi))]_\Phi$ для любого непредельного $\xi \leq \aleph$. Следовательно, $\Lambda \neq R_\gamma = [Y_\gamma]_\Phi \cap g^{-1}(\{\alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\xi)\}) \subset [L_{\beta_\xi}(x_{\theta_\gamma}(\beta_\xi))]_\Phi \cap g^{-1}(\{\alpha_{\theta_\gamma}(\beta_\xi)\}) = A_{\theta_\gamma}(\beta_\xi)$, то есть $R_\gamma \subset \bigcap \{A_\theta(\beta_\xi): \xi \leq \aleph, \xi \in \tau^+ \setminus \mathcal{L}(\tau^+)\}$ (заметим, что R_γ не зависит от ξ , ибо $\alpha_{\theta_\gamma}(\beta') = \alpha_{\theta_\gamma}(\beta'')$ при любых $\beta', \beta'' \in A$).

Но мы уже установили, что $R_\gamma = [Y_\gamma]_\Phi \cap A_{\theta_\gamma}(\beta_\alpha) \neq \Lambda$, поэтому центрированность системы $\Gamma_\gamma = \{A_{\theta_\gamma}(\beta_\xi): \xi \leq \aleph + 1 = \alpha$,

$\xi \in \tau^+ \setminus \mathcal{L}(\tau^+)$ вытекает из включения $R_\gamma \subset \bigcap \Gamma_\gamma$.

Тем самым доказано, что множество T_α и ординал β_α определены с соблюдением всех индуктивных требований, и наше "внешнее" построение завершено.

Пусть $\alpha^* < \tau^+$ - минимальный ординал такой, что $\tau \setminus \{\beta_\alpha : \alpha < \alpha^*, \alpha \text{ - неперелый ординал}\} = \mathcal{L}$. Такой ординал α^* существует, ибо $\tau < \tau^+$. Очевидно, система $\{A_\theta(\beta_\alpha) : \alpha < \alpha^*, \alpha \in \tau^+ \setminus \mathcal{L}(\tau^+)\}$ центрирована для каждого $\theta \in T$, где $T = \bigcap \{T_\alpha : \alpha < \alpha^*\} \neq \mathcal{L}$.

Пусть $\theta \in T$ и $\mu \in \bigcap \{A_\theta(\beta_\alpha) : \alpha < \alpha^*, \alpha \in \tau^+ \setminus \mathcal{L}(\tau^+)\}$. Тогда существует ординал $\gamma < \alpha^*$ такой, что $\mu \in L_{\beta_\gamma}$. Следовательно, $\mu \in A_\theta(\beta_\gamma) \cap L_{\beta_\gamma}$. Однако, $\theta \in T \subset D$, поэтому $\mathcal{G}^{-1}(\alpha_\theta(\beta_\gamma)) \supset L_{\beta_\gamma}(x_\theta(\beta_\gamma))$ (см. (μ_{β_γ})). Следовательно, если $x \ll_{\beta_\gamma} x_\theta(\beta_\gamma)$, то $\mathcal{G}(x) < \alpha_\theta(\beta_\gamma)$. Но $\mathcal{G}(\mu) = \alpha_\theta(\beta_\gamma)$, поэтому либо $x_\theta(\beta_\gamma) \ll_{\beta_\gamma} \mu$, либо $x_\theta(\beta_\gamma) = \mu$. Это противоречит тому, что \ll_{β_γ} - левое вполне упорядочение на L_{β_γ} и $\mu \in A_\theta(\beta_\gamma) \subset [L_{\beta_\gamma}(x_\theta(\beta_\gamma))]_\phi$.

Теорема полностью доказана.

Замечание 1. На самом деле при доказательстве теоремы 2 мы установили, что τ - компактное пространство, являющееся объединением τ левых подпространств, не содержит свободных последовательностей длины больше чем τ .

Л и т е р а т у р а

- [1] I. GERLITZ and I. JUHÁSZ: On left-separated compact spaces, Comment. Math. Univ. Carolinae 19 (1978), 53-61.
- [2] Peter I. NYIKOS: Covering properties on \mathcal{G} -scattered spaces, to appear.

- [3] А.В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, В.И. ПОНОМАРЕВ: Основы общей топологии в задачах и упражнениях, М., "Наука", 1974.
- [4] А.В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ: О бикompактах, удовлетворяющих условию Суслина наследственно. Теснота и свободные последовательности, Докл. Акад. Наук СССР 199(1971), 1227-1230.

Московский Государственный Университет

Москва В-234

С С С Р

(Oblatum 12.2. 1979)