

16. ročník matematické olympiády

V. Úlohy III. kola kategorie A

In: Jan Vyšín (editor); Vlastimil Macháček (editor): 16. ročník matematické olympiády. Zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce 1966-1967. 9. Mezinárodní matematická olympiáda. (Czech). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968, pp. 104-114.

Terms of use:

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/404565>
Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://dml.cz>

V. Úlohy III. kola kategorie A

1. Určete všechny takové trojice komplexních čísel a, b, c , aby rovnice

$$x^4 - ax^3 - bx + c = 0 \quad (1)$$

měla kořeny a, b, c .

Řešení. Rozložme čtyřčlen na levé straně (1) v součin kořenových činitelů:

$$x^4 - ax^3 - bx + c = (x - a)(x - b)(x - c)(x - d), \quad (2)$$

kde d je čtvrtý kořen rovnice (1). Po vynásobení na pravé straně (2) a po porovnání koeficientů při mocninách x dostaneme soustavu rovnic pro a, b, c, d :

$$\begin{aligned} a + b + c + d &= a, \\ a(b + c + d) + bc + bd + cd &= 0, \\ a(bc + bd + cd) + bcd &= b, \\ abcd &= c. \end{aligned}$$

Po jednoduché úpravě vyjde

$$\begin{aligned} b + c + d &= 0, \\ bc + bd + cd &= 0, \\ b(cd - 1) &= 0, \\ c(abd - 1) &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

Rozlišíme případy $b = 0$ a $b \neq 0$.

I. Je-li $b = 0$, dostaneme z čtvrté rovnice (3) $c = 0$ a z první rovnice $d = 0$. Číslo a může být libovolné. Máme jedno řešení:

$$a \text{ libovolné, } b = c = d = 0. \quad (4)$$

II. Je-li $b \neq 0$, plyne z třetí rovnice (3) $cd = 1$, tj. $c \neq 0, d \neq 0$. Z čtvrté rovnice (3) dostaneme $abd = 1$. Máme tedy soustavu

$$\begin{aligned} abd &= 1, \\ d &= -(b + c), \\ cd &= 1, \\ bc + (b + c)d &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

Vyloučením d z druhé až čtvrté rovnice (5) vyjde po úpravě

$$\begin{aligned} c^2 + bc + 1 &= 0, \\ b^2 + bc + c^2 &= 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Vyloučením c z obou rovnic (6) dostaneme

$$b^2 = 1,$$

tj. $b = \pm 1$. Pro c pak dostaneme z první rovnice (6)

$$c^2 \pm c + 1 = 0. \quad (7)$$

Označíme-li $\varepsilon_1 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$, $\varepsilon_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}$,

má první rovnice (7), tj. rovnice $c^2 + c + 1 = 0$, kořeny

$\varepsilon_1, \frac{1}{\varepsilon_1} = \varepsilon_2$, druhá rovnice (7), tj. rovnice $c^2 - c + 1 = 0$, kořeny $\varepsilon_2, \frac{1}{\varepsilon_2} = -\varepsilon_1$. Hodnoty d vypočteme z třetí


rovnice (5), a z první rovnice (5). Celkem vyjde pět řešení, která jsou zachycena v tabulce:

a	b	c	d
libovolné	0	0	0
ε_1	1	ε_1	$-\varepsilon_2$
$-\varepsilon_2$	1	$-\varepsilon_2$	ε_1
$-\varepsilon_2$	-1	ε_2	$-\varepsilon_1$
ε_1	-1	$-\varepsilon_1$	ε_2

2. Ak platia pre dĺžky hrán štvorstena $ABCD$ vzťahy $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$, (1) potom je aspoň jedna jeho stena ostrouhlý trojuholník. Dokážte.

Riešenie (obr. 30). Označme $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$, $AD = a'$, $BD = b'$, $CD = c'$. Potom vzťahy (1) možno zapísať v tvare

$$a^2 + a'^2 = b^2 + b'^2 = c^2 + c'^2. \quad (1')$$



Obr. 30.

Vyšetríme veľkosti uhlov $\sphericalangle BAD$, $\sphericalangle CAD$ a $\sphericalangle BAC$ pri vrchole A . Označme ich podľa obrázku: $\sphericalangle BAD = \varphi$, $\sphericalangle CAD = \psi$, $\sphericalangle BAC = \omega$. Podľa kosínusovej vety je

$$2a'c \cos \varphi = a'^2 + c^2 - b'^2, \quad (2a)$$

$$2a'b \cos \psi = a'^2 + b^2 - c'^2, \quad (2b)$$

$$2bc \cos \omega = b^2 + c^2 - a^2. \quad (2c)$$

Z (1') však vyplýva

$$a'^2 - b'^2 + c^2 = b^2 + c^2 - a^2, \quad (3a)$$

$$a'^2 - c'^2 + b^2 = b^2 + c^2 - a^2. \quad (3b)$$

Ak spojíme vzťahy (2abc) a (3ab), zistíme, že čísla $\cos \varphi$, $\cos \psi$ a $\cos \omega$ sú súčasne všetky tri buď kladné alebo záporné alebo rovné nule. Je teda buď

$$\varphi = \psi = \omega = 90^\circ$$

alebo

$$\varphi < 90^\circ, \quad \psi < 90^\circ, \quad \omega < 90^\circ$$

alebo

$$\varphi > 90^\circ, \quad \psi > 90^\circ, \quad \omega > 90^\circ.$$

Rovnaký výsledok platí aj pre uhly pri vrchoch B , C , D štvorstena $ABCD$.

Ak je teraz $\triangle ABC$ ostrouhlý, nemáme čo dokazovať. Ak je $\triangle ABC$ pravouhlý alebo tupouhlý, a to tak, že $\omega \geq 90^\circ$, potom je aj $\varphi \geq 90^\circ$, $\psi \geq 90^\circ$. Potom však pri každom z vrcholov B , C , D je aspoň jeden uhol ostrý. Podľa predchádzajúceho sú potom všetky uhly pri vrchoch B , C , D ostré, tj. trojuholník BCD je ostrouhlý.

3. V tabulke cyklických permutácií

$$1, 2, \dots, n-1, n$$

$$2, 3, \dots, n, 1$$

$$\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$$

$$n, 1, \dots, n-2, n-1$$

($n \geq 2$) znásobíme každé číslo prvého riadku tým číslom k -tého riadku, ktoré je ve stejném sloupci. Všechny tyto součiny sečteme a výsledek označíme s_k (např. $s_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + (n-1) \cdot n + n \cdot 1$).

a) Odvoďte vztah mezi s_{k-1} , s_k a z něho vzorec pro s_k .

b) Zjistěte, pro které k je při daném n součet s_k nejmenší, a vypočítejte tento součet.

Řešení. a) Vypíšme např. pátý a šestý řádek tabulky (1) pro $n = 8$; dostaneme

$$\begin{array}{l} 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 \\ 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. \end{array} \quad (2)$$

Každé číslo druhého řádku (2) je o 1 *větší* než nad ním stojící číslo prvního řádku (2) s výjimkou čísla 1, které je o 7 *menší* než nad ním stojící číslo 8. *Zvětšíme-li* součet s_5 o $1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + \dots + 8 \cdot 1$ a *zmenšíme-li* jej o $4 \cdot 8$ (číslo 8 stojí totiž ve čtvrtém sloupci), dostaneme s_6 ; je tedy

$$s_6 = s_5 + (1 + 2 + \dots + n) - 4 \cdot 8. \quad (3)$$

Rekurentní formule (3) se dá snadno zobecnit. Přejdeme-li v schématu (1) od řádku $k - 1$ k řádku k , zvětší se každé číslo o 1 kromě čísla n , které přejde v číslo 1. Lze tedy říci, že se číslo n zvětší také o 1, ale současně se zmenší o n .

Čísla n vyplňují v schématu (1) vedlejší diagonálu; v řádku $k - 1$ stojí na místě ν a zřejmě platí $k - 1 + \nu = n + 1$, neboli

$$\nu = n - k + 2. \quad (4)$$

Odtud vyplývá: Ze součtu s_{k-1} dostaneme součet s_k , přičteme-li $1 + 2 + \dots + n = \sigma$ a zároveň odečteme (podle (4)) číslo $n \cdot (n - k + 2)$; je tedy

$$s_k = s_{k-1} + \sigma - n(n - k + 2). \quad (5)$$

Rozepíšeme vzorec (5) pro $k = 2, 3, \dots, k$; dostaneme

$$\begin{array}{l} s_2 = s_1 + \sigma - n^2 + 2n - 2n, \\ s_3 = s_2 + \sigma - n^2 + 3n - 2n, \end{array} \quad (6)$$

.....

$$s_k = s_{k-1} + \sigma - n^2 + k \cdot n - 2n.$$

Sečteme $k - 1$ rovností (6) a dostaneme

$$s_k = s_1 + (k - 1)\sigma - (k - 1)n^2 + n \left[\frac{k(k + 1)}{2} - 1 \right] - 2(k - 1) \cdot n.$$

Dosadíme-li sem $\sigma = \frac{1}{2} n(n + 1)$ a vytkneme-li ze všech členů na pravé straně (vyjma s_1) číslo $\frac{1}{2} n$, vyjde po jednoduché úpravě

$$s_k = s_1 + \frac{n}{2} [k^2 - (n + 2)k + n + 1], \quad (7)$$

což je výsledný vzorec. Přitom s_1 stále značí součet

$$s_1 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2.$$

Vzorec (7) se pak dokáže indukci pomocí rekurentní formule (5).

b) Součet s_k je při pevném n kvadratickou funkcí proměnné k . Minimum funkce s_k dostaneme, vyšetříme-li minimum funkce

$$f(k) = k^2 - (n + 2)k + n + 1.$$

Protože platí

$$f(k) = \left(k - \frac{n + 2}{2} \right)^2 - \frac{n^2}{4}, \quad (8)$$

má s_k minimum pro $\frac{n + 2}{2} = k$.

Je třeba rozlišit dva případy:

I. Je-li n sudé, je $\nu = \frac{n + 2}{2}$ celé, a proto hledané minimum je podle (7) a (8)

$$s_\nu = s_1 - \frac{n^3}{8}.$$

II. Je-li n liché, není $\frac{n+2}{2}$ celé číslo. Minimum s_k nastane pro nejbližší celočíselné hodnoty k ; je to $k = \frac{n+1}{2}$ nebo $h = \frac{n+3}{2}$, což jsou skutečně celá čísla.

Minimum pak je


$$s_k = s_1 - \frac{n^3 - n}{8}.$$

4. Do kružnice k je vepsán ostroúhlý trojúhelník ABC . Přímka m je vnější přímkou kružnice k , je rovnoběžná s BC a protíná polopřímku AB v bodě D .

a) Je-li X bod kružnice k ležící uvnitř toho oblouku BC , který neobsahuje bod A , a je-li Y průsečík přímek CX , m , pak body A , D , X , Y leží na jisté kružnici ω . Dokažte.

b) Vyšetřete vzájemnou polohu kružnice κ a přímky m v případě, že body C, D, X leží v přímce.

Řešení (obr. 31).



Obr. 31.

a) Dokážeme větu předně pro situaci, že body X, Y jsou odděleny přímkou AB (na obr. 31 body X_1, Y_1). Pak trojúhelníky Z_1BC, Z_1DY_1 jsou homotetické podle středu Z_1 (tj. průsečíku CX, AB). Proto platí

$$\sphericalangle DY_1Z_1 = \sphericalangle DY_1X_1 = \sphericalangle BCX_1. \quad (1)$$

Protože body A, C náležejí témuž oblouku $\widehat{BX_1}$, je (podle věty o obvodových úhlech)

$$\sphericalangle BCX_1 = \sphericalangle BAX_1 = \sphericalangle DAX_1. \quad (2)$$

Spojením (1), (2) plyne, že

$$\sphericalangle DY_1X_1 = \sphericalangle DAX_1,$$

tj. body A, X_1, D, Y_1 leží na kružnici, kterou nazveme κ .

Jestliže přímka AB neodděluje body X, Y (na obr. 31 body X_2, Y_2), ale existuje průsečík Z_2 přímek CX_2, AB , pak postupujeme jako v předchozím případě. Homotetické podle středu Z_2 jsou trojúhelníky Z_2DY_2, Z_2BC ; odtud odvodíme

$$\sphericalangle X_2AB = \sphericalangle X_2AD = \sphericalangle Z_2Y_2D,$$

tj.

$$\sphericalangle X_2AD + \sphericalangle X_2Y_2D = 180^\circ. \quad (3)$$

Protože čtyřúhelník ADY_2X_2 je konvexní, je tětíkový, tj. body A, D, Y_2, X_2 leží na kružnici κ .

Je-li $CX \parallel AB$ (X_3 na obr. 32), nevznikne bod Z . V tomto případě však je opět $\sphericalangle X_3CB = \sphericalangle X_3AB = \sphericalangle X_3AD$ (obvodové úhly) a mimoto $\sphericalangle X_3CB = \sphericalangle Y_3CB = \sphericalangle Y_3DB = \sphericalangle Y_3DA$ (protější úhly rovnoběžníku BDY_3C); proto platí

$$\sphericalangle X_3AD = \sphericalangle Y_3DA,$$


lichoběžník ADY_3X_3 je rovnoramenný, a tedy tětíkový.

b) Zbývá vyšetřit situaci, kdy body C, X, D leží v přímce (X_4 na obr. 33). Zvolíme bod Q přímky m tak, aby ležel v polorovině ABC ; pak platí


$$\sphericalangle QDX_4 = \sphericalangle QDC = \sphericalangle DCB = \sphericalangle X_4CB; \quad (4)$$

podle věty o obvodových úhlech je však

$$\sphericalangle X_4CB = \sphericalangle X_4AB = \sphericalangle X_4AD. \quad (5)$$




Obr. 32.



Obr. 33.

Spojíme-li (4), (5), dostaneme vzťah $\sphericalangle X_4AD = \sphericalangle QDX_4$. Odtud vyplýva, že kružnice κ prochádzajúcej body A, D, X_4 sa dotýká v bode D priamky m .

Iné riešenie. a) Východzia situácia je naznačená na obr. 34, kde okrem toho K znamená priesečník priamky AX so stranou BC a Q priesečník priamky AX s priamkou m . Keďže $BC \parallel m$, vyplýva stade, že $\sphericalangle CKX =$



Obr. 34.

$= \sphericalangle XQY$ a $\sphericalangle XCK = \sphericalangle QYX$, pretože sú to uhly striedavé. Uhly $\sphericalangle XCB$ a $\sphericalangle XAB$ sú obvodové uhly prislúchajúce tomu istému oblúku kružnice k , preto sú zhodné. Z toho vyplýva, že $\triangle XYQ \sim \triangle DAQ$ (podľa vety *uu*). Z podobnosti oboch trojuholníkov vyplýva:

$$QX : QY = QD : QA \text{ alebo } QX \cdot QA = QD \cdot QY. (1)$$

Zo vzťahu (1) vyplýva na základe vzťahu pre mocnosť bodu ku kružnici, že body A, X, D, Y ležia na kružnici κ .

b) Ak body C, X, D, Y ležia na priamke, tou istou úvahou dostaneme, že $\triangle XDQ \sim \triangle DAQ$, odkiaľ $QX : QD = QD : QA$ čiže $QA \cdot QX = QD^2$, čo znamená, že priamka m sa dotýka kružnice κ v bode D .

Riešil Erich Wiszt,
III.b SVŠ Banská Bystrica.