

Jan Mařík
Dirichletova úloha

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 82 (1957), No. 3, 257–282

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117257>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1957

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://dml.cz>

ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ MATEMATIKY

Vydává Matematický ústav ČSAV, Praha

SVAZEK 82 * PRAHA, 31. VII. 1957 * ČÍSLO 3

DIRICHLETOVA ÚLOHA

JAN MAŘÍK, Praha.

(Došlo dne 23. května 1956.)

DT:517.5

V práci je dokázána věta o existenci a unicítě řešení Dirichletovy úlohy v jisté třídě funkcí a věta o spojitě závislosti řešení na okrajových podmínkách. Nic se přitom nepředpokládá o omezenosti základní množiny.

1. V celé práci je m celé číslo > 1 . Symbolem \bar{A} (resp. $H(A)$) rozumíme uzávěr (resp. hranici) množiny A v určitém metrickém prostoru (zpravidla v m -rozměrném kartézském prostoru E_m); základní vlastnosti metrických prostorů budeme pokládat za známé. (Viz na př. [1]; kap. VI.)

Jestliže $a, b \in E_m$, $a = [a_1, \dots, a_m]$, $b = [b_1, \dots, b_m]$, klademe $a \cdot b = \sum_{i=1}^m a_i \cdot b_i$; dále píšeme $a^2 = a \cdot a$, $|a| = \sqrt{a^2}$. — Slovem „funkce“ rozumíme vždy konečnou reálnou funkci.

Řekneme, že funkce f je *harmonická* na otevřené množině $G \subset E_m$, je-li spojitá na G a platí-li pro každé $x \in G$

$$\Delta f(x) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i^2} = 0. \quad (0)$$

(Kromě spojitosti funkce f požadujeme tedy jen, aby v každém bodě $x \in G$ napsané derivace existovaly a splňovaly vztah (0); nic nepředpokládáme o spojitosti derivací funkce f . Uvidíme však, že každá harmonická funkce má spojitě derivace všech řádů.)

Bud' G otevřená množina v E_m , $H = H(G) \neq \emptyset$ (t. j. $\emptyset \neq G \neq E_m$); bud' f spojitá funkce na množině H . *Dirichletovou úlohou* (příslušnou k funkci f a množině G) rozumíme úlohu najít funkci, která je spojitá na \bar{G} , harmonická na G a která se na množině H shoduje s funkcí f . Úkolem tohoto článku je zkoumat existenci a jednoznačnost řešení Dirichletovy úlohy. Snadno se zjistí (viz cvič. 2), že řešení existuje nejvýš jedno, když množina G je omezená;

není-li množina G omezená, existuje (podle cvič. 5) nejvýš jedno řešení, které má v nekonečnu limitu 0. Udáme podmínky, postačující k tomu, aby pro každou omezenou spojitou funkci na množině H existovalo řešení Dirichletovy úlohy; určíme pak jistou třídu funkcí, v níž existuje právě jedno řešení.

Základní vlastnosti harmonických funkcí probereme nyní v řadě cvičení s podrobným návodem. Ve cvičeních 14–19 budeme používat také některých vět z integrálního počtu; cvičení jsou tak sestavena, abychom vystačili s větami z prvních sedmi kapitol Jarníkovy učebnice [2]. (Nikde se tedy nemluví o plošném integrálu.) Výsledků cvič. 14–22, z nichž některá jsou poněkud obtížná, se však používá jen ve cvič. 23–24 a později v odst. 16 v poznámce, která není příliš důležitá. Čtenář může proto postupovat také tak, že cvič. 14–22 a poznámku v odst. 16 vynechá a výsledkům cvič. 23–24 prostě uvěří. Jinak se pojem integrálu vyskytuje jen v odst. 21; zde se však vystačí s nejjednoduššími vlastnostmi jednorozměrného integrálu.

Cvičení 1. Buď G neprázdná omezená otevřená část E_m ; buď f funkce spojitá na \bar{G} a harmonická na G . Potom existují body $b_1, b_2 \in H(G)$ takové, že pro každé $x \in \bar{G}$ platí $f(b_1) \leq f(x) \leq f(b_2)$. (Návod. Buď M_f (resp. m_f) maximum funkce f na množině \bar{G} (resp. $H(G)$). Necht $M_f > m_f$. Zvolíme-li dosti malé $\varepsilon > 0$, platí pro funkci $g(x) = f(x) + \varepsilon x^2$ také $M_g > m_g$. Buď $M_g = g(y)$. Protože $y \in G$, je $\frac{\partial^2 g(y)}{\partial x_i^2} \leq 0$ pro $i = 1, \dots, m$, tedy $\Delta g(y) \leq 0$. Je však $\Delta g(y) = \Delta f(y) + 2m\varepsilon > 0$ – spor.)

Cvičení 2. Buď G neprázdná omezená otevřená část E_m ; buďte funkce f, g spojité na \bar{G} a harmonické na G . Buď ε kladné číslo a necht pro všechna $x \in H(G)$ platí $|f(x) - g(x)| < \varepsilon$. Potom je $|f(x) - g(x)| < \varepsilon$ pro každé $x \in \bar{G}$. Je-li zejména $f(x) = g(x)$ pro každé $x \in H(G)$, je $f(x) = g(x)$ pro každé $x \in \bar{G}$. (Návod. Použijte cvič. 1 na funkci $f - g$.)

Cvičení 3. Buď P metrický prostor, $A, B \subset P$. Potom

$$H(A \cap B) \subset H(A) \cup H(B). \quad (1)$$

Je-li množina B otevřená, platí

$$\bar{A} \cap B \subset \overline{A \cap B}. \quad (2)$$

Cvičení 4. Buď G neprázdná otevřená část E_m ; buď f funkce spojitá na \bar{G} a harmonická na G . Necht $f(x) \leq 0$ pro každé $x \in H(G)$; necht $f(x) \rightarrow 0$ pro $x \in G, |x| \rightarrow \infty$.¹⁾ Potom je $f(x) \leq 0$ pro každé $x \in G$. (Návod. Zvolme $\varepsilon > 0$,

¹⁾ Je-li $M \subset E_m, c \in E_1$, pak symbolem

$$f(x) \rightarrow c \text{ pro } x \in M, |x| \rightarrow \infty \quad (3)$$

nebo výrokem „funkce f má pro $x \in M, |x| \rightarrow \infty$ limitu c “ (a pod.) budeme rozumět toto: Ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $A > 0$ tak, že pro všechna $x \in M$, pro něž je $|x| > A$, platí $|f(x) - c| < \varepsilon$. Je-li tedy množina M omezená, budeme vztah (3) pokládat za správný při libovolné funkci f a libovolném $c \in E_1$.

$y \in G$. Existuje $A > |y|$ tak, že pro všechna $x \in \bar{G}$, pro něž je $|x| \geq A$, platí $f(x) < \varepsilon$. Buď $K = E[x; |x| < A]$. Ze vztahu $H(K \cap G) \subset H(K) \cup H(G)$ (viz (1), cvič. 3) a z cvič. 1 plyne $f(y) < \varepsilon$.

Cvičení 5. Pomocí cvič. 4 dokažte, že k dané Dirichletově úloze existuje nejvýše jedno řešení, které má pro $|x| \rightarrow \infty$ limitu 0.

Cvičení 6. Buď G otevřená část E_m . Necht funkce f, g mají na množině G spojitě derivace prvního (resp. druhého) řádu. Potom platí na množině G

$$\text{grad}(f \cdot g) = f \cdot \text{grad} g + g \cdot \text{grad} f$$

$$(\text{resp. } \Delta(f \cdot g) = f \cdot \Delta g + 2 \text{grad} f \cdot \text{grad} g + g \cdot \Delta f).$$

Cvičení 7. Buď G (resp. U) otevřená část E_m (resp. E_n ; n je libovolné přirozené číslo). Necht funkce f má spojitě derivace 2. řádu na množině U . Buď $\varphi = [\varphi_1, \dots, \varphi_n]$ zobrazení množiny G do množiny U ; necht funkce $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ mají spojitě derivace 2. řádu. Buď $g(t) = f(\varphi(t))$ ($t \in G$). Potom je $\Delta g(t) = \sum_{j,k=1}^n \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_j \partial x_k} \cdot \text{grad} \varphi_j(t) \cdot \text{grad} \varphi_k(t) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_j} \Delta \varphi_j(t)$ ($t \in G, x = \varphi(t)$). Pro $n = 1$ je tedy $\Delta g = f'' \cdot (\text{grad} \varphi)^2 + f' \cdot \Delta \varphi$.

Cvičení 8. Pro $x \neq 0$ (píšeme $0 = [0, \dots, 0]$) platí $\text{grad} |x|^\alpha = \alpha |x|^{\alpha-2} \cdot x$, $\Delta |x|^\alpha = \alpha(\alpha + m - 2) |x|^{\alpha-2}$ (α reálné). Pro $m = 2, x \neq 0$ je $\Delta \log |x| = 0$; pro každé $m, x \neq 0$ je $\Delta |x|^{2-m} = 0$. (Návod. Je-li $\varphi(x) = x^2$ ($x \in E_m$), $f(y) = y^{1+\alpha}$ ($y > 0$), $g(x) = f(\varphi(x))$, je $\text{grad} \varphi(x) = 2x$, $\Delta \varphi(x) = 2m$ a tedy podle cvič. 7 $\Delta g = \frac{1}{2}\alpha \cdot (\frac{1}{2}\alpha - 1) \cdot y^{1+\alpha-2} \cdot 4x^2 + \frac{1}{2}\alpha \cdot y^{1+\alpha-1} \cdot 2m$.)

Cvičení 9. Buď G otevřená část $E_m, 0 \notin G$. Necht funkce f má spojitě derivace 2. řádu na množině G . Buď $R > 0$; pro $t \in E_m, t \neq 0$ buď $\varphi(t) = \frac{R^2 t}{t^2}$. Je $\varphi(\varphi(t)) = t$. Pro $t \in \varphi(G)$ položme $g(t) = f(\varphi(t))$. Potom je $\Delta g(t) = \frac{R^4}{|t|^4} \cdot \Delta f(x) - 2R^2 \cdot \frac{m-2}{|t|^4} \cdot t \cdot \text{grad} f(x)$ ($t \in \varphi(G), x = \varphi(t)$). (Návod. Buď $\delta_{ik} = 0$ pro $i \neq k, \delta_{ii} = 1$; položme $e_i = [\delta_{i1}, \dots, \delta_{im}]$. Píšeme-li $\frac{R^2 t}{t^2} = [\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)]$, je (podle cvič. 6 a 8) $\text{grad} \varphi_i(t) = \frac{R^2}{|t|^4} (e_i t^2 - 2t t_i)$, $\Delta \varphi_i(t) = -2(m-2) \frac{R^2 t_i}{|t|^4}$; dále je $\text{grad} \varphi_i(t) \cdot \text{grad} \varphi_k(t) = \frac{R^4}{|t|^4} \delta_{ik}$. Nyní použijeme cvič. 7.)

Cvičení 10. Předpoklady jako v cvič. 9. Položme $h(t) = |t|^{2-m} \cdot f(\varphi(t))$ ($t \in \varphi(G)$). Potom je $\Delta h(t) = \frac{R^4}{|t|^{m+2}} \Delta f(x)$ ($x = \varphi(t)$). (Plyne z cvič. 6, 8, 9.)

²⁾ $\text{grad} f(x) = \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_m} \right]$.

Cvičení 11. Buď G otevřená množina v E_2 , $H(G) \neq \emptyset$. Buď f funkce, která je spojitá a shora omezená na \bar{G} a harmonická na G ; necht' $f(x) \leq 0$ pro každé $x \in H(G)$. Potom je $f(x) \leq 0$ pro každé $x \in \bar{G}$. (Návod. Zvolme $y \in G$, $b \in H(G)$, $\varepsilon > 0$; dále zvolme $\delta > 0$ ($\delta < \min(|y - b|, 1)$) tak; aby bylo $f(x) < \varepsilon$ pro každé $x \in \bar{G}$, pro něž $|x - b| \leq \delta$. Necht' $f(x) < C$ pro každé $x \in \bar{G}$, $C > \varepsilon$. Nyní můžeme určit $A > |y - b|$ tak, aby bylo $(C - \varepsilon) \log|y - b| - C \log \delta < \varepsilon \cdot \log A$; pro $x \neq b$ položíme $g(x) = \frac{(C - \varepsilon) \log|x - b| + \varepsilon \log A - C \log \delta}{\log A - \log \delta}$.

Funkce g je harmonická. Buď K (resp. L) otevřený kruh o středu b a poloměru δ (resp. A). Na $H(K) \cap \bar{G}$ je $g(x) = \varepsilon > f(x)$; na $H(L) \cap \bar{G}$ je $g(x) = C > f(x)$; na $H(G) - K$ je $g(x) \geq \varepsilon > 0 \geq f(x)$. Podle (1) (cvič. 3) je $g(x) > f(x)$ pro každé $x \in H((G \cap L) - \bar{K})$ a podle cvič. 1 je $f(y) < g(y) < 2\varepsilon$.

Cvičení 12. Z předešlého cvičení odvodte větu, že pro $m = 2$ existuje k dané Dirichletově úloze nejvýš jedno řešení ve třídě omezených funkcí. Pomocí cvič. 5 dokažte, že pro libovolné $m (> 1)$ existuje nejvýš jedno řešení ve třídě funkcí F , pro něž je funkce $|x|^{m-2} \cdot F(x)$ omezená.

Cvičení 13. Buď $G \subset E_m$ poloprostor všech $[x, y]$, kde $x \in E_{m-1}$, $y > 0$; buď f shora omezená spojitá funkce na G , která je harmonická na G a nekladná na $H(G)$. Potom je funkce f nekladná na \bar{G} . Je-li tedy $f_1(x) = f_2(x)$ pro každé $x \in H(G)$, při čemž f_1, f_2 jsou omezené funkce spojitě na \bar{G} a harmonické na G , je $f_1(x) = f_2(x)$ pro každé $x \in \bar{G}$. (Návod. Podle cvič. 11 stačí vyšetřit $m > 2$. Buď $y \in G$, $\varepsilon > 0$; necht' $f(x) < c$ pro všechna $x \in G$. Zvolíme-li dosti velké číslo β a položíme-li $b = [0, \dots, 0, -\beta]$, je $c \left(1 - \left(\frac{\beta}{|y - b|}\right)^{m-2}\right) < \varepsilon$.

Buď dále R tak velké, aby platilo jednak $R > |y - b|$, jednak $c \left(\frac{\beta}{R}\right)^{m-2} < \varepsilon$; buď K otevřená koule o středu b a poloměru R . Položíme-li $g(x) = \varepsilon + c \left(1 - \left(\frac{\beta}{|x - b|}\right)^{m-2}\right)$, je $g(x) \geq \varepsilon$ pro $x \in H(G)$, $g(x) > c$ pro $x \in H(K)$, tedy (viz (1), cvič. 3) $g(x) > f(x)$ pro $x \in H(G \cap K)$. Podle cvič. 1 je $f(y) < g(y) < 2\varepsilon$.)

Cvičení 14. Buď f spojitá funkce v intervalu $\langle 0, A \rangle$. Buď K m -rozměrná koule o středu 0 a poloměru A . Potom platí

$$\int_K f(|x|) dx = m\kappa \int_0^A t^{m-1} f(t) dt,$$

kde κ je objem jednotkové koule v E_m . (Návod. Pro $y \in \langle 0, A \rangle$ položíme $F(y) = \int_{|x| \leq y} f(|x|) dx$. Necht' $0 \leq y < y + h \leq A$; necht' $\mu \leq f(t) \leq M$ pro $t \in (y, y + h)$. Potom je $F(y + h) - F(y) = \int_{y < |x| \leq y + h} f(|x|) dx$, tedy $\mu(\kappa(y + h)^m - \kappa y^m) \leq F(y + h) - F(y) \leq M(\kappa(y + h)^m - \kappa y^m)$; odtud plyne $F'(y) = \kappa m y^{m-1} \cdot f(y)$.)

Cvičení 15. Integrál $\int_{E_m} \frac{dx}{(x^2 + \delta)^{\frac{m+1}{2}}}$ konverguje, je-li $\delta > 0$. (Plyne z cvič. 14.)

Cvičení 16. Parciální derivace řádu n funkce $|x|^\alpha$ mají tvar $|x|^{\alpha-2n} \cdot P(x)$, kde P je polynom stupně nejvýš n . (Dokáže se indukcí.)

Cvičení 17. Buď f omezená měřitelná funkce v E_{m-1} . Pro $x \in E_{m-1}$, $y > 0$ položme

$$F(x, y) = y \cdot \int_{E_{m-1}} \frac{f(t) dt}{((x-t)^2 + y^2)^{\frac{m}{2}}}. \quad (4)$$

Potom je funkce F harmonická a má spojité derivace všech řádů. (Návod. Pišme $z = [x, y]$, $\lambda(t) = [t, 0]$. Parciální derivace funkce za integračním znamením v (4) mají (při pevném t) podle cvič. 16 tvar $T = \frac{f(t) \cdot P(z - \lambda(t))}{|z - \lambda(t)|^{m+2n}}$, kde P je polynom stupně nejvýš n . Abychom mohli použít věty o derivování za integračním znamením (viz na př. [2], str. 281–2), je třeba nalézt „integrovatelnou majorantu“. Zvolme $A > 0$, $\delta > 0$ a vyšetřujme množinu $|x| < A$, $y > \delta$. Protože $|z - \lambda(t)| > \delta > 0$, je $|P(z - \lambda(t))| \leq C_1 |z - \lambda(t)|^{2n}$, tedy $|T| \leq \frac{C_2}{|z - \lambda(t)|^m}$. Pro $|t| \leq 2A$ je $|T| \leq \frac{C_2}{\delta^m}$; pro $|t| > 2A$ je $|x - t| > \frac{1}{2}|t|$, $(x-t)^2 + y^2 \geq \frac{1}{4}t^2 + \delta^2$, takže je $|T| \leq \frac{C_2}{(\frac{1}{4}t^2 + \delta^2)^{\frac{m}{2}}}$. Integrál této

funkce (přes E_{m-1}) konverguje podle cvič. 15. — Funkce $\frac{y}{((x-t)^2 + y^2)^{\frac{m}{2}}}$ je harmonická pro každé t (to se dá zjistit na př. pomocí cvič. 6 a 8); derivováním za integračním znamením zjistíme, že i funkce F je harmonická.)

Cvičení 18. Buď f omezená spojitá funkce v E_{m-1} . Definujme pro $x \in E_{m-1}$, $y \geq 0$ funkci F předpisem

$$F(x, 0) = f(x), \quad F(x, y) = \frac{1}{\gamma} \int_{E_{m-1}} \frac{f(t) \cdot y \cdot dt}{((x-t)^2 + y^2)^{\frac{m}{2}}} \quad (y > 0),$$

kde $\gamma = \int_{E_{m-1}} \frac{dv}{(v^2 + 1)^{\frac{m}{2}}}$. Potom je funkce F spojitá. Je-li $|f(t)| \leq C$ ($t \in E_{m-1}$), je $|F(x, y)| \leq C$ ($x \in E_{m-1}$, $y \geq 0$). Je-li $A \in E_1$ a je-li $f(t) = 0$ pro $|t| > A$, je funkce $|z|^{m-1} \cdot F(z)$ omezená. Je-li funkce f nezáporná, ne však identicky rovná nule, je $F(x, y) > 0$ pro $x \in E_{m-1}$, $y > 0$. (Návod. Substitucí $t = vy + x$ ($y > 0$) dostaneme $F(x, y) = \frac{1}{\gamma} \int_{E_{m-1}} \frac{f(x + vy) dv}{(v^2 + 1)^{\frac{m}{2}}}$ (platí i pro $y = 0$). Jestliže $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$, pak $f(x_n + vy_n) \rightarrow f(x + vy)$, $|f(x_n + vy_n)| \leq C$, takže

podle věty 65 z [2] (str. 121) a podle cvič. 15 máme $F(x_n, y_n) \rightarrow F(x, y)$. Je-li $f(t) = 0$ pro $|t| > A$, je $|F(z)| \cdot |z|^{m-1} \leq \left(\frac{|z|}{|z| - A}\right)^m \cdot \text{konst.}$ pro $|z| > A$.

Cvičení 19. Buď G poloprostor z cvič. 13. Buď F_1, F_2, \dots omezená posloupnost funkcí, které jsou spojité na \bar{G} a harmonické na G . Necht pro každé $z \in \bar{G}$ existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(z) = F(z)$. Potom je funkce F harmonická na G a má tam spo-

jité derivace všech řádů. (Návod. Položme $f_n(t) = F_n(t, 0)$, $f(t) = F(t, 0)$ ($t \in E_{m-1}$). Zvolme $z = [x, y]$ ($x \in E_{m-1}$, $y > 0$). Podle cvič. 13, 17, 18 je

$$F_n(x, y) = \frac{1}{\gamma} \int_{E_{m-1}} \frac{f_n(t) \cdot y \cdot dt}{((x-t)^2 + y^2)^{\frac{m}{2}}};$$

$$F_n(x, y) \rightarrow \frac{1}{\gamma} \int_{E_{m-1}} \frac{f(t) \cdot y \cdot dt}{((x-t)^2 + y^2)^{\frac{m}{2}}} = F(x, y).$$

Cvičení 20. Buď K otevřená koule o středu 0 a poloměru R ; buď G poloprostor z cvič. 13. Necht $b = [0, \dots, 0, -R]$. Pro $z \neq 2b$ položme $\varphi(z) = b + (z - 2b) \cdot \frac{4R^2}{(z - 2b)^2}$; pro $w \neq b$ položme $\psi(w) = 2b + (w - b) \cdot \frac{4R^2}{(w - b)^2}$.

Potom je $\varphi(G) = K$, $\varphi(H(G)) = H(K) - \{b\}$, zobrazení φ je prosté a ψ je příslušné inverzní zobrazení. (Návod. Necht $z \neq 2b$, $w = \varphi(z)$. Potom

$$w^2 = b^2 + b \cdot (z - 2b) \cdot \frac{8R^2}{(z - 2b)^2} + \frac{16R^4}{(z - 2b)^2} = b^2 + \frac{8R^2}{(z - 2b)^2} \cdot b \cdot z. \quad (5)$$

Pro $z \in G$ (resp. $z \in \bar{G}$) je tedy $|w| < R$ (resp. $|w| \leq R$). Buď naopak $w \in K$; položme $z = \varphi(w)$. Zřejmě $z \neq 2b$; protože $\varphi(z) = w$, $|w| < R$, je podle (5) $b \cdot z < 0$, $z \in G$. Je tedy $\varphi(G) = K$. Podobně se zjistí, že $\varphi(H(G)) = H(K) - \{b\}$. Je-li $\varphi(z_1) = \varphi(z_2)$, je $z_1 = \psi(\varphi(z_1)) = \psi(\varphi(z_2)) = z_2$.

Cvičení 21. Ponechme označení předešlého cvičení. Buď F funkce na množině G , která je harmonická a má spojité derivace 2. řádu. Potom je funkce $|w - b|^{2-m} \cdot F(\varphi(w))$ harmonická pro $w \in K$. (Návod. Utvořme zobrazení $\lambda(t) = t \cdot \frac{4R^2}{t^2}$, funkce $F_1(z) = F(2b + z)$, $F_2(t) = |t|^{2-m} \cdot F_1(\lambda(t))$, $F_3(w) = F_2(w - b) = |w - b|^{2-m} \cdot F(\varphi(w))$ a použijeme cvič. 10.)

Cvičení 22. Ponechme označení ze cvič. 20. Každé funkci f , spojité na množině $H(K)$, přiřadme funkce $C_f(z)$ ($z \in \bar{G}$), $D_f(w)$ ($w \in \bar{K}$) tímto předpisem: C_f je omezené řešení Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci $(4R^2)^{m-2} \cdot |z - 2b|^{2-m} \cdot f(\varphi(z))$ ($z \in H(G)$) a množině G (podle cvič. 13, 17, 18 existuje takové řešení právě jedno a má na G spojité derivace všech řádů); $D_f(w) = |w - b|^{2-m} \cdot C_f(\varphi(w))$ ($w \in \bar{K} - \{b\}$), $D_f(b) = f(b)$. Potom je funkce D_f spojitá na \bar{K} a je

$D_f(w) \doteq f(w)$ pro každé $w \in H(K)$. (Návod. Je-li $f(w) = 1$ ($w \in H(K)$), je $C_f(z) = (4R^2)^{m-2} \cdot |z - 2b|^{2-m}$ ($z \in \bar{G}$); protože $|\varphi(w) - 2b| = \frac{4R^2}{|w - b|}$ ($w \neq b$), je $D_f(w) = 1$ ($w \in \bar{K}$). Je-li $f(w) = 0$ pro všechna $w \in H(K)$, dostatečně blízká k b , je podle cvič. 18 funkce $|z|^{m-1} \cdot C_f(z)$ a tedy i $|z - 2b|^{m-1} \cdot C_f(z)$ omezená; potom je omezená také funkce $|\varphi(w) - 2b|^{m-1} \cdot C_f(\varphi(w)) = (4R^2)^{m-1} \cdot |w - b|^{1-m} \cdot C_f(\varphi(w)) = (4R^2)^{m-1} \cdot |w - b|^{-1} \cdot D_f(w)$ ($w \in \bar{K} - \{b\}$), takže funkce D_f je spojitá v bodě b . Funkce D_f je tedy spojitá v bodě b také tehdy, když existuje okolí U bodu b a číslo α tak, že $f(w) = \alpha$ pro každé $w \in U \cap H(K)$. Je-li nyní f libovolná spojitá funkce na $H(K)$, zvolíme $\varepsilon > 0$ a položíme $g(w) = \min(f(w), f(b) - \varepsilon)$, $h(w) = \max(f(w), f(b) + \varepsilon)$; ze zřejmého vztahu $D_g \leq \leq D_f \leq D_h$ plyne snadno spojitost funkce D_f v bodě b .)

Cvičení 23. Buď L otevřená m -rozměrná koule. Potom ke každé spojitě funkci f na $H(L)$ existuje (podle cvič. 2 právě jedno) řešení F příslušné Dirichletovy úlohy. Je-li f nezáporná funkce, která není identicky rovna nule, je $F(x) > > 0$ pro každé $x \in L$. (Návod. Buď L koule o středu s a poloměru R . Pro $|x| = R$ položme $g(x) = f(x + s)$. Podle cvič. 21–22 je funkce $D_g(x - s)$ řešením naší úlohy. Je-li $f \geq 0$, ne však $f(x) = 0$ pro všechna $x \in H(L)$, je podle cvič. 18 $C_g(z) > 0$ pro $z \in G$, tedy $F(x) = D_g(x - s) > 0$ pro $x \in L$.)

Cvičení 24. Buď G libovolná otevřená množina v E_m ; buď F_1, F_2, \dots omezená posloupnost funkcí harmonických na G . Nechť pro každé $x \in G$ existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$. Potom je funkce F harmonická na G a má tam spojitě derivace všech řádů. (Návod. Buď L uzavřená koule o středu s a poloměru R , $L \subset G$. Položme $f_n(x) = F_n(x + s)$ ($|x| = R$) a utvořme funkce C_{f_n}, D_{f_n} podle cvič. 22. Z cvič. 19 plyne, že funkce $\Phi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_{f_n}(x)$ je harmonická (na otevřeném poloprostoru) a má tam spojitě derivace všech řádů; funkce $\Psi(x) = |x - b|^{2-m} \cdot \Phi(\varphi(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} D_{f_n}(x)$ ($|x| < R$) je tedy podle cvič. 21 harmonická. Je však $D_{f_n}(x) = F_n(x + b)$, tedy $\Psi(x) = F(x + b)$ ($|x| < R$.)

Cvičení 25. Harmonická funkce má spojitě derivace všech řádů. (Plyne snadno z předešlého cvičení.)

Cvičení 26. Buď G otevřená část E_m ; buď funkce f spojitá na \bar{G} a harmonická na G . Buď φ isometrické zobrazení prostoru E_m na E_m . Potom je funkce $f(\varphi^{-1}(x))$ spojitá na $\overline{\varphi(G)}$ a harmonická na $\varphi(G)$. (Návod. Tvar isometrických zobrazení prostoru E_m na E_m je popsán v [1], kap. VI, § 3, příklad 3 (str. 238–240). Nyní použijeme cvič. 7 (a cvič. 25).)

Cvičení 27. Buď P metrický prostor. Nechť množiny A, B jsou buď obě otevřené nebo obě uzavřené v P a necht $P = A \cup B$. Buď f funkce na množině P ; f buď spojitou funkcí na prostoru A i na prostoru B . Potom je funkce f spojitá na P .

Cvičení 28. Necht $A \subset E_m$, $b \in E_m$, $H(A) = \{b\}$. Potom je buď $A = \{b\}$ nebo $A = E_m - \{b\}$. Je-li tedy množina A uzavřená (resp. otevřená), je $A = \{b\}$ (resp. $A = E_m - \{b\}$). (Návod. Množina $M = E_m - \{b\}$ je souvislá a $M \cap H(A) = \emptyset$. Je tudíž buď $M \subset A$ nebo $M \subset E_m - A$.)

Cvičení 29. Buď f spojitá funkce na otevřené množině $G \subset E_m$; buď K otevřená koule, $\bar{K} \subset G$. Potom existuje právě jedna funkce g , která má tyto vlastnosti: Je spojitá na G , harmonická na K a shoduje se s f na $G - K$. (Návod. Podle cvič. 23 existuje (právě jedna) funkce g_1 , která je spojitá na \bar{K} , harmonická na K a shoduje se s f na $H(K)$. Položíme-li $g(x) = g_1(x)$ pro $x \in K$, $g(x) = f(x)$ pro $x \in G - K$, je funkce g spojitá na \bar{K} i na $G - K$; podle cvič. 27 je spojitá i na G .)

Cvičení 30. Funkci g ze cvič. 29 označme symbolem f_K . Jsou-li φ, ψ spojitě funkce na otevřené množině G a je-li $\alpha \in E_1$, pak pro každou kouli K ($\bar{K} \subset G$) je $(\varphi + \psi)_K = \varphi_K + \psi_K$, $(\alpha\varphi)_K = \alpha \cdot \varphi_K$; je-li $\varphi \geq \psi$, je též $\varphi_K \geq \psi_K$.

2. Označení f_K , zavedeného ve cvič. 30, budeme stále používat. Buď f spojitá funkce na otevřené množině $G \subset E_m$. Řekneme, že funkce f je *superharmonická* na množině G , jestliže ke každému bodu $b \in G$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro každou kouli K o středu b a poloměru menším než δ platí

$$f_K(b) \leq f(b).$$

(Tím je řečeno, že pro každou takovou kouli K je $\bar{K} \subset G$.) — Každá harmonická funkce je zřejmě superharmonická.

3. Lemma. *Budte G_1, G_2 otevřené množiny v E_m . Na množině $G = G_1 \cup G_2$ mějme funkci f , která je superharmonická na G_1 i na G_2 . Potom je funkce f superharmonická i na množině G .*

Důkaz. Podle cvič. 27 je funkce f spojitá na G . Je-li $b \in G$, pak zřejmě pro každou dosti malou kouli K o středu b je $f_K(b) \leq f(b)$.

4. Lemma. *Budte φ, ψ superharmonické funkce na otevřené množině $G \subset E_m$; buď α nezáporné číslo. Potom jsou též funkce $\alpha\varphi, \varphi + \psi, \min(\varphi, \psi)$ superharmonické na G .*

Důkaz. Zvolme $b \in G$. Je-li K dosti malá koule o středu b , je $\varphi_K(b) \leq \varphi(b)$, $\psi_K(b) \leq \psi(b)$. Potom však podle cvič. 30 platí $(\alpha\varphi)_K(b) = \alpha \varphi_K(b) \leq \alpha \varphi(b)$, $(\varphi + \psi)_K(b) = \varphi_K(b) + \psi_K(b) \leq (\varphi + \psi)(b)$, a je-li na př. $\varphi(b) \leq \psi(b)$, platí též $(\min(\varphi, \psi))_K(b) \leq \varphi_K(b) \leq \varphi(b) = (\min(\varphi, \psi))(b)$.

5. Lemma. *Buď G otevřená část E_m . Buď funkce f spojitá na \bar{G} a superharmonická na G ; necht existuje $a \in \bar{G}$ tak, že pro každé $x \in G$ je $f(x) \geq f(a)$. Buď $A = E[x; x \in \bar{G}, f(x) = f(a)]$. Potom $H(A) \subset H(G)$.*

Důkaz. Předpokládejme, že tvrzení věty neplatí. Potom existuje $b \in H(A) \cap G$ a k bodu b můžeme určit číslo δ podle odst. 2. Existuje c tak, že $|c - b| < \delta$ (tedy $c \in G$) a zároveň $c \notin A$ neboli $f(c) > f(a)$. Protože množina A je uza-

vřená, je $H(A) \subset A$, tedy $b \in A$, $f(b) = f(a)$, $f(c) > f(b)$. Buď K koule o středu b a poloměru $|c - b|$. Pro každé $x \in G$ a tedy i pro každé $x \in H(K)$ je $f(x) \geq f(b)$; protože $f(c) > f(b)$, je podle cvič. 23 také $f_x(b) > f(b)$. To však odporuje volbě čísla δ ; tento spor dokazuje naše tvrzení.

6. Lemma. *Buď G neprázdná omezená otevřená část E_m ; buď f funkce spojitá na \bar{G} a superharmonická na G . Potom existuje $b \in H(G)$ tak, že pro každé $x \in \bar{G}$ je $f(x) \geq f(b)$.*

Důkaz. Zřejmě jsou splněny předpoklady lemmatu 5. Zachováme-li označení, vidíme, že $\emptyset \neq A \neq E_m$, tedy $H(A) \neq \emptyset$. Protože $H(A) \subset H(G)$, můžeme za bod b vzít libovolný prvek množiny $H(A)$.

7. Lemma. *Buď G_0 omezená otevřená množina, G buď otevřená množina (v E_m); nechť $\bar{G}_0 \subset G$. Buď f funkce superharmonická na G . Buď g funkce, která má tyto vlastnosti: $g(x) = f(x)$ pro $x \in G - G_0$, funkce g je spojitá na G a harmonická na G_0 . Potom je $f(x) \geq g(x)$ pro každé $x \in G$ a funkce g je superharmonická na G .*

Důkaz. Funkce $f - g$ je na \bar{G}_0 spojitá a na G_0 superharmonická. Protože $f(x) = g(x)$ pro každé $x \in H(G_0)$, je podle lemmatu 6 $f(x) \geq g(x)$ pro každé $x \in G_0$ a tedy pro každé $x \in G$. Zvolme nyní $b \in G$. Je-li $b \in G - G_0$, je pro každou kouli K o středu b , pro niž $\bar{K} \subset G$, splněn vztah $g_x(b) \leq f_x(b) \leq f(b) = g(b)$; je-li však $b \in G_0$, pak pro každou dosti malou kouli K o středu b platí $g_x(b) = g(b)$. Funkce g je tudíž superharmonická.

Poznámka. Je-li tedy funkce f superharmonická na G , pak pro každou kouli K ($\bar{K} \subset G$) platí $f_x \leq f$ a funkce f_x je opět superharmonická.

8. Řekneme, že množina $G \subset E_m$ je *regulární*, jestliže má tuto vlastnost: Je otevřená, $H(G) \neq \emptyset$ a ke každému bodu $b \in H(G)$ existuje okolí U bodu b a funkce φ , která je spojitá na $U \cap \bar{G}$ a superharmonická na $U \cap G$, při čemž $\varphi(b) = 0$ a $\varphi(x) > 0$ pro každé $x \in U \cap \bar{G}$, $x \neq b$. Funkci φ nazveme *bariérou* (příslušnou k bodu b a množině G). Systém všech regulárních množin označíme symbolem \mathfrak{G}^m nebo prostě \mathfrak{G} .

Poznámka. Nechť existuje koule K o středu s tak, že $K \cap G = \emptyset$, $b \in \bar{K}$; buď $s_1 = \frac{1}{2}(b + s)$. Je-li $m > 2$ (resp. $m = 2$), položme $\varphi(x) = |b - s_1|^{-m+2} - |x - s_1|^{-m+2}$ (resp. $\log|x - s_1| - \log|b - s_1|$). Potom je funkce φ bariérou. (Viz cvič. 8.) Odtud plyne na př., že každá otevřená konvexní množina s neprázdnou hranicí je regulární. K bodu b lze sestrojít bariéru také tehdy, když existuje kužel, který neprotne množinu G a má vrchol v bodě b . (Viz [3], str. 213.) Jiné účinné kritérium regularity je obsaženo ve větě 23.

9. Lemma. *Buď G otevřená část E_m ; nechť $H = H(G) \neq \emptyset$ a nechť ke každému $b \in H$ existuje $U \in \mathfrak{G}$ tak, že $G \subset U$, $b \in H(U)$. Potom je $G \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Za bariéru k bodu b a množině G lze vzít bariéru, sestrojenou k bodu b a množině U .

10. Věta. *Nechť $G_1, G_2 \in \mathfrak{G}$, $G = G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$. Potom je $G \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Zvolme $b \in H(G)$. Podle (1), cvič. 3 je $H(G) \subset H(G_1) \cup H(G_2)$. Je-li na př. $b \in H(G_1)$, použijeme předešlého lemmatu, kde volíme $U = G_1$.

11. Věta. *Buď G neprázdná otevřená část E_m ; necht její komplement obsahuje aspoň dva body. Dále předpokládejme, že ke každé nezáporné omezené spojitě funkci na hranici H množiny G existuje nezáporné řešení příslušné Dirichletovy úlohy. Potom je $G \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Zvolme $b \in H$ a definujme na množině H funkci f předpisem $f(x) = \min(|x - b|, 1)$. Buď φ nezáporné řešení příslušné Dirichletovy úlohy; buď $A = E[x; x \in \bar{G}, \varphi(x) = 0]$. Protože množina A je uzavřená, je podle lemmatu 5 $H(A) \subset H \cap A = \{b\}$; podle cvič. 28 je buď $A = \{b\}$ nebo $A = E_{\alpha}$. Kdyby však bylo $A = E_m$, bylo by $H = H \cap A = \{b\}$ a tedy (viz opět cvič. 28) $E_m - G = \{b\}$ proti předpokladu. Je tedy $A = \{b\}$ neboli $\varphi(x) > 0$ pro každé $x \in \bar{G}$, $x \neq b$. Funkce φ je tudíž bariérou.

Poznámka. Obsahuje-li komplement množiny G právě jeden bod b , pak ke každé nezáporné spojitě funkci na množině $H(G) = \{b\}$ zřejmě existuje nezáporné řešení příslušné Dirichletovy úlohy (totiž konstanta), ale podle věty 15 není $G \in \mathfrak{G}$.

12. Buď G otevřená část E_m ; necht $H = H(G) \neq \emptyset$. Buď f nezáporná spojitá funkce na množině H . Řekneme, že Φ je *horní funkce* vzhledem k funkci f a množině G , jestliže funkce Φ je nezáporná a spojitá na \bar{G} , superharmonická na G a jestliže pro každé $x \in H$ platí $\Phi(x) \geq f(x)$.

Poznámka. Je-li funkce f omezená, pak zřejmě každá funkce $\Phi(x) = c$ ($x \in \bar{G}$), kde c je dosti velká konstanta, je horní funkcí vzhledem k f . K neomezené funkci f nemusí horní funkce existovat (viz poznámku v odst. 16).

13. Věta. *Buď $G \in \mathfrak{G}$; buď f nezáporná spojitá funkce na hranici H množiny G . Necht k funkci f existuje aspoň jedna horní funkce. Definujme na množině \bar{G} funkci F předpisem*

$$F(x) = \inf \Phi(x),$$

kde Φ probíhá všechny horní funkce k funkci f . Potom je F řešením Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci f a množině G ; je to nejmenší nezáporné řešení.

Důkaz. Buď Φ horní funkce k funkci f . Zvolme $b \in H = H(G)$, $\varepsilon > 0$. K bodu b určíme okolí U a funkci φ podle odst. 8. Buď dále K taková otevřená koule o středu b , že $\bar{K} \subset U$ a že pro každé $x \in H \cap K$ je $|f(x) - f(b)| < \varepsilon$; buď $S = H(K)$. Existuje $c \geq 0$ tak, že pro každé $x \in S \cap \bar{G}$ je $c\varphi(x) \geq \Phi(x)$. (Je-li $L = S \cap \bar{G} = \emptyset$, stačí položit $c = 0$; jinak můžeme psát $\alpha = \max_{x \in L} \Phi(x)$, $\beta = \min_{x \in L} \varphi(x)$, a protože $\alpha \geq 0$, $\beta > 0$, lze volit $c = \alpha \cdot \beta^{-1}$.) Dále položme $\omega(x) = f(b) + \varepsilon + c\varphi(x)$ ($x \in U \cap \bar{G}$) a definujme na množině \bar{G} funkci Ψ předpisem

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \min(\omega(x), \Phi(x)) \quad \text{pro } x \in \bar{G} \cap K, \\ \Psi(x) &= \Phi(x) \quad \text{pro } x \in \bar{G} - K. \end{aligned}$$

Buď B množina všech $x \in \overline{K} \cap G$, pro něž je $\omega(x) \leq \Phi(x)$. Množina B je uzavřená; pro $x \in S$ je $\omega(x) > c\varphi(x) \geq \Phi(x)$, takže $B \cap S = \emptyset$, $B \subset K \cap \overline{G}$. Pro $x \in \overline{G} - B$ je zřejmě $\Psi(x) = \Phi(x)$. Množiny $\overline{G} - B$, $\overline{G} \cap K$ jsou obě otevřené v prostoru \overline{G} , na obou z nich je funkce Ψ spojitá a jejich sjednocení je \overline{G} ; funkce Ψ je tedy (podle cvič. 27) spojitá na \overline{G} . Z lemmat 3, 4 plyne podobně, že je funkce Ψ superharmonická na množině G . Je-li $x \in H - K$, je $\Psi(x) = \Phi(x) \geq f(x)$; je-li $x \in H \cap K$, je $\omega(x) \geq f(b) + \varepsilon > f(x)$, tedy $\Psi(x) = \min(\omega(x), \Phi(x)) \geq f(x)$. Funkce Ψ je tudíž horní funkcí. Dále je $\Psi(b) \leq \omega(b) = f(b) + \varepsilon$. Protože funkce Ψ je spojitá a protože $F \leq \Psi$, platí pro všechna $x \in \overline{G}$, dosti blízka k b , vztah

$$F(x) < f(b) + 2\varepsilon. \quad (6)$$

Pro $x \in U \cap \overline{G}$ položme dále $\Omega(x) = \Phi(x) + d\varphi(x) - f(b) + \varepsilon$, kde číslo $d \geq 0$ je tak voleno, aby pro každé $x \in \overline{G} \cap S$ bylo $d\varphi(x) \geq f(b)$. Funkce Ω je superharmonická na množině $K \cap G$ a spojitá na $\overline{K} \cap \overline{G}$. Nechť bod x leží na hranici množiny $K \cap G$. Potom je podle (1), cvič. 3 buď $x \in S$ nebo $x \in H$. Je-li $x \in S$, je $\Omega(x) \geq d\varphi(x) - f(b) \geq 0$. Není-li $x \in S$, je $x \in H \cap K$, tedy $\Omega(x) \geq f(x) - f(b) + \varepsilon > 0$. Podle lemmatu 6 je pro každé $x \in \overline{K} \cap \overline{G}$ splněn vztah $\Omega(x) \geq 0$ neboli

$$\Phi(x) \geq f(b) - \varepsilon - d\varphi(x). \quad (7)$$

Protože množina K je otevřená, je podle (2), cvič. 3 $K \cap \overline{G} \subset \overline{K} \cap \overline{G}$; protože Φ je libovolná horní funkce, plyne z (7), že pro každé $x \in K \cap \overline{G}$ platí

$$F(x) \geq f(b) - \varepsilon - d\varphi(x).$$

Pro všechna $x \in \overline{G}$, dosti blízka bodu b , je tedy

$$F(x) > f(b) - 2\varepsilon.$$

Odtud a z (6) plyne, že $F(b) = f(b)$ a že funkce F je spojitá v bodě b (vzhledem k množině \overline{G}).

Nyní dokážeme, že funkce F je harmonická na množině G . Zvolme tedy $s \in G$; buď K otevřená koule o středu s , $\overline{K} \subset G$. Existují horní funkce Φ_1, Φ_2, \dots tak, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(s) = F(s)$. Položme $\Psi_n = \min(\Phi_1, \dots, \Phi_n)$, $\Gamma_n = (\Psi_n)_K$.

Podle lemmatu 4 a poznámky k lemmatu 7 jsou též Ψ_n, Γ_n horní funkce. Protože $F(s) \leq \Gamma_n(s) \leq \Phi_n(s)$, je též $\lim_{n \rightarrow \infty} \Gamma_n(s) = F(s)$. Funkce $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ tvoří

na množině K omezenou monotonní posloupnost; pro každé $x \in K$ můžeme tedy položit $\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Gamma_n(x)$. Podle cvič. 24 je funkce Γ harmonická na množině

K . Protože Γ_n jsou horní funkce, je

$$\Gamma(x) \geq F(x) \quad (8)$$

pro každé $x \in K$.

Buď opět Φ libovolná horní funkce. Položme $\tilde{\Psi}_n = \min(\Phi, \Psi_n)$, $\tilde{\Gamma}_n = (\tilde{\Psi}_n)_K$, $\tilde{\Gamma}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\Gamma}_n(x)$ ($x \in K$). Funkce $\tilde{\Gamma}$ je opět harmonická; zřejmě $\tilde{\Gamma}(x) \leq \Gamma(x)$ ($x \in K$), $\tilde{\Gamma}(s) = \Gamma(s)$ ($= F(s)$). Kdyby v některém bodě $b \in K$ bylo $\tilde{\Gamma}(b) < \Gamma(b)$, mohli bychom použít cvič. 23 na kouli o střed s a poloměru $|s - b|$ a na funkci $\Gamma - \tilde{\Gamma}$; zjistili bychom tak, že $\tilde{\Gamma}(s) < \Gamma(s)$, což není pravda. Je proto $\Gamma(x) = \tilde{\Gamma}(x) \leq \Phi(x)$, $\Gamma(x) \leq \inf \Phi(x) = F(x)$, tedy podle (8) $\Gamma(x) = F(x)$ pro každé $x \in G$. Vidíme, že funkce F je harmonická v okolí libovolného bodu $s \in G$; je tedy harmonická na množině G , takže je řešením dané Dirichletovy úlohy. Protože každé nezáporné řešení Dirichletovy úlohy je horní funkcí, je F nejmenší nezáporné řešení.

14. Lemma. *Nechť $b \in E_m$; buď $\delta > 0$, $G = E[x; 0 < |x - b| < \delta]$. Potom není $G \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Je-li $m = 2$, položme $\Psi(x) = \log(\delta \cdot |x - b|^{-1})$; je-li $m > 2$, položme $\Psi(x) = |x - b|^{2-m}$. Buď $\varepsilon > 0$. Funkce $\Phi(x) = \min(\varepsilon\Psi(x), 1)$ ($\Phi(b) = 1$) je podle lemmatu 4 horní funkcí k funkci f , definované na hranici množiny G předpisem $f(b) = 1$, $f(x) = 0$ pro $|x - b| = \delta$. Infimum F všech horních funkcí není tedy spojitě (je $F(b) = 1$, ale $F(x) = 0$ pro $x \in G$).

15. Věta. *Nechť množina $B \subset E_m$ má izolovaný bod b . Potom není $E_m - B \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Buď K otevřená koule o střed b taková, že $K \cap B = \{b\}$. Kdyby platilo $G = E_m - B \in \mathfrak{G}$, platilo by podle věty 10 $K - \{b\} = K \cap G \in \mathfrak{G}$; to však odporuje předešlému lemmatu.

16. Buď $G \in \mathfrak{G}$; buď $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}(G)$ množina všech spojitých funkcí f na $H(G)$ takových, že k funkci $|f|$ existuje aspoň jedna horní funkce. Systém \mathfrak{D} zřejmě obsahuje všechny omezené spojitě funkce na $H(G)$. Každé nezáporné funkci $f \in \mathfrak{D}$ přiřadíme infimum všech horních funkcí; označíme je $D(G, f)$. Je-li $f = 0$, je ovšem $D(G, f) = 0$; je-li f libovolná funkce z \mathfrak{D} , můžeme tedy položit

$$D(f) = D(G, f) = D(G, f_+) - D(G, f_-),$$

kde $f_+(x) = \max(f(x), 0)$, $f_-(x) = \max(-f(x), 0)$. (Zřejmě $f_+, f_- \in \mathfrak{D}$.) Funkce $D(f)$ je podle věty 13 řešením Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci f (a množině G). Místo $(D(f))(x)$ píšeme $D(f, x)$ nebo $D(G, f, x)$ ($x \in \bar{G}$).

Poznámka. Jestliže k nezáporné spojitě funkci f na množině $H(G)$ existuje řešení Dirichletovy úlohy, nemusí ještě platit $f \in \mathfrak{D}$. Příklad (v E_2): Funkce $F(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ je zřejmě řešením Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci $f(x_1, 0) = x_1^2$ a polorovině $x_2 > 0$. Položme $g_n(t) = \min(n, t^2)$, $f_n(x_1, 0) = g_n(x_1)$. Z cvič. 13, 17, 18 snadno plyne, že pro $x = [x_1, x_2]$, $x_2 > 0$ je $D(f_n, x) = \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x_2 \cdot g_n(t)}{(x_1 - t)^2 + x_2^2} dt$, kde $\gamma = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{t^2 + 1}$. Kdyby k funkci f existovala hor-

ní funkce Φ , bylo by $D(f_n) \leq \Phi$ pro každé n ; volíme-li však na př. $b = [0, 1]$,

$$\text{dostaneme } D(f_n, b) = \frac{1}{\gamma} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g_n(t)}{t^2 + 1} dt \rightarrow \infty.$$

17. Věta. *Buď $G \in \mathfrak{G}$; necht existují funkce Φ, Ψ , které mají tyto vlastnosti: Jsou omezené a spojité na \bar{G} a harmonické na G ; shodují se na $H(G)$, nejsou si však identicky rovny na \bar{G} . Potom platí*

$$\inf_{x \in G} D(G, 1, x) = 0 \quad (9)$$

(je ovšem $D(G, 1) = D(G, f)$, kde $f(x) = 1$ pro každé $x \in H(G)$).

Důkaz. Položme $\Omega_0(x) = \Phi(x) - \Psi(x)$ ($x \in \bar{G}$). Potom je Ω_0 omezená spojitá funkce, která není identicky rovna nule na množině G . Můžeme tudíž volit číslo c tak, že funkce $\Omega_1 = c\Omega_0$ má supremum rovné 1; položme $\Omega_2 = 1 - \Omega_1$.

Protože $\Omega_2(x) = 1$ pro každé $x \in H(G)$, je Ω_2 horní funkce k funkci $f(x) = 1$ a tedy $D(G, 1) \leq \Omega_2$. Odtud a ze vztahu $\inf \Omega_2(x) = 0$ plyne (9).

18. Buď $\mathfrak{G}_1^m = \mathfrak{G}_1$ systém těch regulárních množin $G \subset E_m$, pro něž je $D(G, 1) = 1$ (t. j. $D(G, 1, x) = 1$ pro každé $x \in G$); buď $\mathfrak{G}_0^m = \mathfrak{G}_0 = \mathfrak{G} - \mathfrak{G}_1$.

Poznámka. Je-li $G \in \mathfrak{G}_1$, je řešení Dirichletovy úlohy pro každou omezenou spojitou funkci na $H(G)$ vždy jednoznačné ve třídě omezených funkcí (to plyne ihned z věty 17). Je-li však $G \in \mathfrak{G}_0$, existují k funkci $f(x) = 1$ aspoň dvě nezáporná omezená řešení (a platí tedy (9)). Potom ovšem není řešení Dirichletovy úlohy jednoznačné pro žádnou omezenou spojitou funkci na $H(G)$ ani ve třídě omezených funkcí. — Je-li $m = 2$, je systém \mathfrak{G}_0 prázdný, jak plyne z cvič. 12. Uvidíme (viz větu 35), že pro $m > 2$ patří do \mathfrak{G}_0 každá regulární množina s omezeným komplementem. Do \mathfrak{G}_1 patří ovšem všechny omezené regulární množiny. — Buď konečně $G \in \mathfrak{G}_0$ a buď f nezáporná funkce z \mathfrak{D} ; položme $\delta = \inf_{x \in G} D(f, x)$. Potom je $D(f, x) - \delta(1 - D(1, x))$ horní funkce k f , takže $\delta = 0$ (zobecnění vztahu (9)).

19. Věta. *Buď Z isometrické zobrazení prostoru E_m na E_m ; buď $G \in \mathfrak{G}$ (resp. $G \in \mathfrak{G}_0$). Potom $Z(G) \in \mathfrak{G}$ (resp. $Z(G) \in \mathfrak{G}_0$).*

(Plyne snadno ze cvič. 26 a z vět 11, 13 a 15.)

20. Lemma. *Buď M neprázdná kompaktní konvexní část E_m . Necht existuje funkce Φ , která je spojitá v E_m , harmonická a kladná v $E_m - M$ a rovná nule na M . Potom $E_m - M \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Je-li $b \in E_m$, $\alpha \in E_1$, buď $Z_{b,\alpha}$ zobrazení, které bodu $x \in E_m$ přiřazuje bod $b + \alpha(x - b)$. Je-li tedy $b \in M$, $\alpha \in \langle 0, 1 \rangle$, platí $Z_{b,\alpha}(M) \subset M$. Zvolme nyní $b \in H(M)$; buď $M_n = Z_{b,\alpha}(M)$ pro $\alpha = \frac{1}{n}$, $\Phi_n(x) = \Phi(b + n(x - b))$ ($n = 1, 2, \dots$). Buď K otevřená koule o středu b a poloměru 1. Existují kladná

čísla $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ taková, že pro $x \in K$ je $|\varepsilon_n \Phi_n(x)| < n^{-2}$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n \Phi_n(x)$ tedy konverguje stejnoměrně na množině K ; buď Ψ její součet. Snadno se zjistí, že každá funkce Φ_n je harmonická a kladná na $E_m - M_n$ a tedy na $E_m - M$. Podle cvič. 24 je funkce Ψ harmonická na $K - M$. Je $\Psi(b) = 0$, funkce Ψ je spojitá na K a kladná na $K - \{b\}$; je to tedy bariéra.

21. Lemma. *Buď $\varepsilon > 0$,*

$$M = E[x; x = [x_1, \dots, x_m] \in E_m, x_m = 0, |x| \leq \varepsilon].$$

Potom existuje funkce Φ , která je spojitá v E_m , harmonická a kladná v $E_m - M$ a rovná nule na M .

Důkaz. Položme $f(t) = \int_0^t \frac{d\tau}{\sqrt{\tau(\tau + \varepsilon^2)^{m-1}}}$ ($t \geq 0$), $\beta(x) = \frac{1}{2}(x^2 - \varepsilon^2 + \sqrt{(x^2 - \varepsilon^2)^2 + 4\varepsilon^2 x_m^2})$, $\Phi(x) = f(\beta(x))$ ($x \in E_m$). Dokážeme, že funkce Φ má uvedené vlastnosti. Funkce Φ je zřejmě spojitá a nezáporná. Položme ještě

$$D = \sqrt{(x^2 - \varepsilon^2)^2 + 4\varepsilon^2 x_m^2}.$$

Je-li $x_m \neq 0$, je $D > |x^2 - \varepsilon^2|$, tedy $\beta(x) > 0$. Je-li $|x| > \varepsilon$, $x_m = 0$, je $D = x^2 - \varepsilon^2$, tedy opět $\beta(x) = x^2 - \varepsilon^2 > 0$. Je-li však $x \in M$, je $x_m = 0$, $D = \varepsilon^2 - x^2$, $\beta(x) = 0$. Vidíme, že $M = E[x; \Phi(x) = 0]$. Máme ještě dokázat, že funkce Φ je harmonická na $E_m - M$. Všimněme si, že na $E_m - M$ je $D > 0$ a (píšeme-li $\beta(x) = \beta$)

$$\beta^2 + \beta(\varepsilon^2 - x^2) - \varepsilon^2 x_m^2 = 0. \quad (10)$$

Odtud plyne (viz cvič. 6)

$$2\beta \operatorname{grad} \beta + (\varepsilon^2 - x^2) \operatorname{grad} \beta - 2\beta x - 2\varepsilon^2 x_m v = 0,$$

kde $v = \operatorname{grad} x_m = [0, \dots, 0, 1]$. Protože $\beta = \frac{1}{2}(x^2 - \varepsilon^2 + D)$, je

$$2\beta + \varepsilon^2 - x^2 = D, \quad (11)$$

takže $D \operatorname{grad} \beta = 2(\beta x + \varepsilon^2 x_m v)$ a tedy

$$D \cdot x \cdot \operatorname{grad} \beta = 2(\beta x^2 + \varepsilon^2 x_m^2), \quad (12)$$

$$D^2 (\operatorname{grad} \beta)^2 = 4(\beta^2 x^2 + 2\beta \varepsilon^2 x_m^2 + \varepsilon^4 x_m^2). \quad (13)$$

Dále máme (viz (11)) $D(\beta x^2 + \varepsilon^2 x_m^2) = (2\beta + \varepsilon^2 - x^2)(\beta x^2 + \varepsilon^2 x_m^2) = 2\beta^2 x^2 + 2\beta \varepsilon^2 x_m^2 + (\varepsilon^2 - x^2)\beta x^2 + \varepsilon^4 x_m^2 - x^2 \varepsilon^2 x_m^2 = \beta^2 x^2 + 2\beta \varepsilon^2 x_m^2 + \varepsilon^4 x_m^2 + x^2[\beta^2 + \beta(\varepsilon^2 - x^2) - \varepsilon^2 x_m^2]$; protože však [...] = 0 podle (10), je

$$D(\beta x^2 + \varepsilon^2 x_m^2) = \beta^2 x^2 + 2\beta \varepsilon^2 x_m^2 + \varepsilon^4 x_m^2.$$

Odtud a z (13), (12) plyne

$$D(\operatorname{grad} \beta)^2 = 4(\beta x^2 + \varepsilon^2 x_m^2), \quad (14)$$

$$(\operatorname{grad} \beta)^2 = 2x \cdot \operatorname{grad} \beta. \quad (15)$$

Provedeme-li na rovnost (10) operátor Δ , dostaneme podle cvič. 6

$$2(\text{grad } \beta)^2 + 2\beta\Delta\beta + \Delta\beta(\varepsilon^2 - x^2) - 2 \cdot 2x \cdot \text{grad } \beta - 2m\beta - 2\varepsilon^2 = 0,$$

takže (viz (11), (15))

$$D\Delta\beta = 2(m\beta + \varepsilon^2). \quad (16)$$

Z (10) a (14) plyne $\beta x^2 + \varepsilon^2 x_m^2 = \beta^2 + \beta\varepsilon^2$, $(\text{grad}\beta)^2 = \frac{4}{D}\beta(\beta + \varepsilon^2)$ a tedy (viz cvič. 7 a vztah (16)) $\Delta\Phi = f'' \cdot (\text{grad } \beta)^2 + f' \cdot \Delta\beta = \frac{2}{D}[f' \cdot (m\beta + \varepsilon^2) + 2f'' \cdot \beta(\beta + \varepsilon^2)]$. Protože však $f'(\beta) = (\beta(\beta + \varepsilon^2)^{m-1})^{-\frac{1}{2}}$, $f''(\beta) = -\frac{1}{2}(\dots)^{-\frac{3}{2}} \cdot ((\beta + \varepsilon^2)^{m-1} + \beta(m-1)(\beta + \varepsilon^2)^{m-2}) = -\frac{1}{2}(\dots)^{-\frac{3}{2}} \cdot (\beta + \varepsilon^2)^{m-2} \cdot (m\beta + \varepsilon^2)$, dostáváme $\Delta\Phi = \frac{2}{D}[(\dots)^{-\frac{1}{2}} \cdot (m\beta + \varepsilon^2) - (\dots)^{-\frac{3}{2}} \cdot (\beta + \varepsilon^2)^{m-2} \cdot (m\beta + \varepsilon^2) \cdot \beta(\beta + \varepsilon^2)] = \frac{2}{D}[(\dots)^{-\frac{1}{2}} \cdot (m\beta + \varepsilon^2) - (\dots)^{-\frac{3}{2}} \cdot (\dots) \cdot (m\beta + \varepsilon^2)] = 0$. Tím je vše dokázáno.

22. Věta. *Buď R nadrovina, K uzavřená koule o středu v R . Potom je $E_m - (K \cap R) \in \mathfrak{G}$.*

Důkaz. Buď ε poloměr koule K ; buď $M = E[x; x = [x_1, \dots, x_m] \in E_m, x_m = 0, |x| \leq \varepsilon]$. Podle lemmat 20 a 21 je $E_m - M \in \mathfrak{G}$; podle věty 19 je též $E_m - (K \cap R) \in \mathfrak{G}$.

23. Věta. *Buď G otevřená část E_m ; necht $H(G) \neq \emptyset$ a necht ke každému $b \in H(G)$ existuje nadrovina R a uzavřená koule K o středu v R tak, že $K \cap R \cap G = \emptyset$, $b \in K \cap R$. Potom $G \in \mathfrak{G}$.*

(Plyne z lemmatu 9 a věty 22.)

24. Věta. *Buď $G_1 \in \mathfrak{G}_0$; buď $G_2 \in \mathfrak{G}$, $G_1 \subset G_2$. Potom $G_2 \in \mathfrak{G}_0$.*

Důkaz. Definujme na množině \bar{G}_2 funkci Φ předpisem $\Phi(x) = 1$ pro $x \in \bar{G}_2 - G_1$, $\Phi(x) = D(G_1, 1, x)$ pro $x \in G_1$. Protože $\Phi(x) = D(G_1, 1, x)$ dokonce pro každé $x \in \bar{G}_1$, je podle cvič. 27 funkce Φ spojitá na \bar{G}_2 . Zvolme $b \in G_2$. Je-li $b \in G_2 - G_1$, je $\Phi(b) = 1$; protože $\Phi(x) \leq 1$ na \bar{G}_2 , je $\Phi_x(b) \leq 1 = \Phi(b)$ pro každou kouli K , pro niž $\bar{K} \subset G_2$. Je-li však $b \in G_1$, pak pro každou dosti malou kouli K o středu b platí $\Phi_x(b) = \Phi(b)$. Funkce Φ je tedy horní funkcí k funkci identicky rovné jedné na $H(G_2)$; protože (podle věty 17) je $\inf_{x \in G_1} D(G_1, 1, x) = 0$, je také $\inf_{x \in G_2} \Phi(x) = 0$, takže $\inf_{x \in G_2} D(G_2, 1, x) = 0$, $G_2 \in \mathfrak{G}_0$.

25. Věta. *Necht $G_1, G_2 \in \mathfrak{G}$, $G_1 \cap G_2 = \emptyset$. Potom $G = G_1 \cup G_2 \in \mathfrak{G}$. Jestliže $G_1, G_2 \in \mathfrak{G}_1$, je též $G \in \mathfrak{G}_1$.*

Důkaz. Protože $\bar{G}_1 \cap G_2 = \emptyset$, je $H(G_1) \cap G_2 = \emptyset$ a tedy $H(G_1) \cap G = \emptyset$; protože $H(G_1) \subset \bar{G}_1 \subset \bar{G}$, je $H(G_1) \subset H(G)$. Podobně se zjistí, že $H(G_2) \subset H(G)$.

Buď nyní f nezáporná omezená spojitá funkce na $H(G)$. Defnujme na množině \bar{G} funkci F předpisem $F(x) = D(G_j, f, x)$, je-li $x \in G_j$, $F(x) = f(x)$, je-li $x \in H(G)$. Funkce F je spojitá na \bar{G}_1 i na \bar{G}_2 ; podle cvič. 27 je funkce F spojitá i na $\bar{G}_1 \cup \bar{G}_2 = \bar{G}$, takže je nezáporným řešením Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci f a množině G . Protože podle věty 15 má každá z množin $E_m - G_j$ více než jeden bod, má podle cvič. 28 také hranice každé z množin G_j a tedy i hranice množiny G více než jeden bod. Podle věty 11 je tudíž $G \in \mathfrak{G}$. Jestliže nyní $G_1, G_2 \in \mathfrak{G}_1$, je funkce $D(G, 1)$ rovna jedné na G_1 i na G_2 a tedy i na G ; odtud plyne $G \in \mathfrak{G}_1$.

26. Věta. *Nechť $G \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$ (resp. \mathfrak{G}_0^{m+1}). Potom $G \in \mathfrak{G}^m$ (resp. $G \in \mathfrak{G}_0^m$).*

Důkaz. Buď f nezáporná omezená spojitá funkce na $H(G)$; položme $\tilde{f}(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}) = f(x_1, \dots, x_m)$. Potom je \tilde{f} nezáporná omezená spojitá funkce na hranici množiny $U = G \times E_1$; buď $\tilde{F} = D(U, \tilde{f})$. Zvolme $y_1, y_2 \in E_1$ a položme $d = y_2 - y_1$. Funkce $\tilde{F}(x, y + d)$ ($x \in \bar{G}$, $y \in E_1$) je horní funkcí k funkci \tilde{f} ; je tedy $\tilde{F}(x, y_1) \leq \tilde{F}(x, y_1 + d) = \tilde{F}(x, y_2)$. Podobně se zjistí, že $\tilde{F}(x, y_2) \leq \tilde{F}(x, y_1)$; vidíme, že existuje funkce F na množině \bar{G} tak, že $\tilde{F}(x, y) = F(x)$. Protože $\frac{\partial^2 \tilde{F}}{\partial y^2} = 0$, je funkce F harmonická na G ; je to zřejmě řešení

Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci f . Má-li tedy komplement množiny G aspoň dva body, je podle věty 11 $G \in \mathfrak{G}^m$. Je-li kromě toho $G \times E_1 \in \mathfrak{G}_0^{m+1}$ a volíme-li $f(x) = 1$, existuje $b \in G$, $c \in E_1$ tak, že $\tilde{F}(b, c) < 1$ a tedy $F(b) < 1$; protože $D(G, 1) = D(G, f) \leq F$, je také $D(G, 1, b) < 1$. Odtud plyne $G \in \mathfrak{G}_0^m$.

Případ, že by komplement množiny G obsahoval jen jeden bod, nemůže však (za předpokladu $G \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$) nastat; to dokážeme sporem. Nechť tedy $G = E_m - \{b\}$, $G \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$. Buď $L = E[x; x \in E_m, |x - b| < 1]$. Protože $L \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$, je též (podle věty 10) $(L \cap G) \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$. Protože komplement množiny $L \cap G$ obsahuje více než jeden bod, platí (podle toho, co jsme dokázali) $L \cap G \in \mathfrak{G}^m$. To však odporuje lemmatu 14; tím je vše dokázáno.

Poznámka. Je-li $G \times E_1 \in \mathfrak{G}_1^{m+1}$, je ovšem $G \in \mathfrak{G}_1^m$.

27. Věta. *Buď P poloprostor; buď $G \in \mathfrak{G}$, $G \subset P$. Potom $G \in \mathfrak{G}_1$.*

(Plyne snadno z cvič. 13 a z vět 19 a 24.)

28. Věta. *Nechť $G \in \mathfrak{G}_0$; buď $Z(x_1, \dots, x_m) = [x_1, \dots, x_{m-1}, -x_m]$. Potom $G \cap Z(G) \in \mathfrak{G}_0$.*

Důkaz. Buď A (resp. B) poloprostor $x_m > 0$ (resp. $x_m < 0$); buď R nadrovina $x_m = 0$. Položme $U = G - R$. Z věty 27 plyne, že není $G \subset A$; je tedy $G \cap B \neq \emptyset$, takže (viz věty 10 a 27) $G \cap B \in \mathfrak{G}_1$. Podobně se zjistí, že $G \cap A \in \mathfrak{G}_1$, a z věty 25 plyne $U = (G \cap A) \cup (G \cap B) \in \mathfrak{G}_1$.

Buď $F = D(G, 1)$. Kdyby bylo $F(x) \geq \frac{1}{2}$ pro každé $x \in R \cap \bar{G}$, bylo by (viz (1), cvič. 3) $F(x) \geq \frac{1}{2}$ pro každé $x \in H(G) \cup (R \cap \bar{G}) \supset H(U)$; odtud by

však plynulo, že je funkce F horní funkcí vzhledem k funkci $f(x) = \frac{1}{2}$ ($x \in H(U)$) a množině U a že tedy platí $F(x) \geq D(U, \frac{1}{2}, x) = \frac{1}{2}$ pro každé $x \in U \cup (R \cap \bar{G}) \supset G$, což není možné podle (9) (věta 17). Existuje tedy $b \in R \cap \bar{G}$ tak, že $F(b) < \frac{1}{2}$; zřejmě $b \in G$, tedy $b \in G \cap Z(G) = V$. Definujme na množině \bar{V} funkci Φ předpisem $\Phi(x) = F(x) + F(Z(x))$. Funkce Φ je harmonická na \bar{V} a spojitá na \bar{V} ; protože $H(V) \subset H(G) \cup H(Z(G))$, je $\Phi(x) \geq 1$ pro každé $x \in H(V)$ a tedy $\Phi(x) \geq D(V, 1, x)$ pro každé $x \in V$. Protože však $\Phi(b) < 1$, je $V \in \mathfrak{G}_0$.

29. Věta. *Nechť $U \in \mathfrak{G}_1^m$, $U \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$, $G \in \mathfrak{G}^{m+1}$, $G \cap ((E_m - U) \times \langle 0, \infty \rangle) = \emptyset$. Potom $G \in \mathfrak{G}_1^{m+1}$.*

Důkaz. Buď $Z(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}) = [x_1, \dots, x_m, -x_{m+1}]$. Zřejmě $Z(G) \cap ((E_m - U) \times (-\infty, 0)) = \emptyset$, takže $G \cap Z(G) \cap ((E_m - U) \times E_1) = \emptyset$ neboli $G \cap Z(G) \subset U \times E_1$. Kdyby bylo $G \in \mathfrak{G}_0^{m+1}$, měli bychom podle vět 28, 24 a 26 postupně $G \cap Z(G) \in \mathfrak{G}_0^{m+1}$, $U \times E_1 \in \mathfrak{G}_0^{m+1}$ a konečně $U \in \mathfrak{G}_0^m$ proti předpokladu.

30. Věta. *Buď G otevřená část E_m , $H = H(G) \neq \emptyset$. Nechť ke každému $b \in H$ existuje nadrovina R a uzavřená koule K se středem v R tak, že $b \in K \cap R$, $K \cap R \cap G = \emptyset$. Potom $G \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$.*

Důkaz. Zvolme $d \in H(G \times E_1)$, $d = [b, c]$, kde $b \in H$, $c \in E_1$. Sestrojme k bodu b podle předpokladů věty nadrovinu R a kouli K ; položme $S = R \times E_1$. Buď $K = E[x; x \in E_m, |x - s| \leq \delta]$, $t = [s, c]$, $L = E[x; x \in E_{m+1}, |x - t| \leq \delta]$. Potom je L koule se středem v nadrovině S ; snadno se zjistí, že $d \in L \cap S$, $L \cap S \cap (G \times E_1) = \emptyset$. Podle věty 23 je $G \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$.

31. Věta. *Buď C úsečka v E_2 ; necht' $G \in \mathfrak{G}^3$, $G \cap (C \times \langle 0, \infty \rangle) = \emptyset$. Potom $G \in \mathfrak{G}_1^3$.*

Důkaz. Úsečka v E_2 je zřejmě průnikem nadroviny (= přímky) s koulí (= kruhem) se středem v této nadrovině. Podle věty 30 je $(E_2 - C) \times E_1 \in \mathfrak{G}^3$. Protože $\mathfrak{G}_0^2 = \emptyset$ (viz cvič. 12), je podle věty 26 $(E_2 - C) \times E_1 \in \mathfrak{G}_1^3$. Podle věty 29, kde píšeme $U = E_2 - C$, je tudíž $G \in \mathfrak{G}_1^3$.

Poznámka. Ty regulární množiny s neomezeným komplementem, s nimiž se setkáváme při konkrétním řešení trojrozměrné Dirichletovy úlohy, patří podle vět 31 a 19 zpravidla do \mathfrak{G}_1^3 . To znamená zejména, jak víme, že ke každé funkci, spojitě a omezeně na hranici takové množiny, existuje právě jedno omezené řešení příslušné Dirichletovy úlohy.

32. Věta. *Pro každou množinu $G \in \mathfrak{G}$ jsou správná tato tvrzení:*

a) *Jestliže $f, g \in \mathfrak{D}$, je $f + g \in \mathfrak{D}$ a*

$$D(f + g) = D(f) + D(g).$$

b) *Jestliže $f \in \mathfrak{D}$, $c \in E_1$, je $cf \in \mathfrak{D}$ a*

$$D(cf) = cD(f).$$

c) Jestliže $f, g \in \mathfrak{D}$, $f \leq g$, je

$$D(f) \leq D(g).$$

d) Jestliže f je spojitá funkce na $H(G)$, $g \in \mathfrak{D}$, $|f| \leq g$, je $f \in \mathfrak{D}$ a

$$|D(f)| \leq D(g).$$

Důkaz. Buďte napřed f, g nezáporné funkce z \mathfrak{D} . Potom je $D(f) + D(g)$ horní funkce k $f + g$, takže $D(f) + D(g) \geq D(f + g)$. Protože $D(f + g)$ je horní funkce k f , je $D(f + g) \geq D(f)$; vidíme, že $D(f + g) - D(f)$ je horní funkcí k funkci g . Odtud plyne $D(f + g) - D(f) \geq D(g)$, $D(f + g) \geq D(f) + D(g)$. Tvrzení a) je tedy v našem případě správné.

Buďte nyní f, g libovolné funkce z \mathfrak{D} . Definujme funkce φ, ψ předpisem $(f + g)_+ + \varphi = f_+ + g_+$, $(f + g)_- + \psi = f_- + g_-$. Odečtením těchto rovností dostaneme vztah $\varphi = \psi$. Zřejmě $\varphi \geq 0$, $\varphi \in \mathfrak{D}$. Je $D(f + g) = D((f + g)_+) - D((f + g)_-) = D((f + g)_+) + D(\varphi) - (D((f + g)_-) + D(\psi))$; podle toho, co jsme již dokázali, je tedy $D(f + g) = D((f + g)_+ + \varphi) - D((f + g)_- + \psi) = D(f_+) + D(g_+) - (D(f_-) + D(g_-)) = D(f) + D(g)$. Tím je úplně dokázáno tvrzení a). Důkaz tvrzení b) a c) lze přenechat čtenáři. Platí-li nyní předpoklady tvrzení d), je zřejmě $f \in \mathfrak{D}$, $-g \leq f \leq g$, tedy $D(f) \leq D(g)$, $D(-g) \leq D(f)$, $D(g) \geq -D(f)$, takže opravdu $|D(f)| \leq D(g)$.

33. Věta. Buď $G \in \mathfrak{G}^m$, $f \in \mathfrak{D}$, $H = H(G)$. Potom platí

$$\sup_{x \in G} |x|^{m-2} \cdot |D(f, x)| = \sup_{x \in H} |x|^{m-2} \cdot |f(x)|, \quad (17)$$

$$\sup_{x \in G} |D(f, x)| = \sup_{x \in H} |f(x)|. \quad (18)$$

Důkaz. Buď napřed funkce f nezáporná. Není-li funkce $|x|^{m-2} \cdot f(x)$ omezená, je vztah (17) zřejmě správný; buď tedy $\sup_{x \in H} |x|^{m-2} \cdot f(x) = s < \infty$. Potom existuje číslo c tak, že $f(x) < c$ pro všechna $x \in H$. Snadno se zjistí (viz odst. 3, 4), že funkce $\Phi(x) = \min(c, s \cdot |x|^{2-m})$ ($\Phi(0) = c$) je horní funkcí k funkci f . Pro každé $x \in G$ je tedy $D(f, x) \leq \Phi(x)$, takže $|x|^{m-2} \cdot D(f, x) \leq s$. Odtud plyne ihned, že (17) platí pro každou nezápornou funkci $f \in \mathfrak{D}$.

Buď nyní f libovolná funkce z \mathfrak{D} . Podle 32, d) je $|D(f)| \leq D(|f|)$; podle toho, co jsme dokázali, je tedy $\sup_{x \in G} |x|^{m-2} \cdot |D(f, x)| \leq \sup_{x \in G} |x|^{m-2} \cdot D(|f|, x) \leq \sup_{x \in H} |x|^{m-2} \cdot |f(x)|$. Odtud snadno plyne (17). Důkaz vztahu (18) lze přenechat čtenáři.

34. Věta. Buď $m > 2$, $G \in \mathfrak{G}^m$, $H = H(G)$, $f \in \mathfrak{D}$; nechť $f(x) \rightarrow 0$ pro $x \in H$, $|x| \rightarrow \infty$. Potom platí $D(f, x) \rightarrow 0$ pro $x \in G$, $|x| \rightarrow \infty$.

Důkaz. Můžeme předpokládat, že funkce f je nezáporná. Zvolme $\varepsilon > 0$ a položme $g(x) = \max(f(x) - \varepsilon, 0)$ ($x \in H$). Existuje koule K tak, že $g(x) = 0$ pro každé $x \in H - K$; funkce $|x|^{m-2} \cdot g(x)$ ($x \in H$) je tedy omezená. Podle (17)

je také funkce $|x|^{m-2} \cdot D(g, x)$ ($x \in G$) omezená, takže $D(g, x) \rightarrow 0$ pro $x \in G$, $|x| \rightarrow \infty$. Protože však $f(x) \leq g(x) + \varepsilon$ ($x \in H$), je funkce $D(g, x) + \varepsilon$ ($x \in \bar{G}$) horní funkcí k f ; odtud plyne $D(f, x) \leq D(g, x) + \varepsilon$ ($x \in G$) a tedy také $D(f, x) \rightarrow 0$ pro $x \in G$, $|x| \rightarrow \infty$.

35. Věta. Buď G regulární množina s omezeným komplementem; buď f spojitá funkce na hranici H množiny G . Potom existují čísla c, d tak, že pro každé $x \in G$, $x \neq 0$ je

$$\left| \frac{c}{|x|^{m-2}} - D(f, x) \right| < \frac{d}{|x|^{m-1}}.$$

Důkaz. Buď K otevřená koule o středu v počátku a poloměru R ; nechť $K \supset E_m - G$. Definujme na množině $H(K)$ funkcí g předpisem $g(x) = D(G, f, x)$. Podle cvič. 10 je funkce

$$F(x) = \frac{R^{m-2}}{|x|^{m-2}} \cdot D\left(K, g, x \cdot \frac{R^2}{x^2}\right) \quad (x \in E_m - K)$$

řešením Dirichletovy úlohy pro funkci g a množinu $E_m - \bar{K}$; touž vlastnost má i funkce $D(G, f, x)$ ($x \in E_m - K$). Funkce $|x|^{m-2} \cdot F(x)$ je zřejmě omezená; funkce $|x|^{m-2} \cdot D(G, f, x)$ je omezená podle (17) (věta 33). Podle cvič. 12 je tedy $F(x) = D(G, f, x)$ pro každé $x \in E_m - K$.

Buď nyní $c_0 = D(K, g, 0)$. Na množině \bar{K} existuje omezená funkce φ tak, že $D(K, g, x) = c_0 + |x| \cdot \varphi(x)$ pro každé $x \in \bar{K}$. Pro $x \notin K$ potom platí $D(G, f, x) = F(x) = \frac{R^{m-2}}{|x|^{m-2}} \left(c_0 + \frac{R^2}{|x|} \cdot \varphi\left(x \cdot \frac{R^2}{x^2}\right) \right)$; píšeme-li ještě $c = R^{m-2} \cdot c_0$ a je-li $|\varphi(x)| < d_0$ pro $x \in \bar{K}$, platí pro $x \notin K$ vztah

$$||x|^{m-1} \cdot D(G, f, x) - c|x|| < R^m \cdot d_0.$$

Protože však levá strana této nerovnosti je omezená na množině $G \cap K$, existuje d tak, že je

$$||x|^{m-1} \cdot D(G, f, x) - c|x|| < d$$

pro všechna $x \in G$; odtud plyne ihned tvrzení věty.

Poznámka. Zřejmě $|x|^{m-2} D(f, x) \rightarrow c$ pro $|x| \rightarrow \infty$.

36. Z věty 35 snadno plyne, že pro $m > 2$ patří do \mathfrak{G}_0 každá množina $G \in \mathfrak{G}$ s omezeným komplementem. Nyní ukážeme, že i množina s neomezeným komplementem může patřit do \mathfrak{G}_0 . Příklad (v E_3): Buď $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, kde B_n je uzavřená koule o středu $s_n = [0, 0, n^3]$ a poloměru n ; buď $S = \{s_1, s_2, \dots\}$. Pro $x \in G_0 = E_m - S$ položme $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{|x - s_n|}$. Je-li $x \in G_0$, $|s_{n_0}| > 2|x|$, pak pro každé $n \geq n_0$ platí $|x - s_n| > \frac{1}{2}|s_n|$, tedy $\frac{n}{|x - s_n|} < \frac{2n}{|s_n|} = \frac{2}{n^2}$. Řada, definující funkci F , konverguje tedy na množině G_0 lokálně stejnoměrně.

Je-li $x = [x_1, x_2, x_3]$, kde $x_3 \leq 0$, je $\frac{n}{|x - s_n|} \leq \frac{1}{n^2}$; v poloprostoru $x_3 \leq 0$ konverguje tedy řada dokonce stejnoměrně. Odtud snadno plyne, že funkce F je harmonická na množině $G = E_3 - B$, spojitá na \bar{G} a splňuje vztah $F(x) \rightarrow 0$ pro $|x| \rightarrow \infty$, $x_3 \leq 0$. Na hranici množiny G je však zřejmě $F(x) > 1$, takže $F \geq D(G, 1)$, $\inf_{x \in G} D(G, 1, x) = 0$, $G \in \mathfrak{S}_0$.

37. Věta. *Nechť $G \in \mathfrak{S}$; buďte G_1, G_2, \dots takové otevřené množiny, že $G_1 \subset G_2 \subset \dots$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \supset \bar{G}$ a že $G \cap G_n \in \mathfrak{S}$ pro každé n . Buď $f \in \mathfrak{D}(G)$; buďte f_1, f_2, \dots spojitě funkce na množině $H = H(G)$, které mají tyto vlastnosti:*

$$|f_1(x)| \leq |f_2(x)| \leq \dots, f_n(x) \cdot f(x) \geq 0, f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ pro každé } x \in H; \quad (19)$$

$$f_n(x) = 0 \text{ pro každé } x \in H - G_n \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (20)$$

Každému přirozenému n přiřadíme funkci g_n definovanou na množině $A_n = H(G \cap G_n)$ předpisem

$$g_n(x) = f_n(x) \quad (x \in A_n \cap H), \quad (21)$$

$$g_n(x) = 0 \quad (x \in A_n - H). \quad (22)$$

Potom je $g_n \in \mathfrak{D}(G \cap G_n)$ pro $n = 1, 2, \dots$ a platí

$$D(G \cap G_n, g_n, x) \rightarrow D(G, f, x) \quad (23)$$

pro každé $x \in \bar{G}$.

Důkaz. Předpokládejme napřed, že funkce f je nezáporná (a tedy $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$). Zvolme index n a položme $C = A_n \cap H$, $D = A_n \cap H(G_n)$. Podle (21) je funkce g_n spojitá na množině C . Buď nyní $x \in D$. Je-li $x \in H$, je podle (20), (21) $g_n(x) = 0$; jestliže však $x \notin H$, je podle (22) opět $g_n(x) = 0$. Protože množiny C, D jsou uzavřené a protože $A_n = C \cup D$ (jak plyne ze vztahu (1), cvič. 3), je podle cvič. 27 funkce g_n spojitá také na množině A_n . Z (21), (22) plyne, že $g_n(x) \leq D(G, f, x)$ pro každé $x \in A_n$; je tedy $g_n \in \mathfrak{D}(G \cap G_n)$. Položme $F_n = D(G \cap G_n, g_n)$, $F = D(G, f)$.

Zvolme bod $x \in A_n$ a index $p > n$. Jestliže $x \in G$, je $g_n(x) = 0 \leq F_p(x)$; není-li $x \in G$, je ovšem $x \in \bar{G} \cap \bar{G}_n - G \subset \bar{G} \cap \bar{G}_p - G \subset A_p$ a podle (19), (21) je opět $g_n(x) \leq g_p(x) = F_p(x)$. Odtud plyne, že na množině $\bar{G} \cap \bar{G}_n$ platí $F_n(x) \leq F_p(x) \leq F(x)$.

Buď x libovolný bod množiny \bar{G} . Protože $\bar{G} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{G}_n$, existuje index n tak, že $x \in \bar{G} \cap \bar{G}_n$; podle (2) (cvič. 3) je

$$\bar{G} \cap \bar{G}_n \subset \overline{\bar{G} \cap \bar{G}_n} \quad (24)$$

a tedy $x \in \overline{\bar{G} \cap \bar{G}_n}$. Na množině \bar{G} můžeme proto definovat funkci Φ předpisem

$$\Phi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$$

(při libovolném $x \in \bar{G}$ je posloupnost $\{F_n(x)\}$ definována pro všechna dosti velká n a je monotonní); zřejmě

$$\Phi \leq F. \quad (25)$$

Protože je posloupnost funkcí F_n omezená v okolí každého bodu množiny G , je podle cvič. 24 funkce Φ harmonická na G .

Buď nyní $b \in H$, $\varepsilon > 0$; nechť $b \in G_n$. Je-li $p > n$, je podle (24) $b \in \overline{G \cap G_n} = G \cap A_p$, tedy $F_p(b) = f_p(b)$. Protože $f_p(b) \rightarrow f(b)$, existuje $p > n$ tak, že $F_p(b) > f(b) - \varepsilon$. Protože funkce F_p je spojitá na $\overline{G \cap G_n}$, je podle (24) spojitá i na $G_n \cap \bar{G}$; existuje tedy okolí U bodu b tak, že

$$F_p(x) > f(b) - \varepsilon$$

pro všechna $x \in U \cap (G_n \cap \bar{G}) = V \cap \bar{G}$, kde $V = U \cap G_n$. Protože $F(b) = f(b)$, existuje takové okolí W bodu b , že pro každé $x \in W \cap \bar{G}$ je

$$F(x) < f(b) + \varepsilon.$$

Pro všechna $x \in (V \cap W) \cap \bar{G}$ je potom

$$f(b) - \varepsilon < F_p(x) \leq \Phi(x) \leq F(x) < f(b) + \varepsilon.$$

Vidíme, že $\Phi(b) = f(b)$ a že funkce Φ je spojitá v bodě b vzhledem k množině \bar{G} .

Tím jsme dokázali, že Φ je horní funkcí k funkci f a že tedy $\Phi \geq F$. Odtud a z (25) plyne (23). Pro libovolnou funkci $f \in \mathcal{D}(G)$ dokážeme větu rozkladem funkce f na rozdíl $f_+ - f_-$.

Poznámka. V této větě můžeme množiny G_n a funkce f_n volit na př. takto: Buď $b \in G$; buď G_n koule o středu b a poloměru n . Dále buď $\psi_n(t) = 1$ pro $0 \leq t \leq n - 1$, $\psi_n(t) = 0$ pro $t \geq n$ a funkce ψ_n buď lineární v intervalu $\langle n - 1, n \rangle$; položíme $f_n(x) = f(x) \cdot \psi_n(|x - b|)$. Věta potom říká, že řešení Dirichletovy úlohy, příslušné k funkci f a množině G , lze přibližně vyjádřit řešením Dirichletovy úlohy, příslušným k funkci g_n a množině $G \cap G_n$. Důležité je přitom, že množina $G \cap G_n$ je (v tomto případě) omezená; pro omezené množiny platí totiž věta o unicítě řešení a jsou též známy různé přibližné metody k jeho nalezení.

38. Lemma. Buď $G \in \mathcal{G}$, $f, f_1, f_2, \dots \in \mathcal{D}$; nechť $f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pro každé $x \in H(G)$. Potom platí $D(f_n, x) \rightarrow D(f, x)$ pro každé $x \in \bar{G}$.

Důkaz. Předpokládejme napřed, že funkce f_1 je nezáporná. Položíme-li v předešlé větě $G_n = E_n$ ($n = 1, 2, \dots$), bude $g_n = f_n$ a podle (23) dostaneme $D(f_n, x) \rightarrow D(f, x)$ ($x \in \bar{G}$). Vynechme nyní předpoklad, že funkce f_1 je nezáporná, a pišme $\varphi_n = f_n - f_1$ ($n = 1, 2, \dots$), $\varphi = f - f_1$. Podle toho, co jsme dokázali (a podle věty 32), je $D(\varphi_n, x) \rightarrow D(\varphi, x)$ a tedy $D(f_n, x) = D(\varphi_n, x) + D(f_1, x) \rightarrow D(\varphi, x) + D(f_1, x) = D(f, x)$ pro každé $x \in \bar{G}$.

39. Věta. Buď $G \in \mathcal{G}$; buďte f, f_1, f_2, \dots spojitě funkce na hranici H množiny G . Nechť $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pro každé $x \in H$ a nechť všechny funkce $|f_1|, |f_2|, \dots$ mají společnou horní funkci. Potom platí $D(f_n, x) \rightarrow D(f, x)$ pro každé $x \in \bar{G}$.

Důkaz. Buď Φ společná horní funkce k funkcím $|f_n|$. Položíme-li $\varphi(x) = \Phi(x)$ pro $x \in H$, je zřejmě $\varphi \in \mathfrak{D}$. Zvolme bod $b \in \bar{G}$ a definujme na systému \mathfrak{D} funkcional J předpisem $J(g) = D(g, b)$. Funkcional J je podle předešlého lemmatu spojitý vzhledem k monotonní konvergenci v prostoru \mathfrak{D} . Protože $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pro každé $x \in H$, platí také (viz na př. [4], str. 183) $J(f_n) \rightarrow J(f)$ neboli $D(f_n, b) \rightarrow D(f, b)$.

Poznámka. Je-li konvergence $f_n(x) \rightarrow f(x)$ stejnoměrná na množině H , je konvergence $D(f_n, x) \rightarrow D(f, x)$ stejnoměrná na množině \bar{G} (to plyne ihned z (18), věta 33).

40. Buď $G \in \mathfrak{G}$. Řekneme, že posloupnost funkcí F_1, F_2, \dots je *přípustná* (vzhledem k množině G), jestliže platí:

1. Funkce F_n jsou spojitě na \bar{G} a harmonické na G ;
2. funkce $|x|^{m-2} \cdot F_n(x)$ jsou omezené;
3. existuje funkce Φ , která je spojitá na \bar{G} , superharmonická na G a která pro každé $x \in \bar{G}$ a každé n splňuje vztah $\Phi(x) \geq |F_n(x)|$;
4. pro každé $x \in \bar{G}$ existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.

Dále buď \mathfrak{M} systém všech funkcí F tvaru $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$ ($x \in \bar{G}$), kde F_n je přípustná posloupnost.

41. Věta. Buď $G \in \mathfrak{G}$, $H = H(G)$; buď $f \in \mathfrak{D}$. Potom existuje právě jedna funkce $F \in \mathfrak{M}$, která se na množině H shoduje s funkcí f ; je to funkce $F = D(f)$.

Důkaz. Buďte ψ_1, ψ_2, \dots funkce z poznámky k větě 37; položme $g_n(x) = \psi_n(|x|) \cdot f(x)$ ($x \in H$, $n = 1, 2, \dots$). Podle (17) (věta 33) jsou funkce $|x|^{m-2} \cdot D(g_n, x)$ omezené. Protože $f \in \mathfrak{D}$, existuje k funkci $|f|$ horní funkce Φ ; je pak zřejmě $|g_n(x)| \leq \Phi(x)$ ($x \in H$), tedy $|D(g_n, x)| \leq \Phi(x)$ pro každé $x \in \bar{G}$ ($n = 1, 2, \dots$). Protože $g_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in H$), je podle věty 39 $D(g_n, x) \rightarrow D(f, x)$ ($x \in \bar{G}$). Funkce $D(g_n)$ tvoří tedy přípustnou posloupnost s limitou $D(f)$.

Nechť naopak $F \in \mathfrak{M}$, $F(x) = f(x)$ pro každé $x \in H$; nechť $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$ ($x \in \bar{G}$), kde F_n je přípustná posloupnost. Definujme na množině H funkce f_n předpisem $f_n(x) = F_n(x)$. Protože funkce $|x|^{m-2} \cdot F_n(x)$ jsou omezené, jsou podle (17) (věta 33) také funkce $|x|^{m-2} \cdot D(f_n, x)$ omezené; podle cvič. 12 je tedy $F_n = D(f_n)$. Protože $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in H$) a protože funkce f_n mají společnou horní funkci, je podle věty 39 $F_n(x) = D(f_n, x) \rightarrow D(f, x)$ ($x \in \bar{G}$), tedy $F = D(f)$.

LITERATURA

- [1] V. Jarník: Diferenciální počet, Praha 1953.
- [2] V. Jarník: Integrální počet II, Praha 1955.
- [3] I. G. Petrovskij: Parciální diferenciální rovnice, Praha 1952.
- [4] J. Mařík: Lebesgueův integrál v abstraktních prostorech, Časopis pro pěst. mat., 76 (1951), 175–194.

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ

ЯН МАРЖИК (Jan Mařík), Прага.

(Поступило в редакцию 23/V 1956 г.)

Пусть G — открытая часть m -мерного евклидова пространства E_m , $\emptyset \neq G \neq E_m$; пусть f — (конечная вещественная) непрерывная функция на множестве $H(G)$. ($H(G)$ — граница, \bar{G} — замыкание множества G .) Если функция F непрерывна в \bar{G} , гармонична в G и равна f на $H(G)$, то скажем, что F — решение задачи Дирихле, соответствующей функции f и множеству G . Если множество G ограничено, существует не более чем одна такая функция F . Пусть теперь \mathfrak{g} — система всех непустых открытых ограниченных множеств $G \subset E_m$ таких, что для каждой непрерывной функции на $H(G)$ существует решение задачи Дирихле; пусть, далее, $\mathfrak{G}^m = \mathfrak{G}$ — система всех $G \subset E_m$ ($G \neq E_m$), обладающих тем свойством, что $G \cap K \in \mathfrak{g}$ для всякой достаточно большой открытой сферы K с центром в начале координат. Если $G \in \mathfrak{G}$, пусть $\mathfrak{D}(G)$ — множество тех функций f , непрерывных на $H(G)$, которые обладают следующим свойством: Существует неотрицательная непрерывная в \bar{G} функция F , гармоническая в G и удовлетворяющая соотношению $F(x) \geq |f(x)|$ для всякого $x \in H(G)$.

Нетрудным следствием теоремы 13 является следующее предложение:

Для каждой неотрицательной функции $f \in \mathfrak{D}(G)$ ($G \in \mathfrak{G}$) существует наименьшее неотрицательное решение соответствующей задачи Дирихле.

Это решение обозначим символом $D(G, f)$ и для произвольной функции $f \in \mathfrak{D}(G)$ положим $D(G, f) = D(f) = D(G, f_+) - D(G, f_-)$, где $f_+(x) = \max(f(x), 0)$, $f_-(x) = \max(-f(x), 0)$. Функция $D(f)$ является, очевидно, решением соответствующей задачи Дирихле. Вместо $(D(f))(x)$ пишем $D(f, x)$ ($x \in \bar{G}$). — Теорема 23 утверждает:

Пусть $G \subset E_m$ открыто, $\emptyset \neq G \neq E_m$. Предположим, что для всякого $b \in H(G)$ существует гиперплоскость R и замкнутая сфера K с центром в R так, что $b \in R \cap K$ и что $R \cap K \cap G = \emptyset$. Тогда $G \in \mathfrak{G}$.

Пусть теперь $\mathfrak{G}_1^m = \mathfrak{G}_1$ — система тех $G \in \mathfrak{G}$, для которых $D(G, 1, x) = 1$ ($x \in G$); далее положим $\mathfrak{G}_0^m = \mathfrak{G}_0 = \mathfrak{G} - \mathfrak{G}_1$. Из упражнения 12 следует, что $\mathfrak{G}_1^2 = \mathfrak{G}^2$; всякое ограниченное множество $G \in \mathfrak{G}^m$ является, очевидно, элементом \mathfrak{G}_1^m (m произвольно). Если $m > 2$, тогда каждое множество $G \in \mathfrak{G}$ с ограниченным дополнением принадлежит \mathfrak{G}_0^m (см. теорему 35). — Из отделов 17—19, 24—31 следует:

Если $G \in \mathfrak{G}_0$, то $\inf_{x \in G} D(f, x) = 0$ для всякой неотрицательной функции $f \in \mathfrak{D}(G)$.

Если $G \in \mathfrak{S}_1$, то для каждой ограниченной непрерывной на $H(G)$ функции f существует точно одно ограниченное решение F задачи Дирихле; имеем $F = D(f)$.

Пусть φ — изометрическое отображение пространства E_m в E_m . Если $G \in \mathfrak{S}$ (соотв. $G \in \mathfrak{S}_0$), то и $\varphi(G) \in \mathfrak{S}$ (соотв. $\varphi(G) \in \mathfrak{S}_0$).

Если $G_1 \in \mathfrak{S}_0$, $G_2 \in \mathfrak{S}$, $G_1 \subset G_2$, то $G_2 \in \mathfrak{S}_0$.

Предположим, что $U \in \mathfrak{S}^m$ и что для всякого $b \in H(U)$ существует гиперплоскость R и замкнутая сфера K с центром в R так, что $b \in R \cap K$ и что $R \cap K \cap G = \emptyset$. Тогда $U \times E_1 \in \mathfrak{S}^{m+1}$. Если, далее, $U \in \mathfrak{S}_1^m$, $A = E_m - U$, $G \in \mathfrak{S}^{m+1}$, $G \cap (A \times \langle 0, \infty \rangle) = \emptyset$, то $G \in \mathfrak{S}_1^{m+1}$.

Теорема 37 имеет следующий наглядный смысл:

Предположим, что $G \in \mathfrak{S}$ и что $f \in \mathfrak{D}(G)$. Пусть K — большая открытая сфера; пусть g — непрерывная функция на $H(K \cap G)$, которая равна нулю на $H(K)$ и приблизительно равна f на $H(G)$. Тогда функция $D(K \cap G, g)$ приблизительно равна $D(G, f)$ на множестве $\overline{K \cap G}$.

Теорема 39 утверждает, что зависимость $D(f)$ от f непрерывна:

Если $G \in \mathfrak{S}$, $f, f_0, f_1, \dots \in \mathfrak{D}(G)$ и если $f_n(x) \rightarrow f_0(x)$, $|f_n(x)| \leq f(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) для всякого $x \in H(G)$, то $D(f_n, x) \rightarrow D(f_0, x)$ для всякого $x \in \overline{G}$.

Отдел 40 содержит определение системы \mathfrak{M} , элементы которой — функции на множестве \overline{G} ($G \in \mathfrak{S}$), обладающей следующим свойством: Для каждого $f \in \mathfrak{D}(G)$ существует точно одно решение задачи Дирихле F такое, что $F \in \mathfrak{M}$; имеем $F = D(f)$.

Summary

THE DIRICHLET PROBLEM

JAN MAŘÍK, Praha.

(Received May 23, 1956.)

Let G be an open subset of the m -dimensional Euclidean space E_m , $\emptyset \neq G \neq E_m$; let f be a (finite real) continuous function on $H(G)$. ($H(G)$ is the boundary, \overline{G} is the closure of G .) If a function F is continuous on \overline{G} , harmonic on G and equal to f on $H(G)$, we say that F is a solution of the Dirichlet problem corresponding to the function f and the set G . If G is bounded, then there

*) Если, напр., $m = 2$ и если A — сегмент, то множество $U = E_2 - A$ удовлетворяет всем предположениям.

exists at most one such function F . Let \mathfrak{g} be the system of all non-empty bounded open sets $G \subset E_m$ such that for each continuous function on $H(G)$ there exists a solution of the Dirichlet problem; further, let $\mathfrak{G}^m = \mathfrak{G}$ be the system of all $G \subset E_m$ ($G \neq E_m$) such that $G \cap K \in \mathfrak{g}$ for each sufficiently large open sphere K with center 0. If $G \in \mathfrak{G}$, let $\mathfrak{D}(G)$ be the family of all functions f which are continuous on $H(G)$ and which have the following property: There exists a non-negative function F , which is continuous on \bar{G} , harmonic on G and which fulfils the relation $F(x) \geq |f(x)|$ for each $x \in H(G)$. The following assertion is an easy consequence of Theorem 13:

For each non-negative function $f \in \mathfrak{D}(G)$ ($G \in \mathfrak{G}$) there exists a smallest non-negative solution of the Dirichlet problem.

We denote this solution by $D(G, f)$ and for an arbitrary $f \in \mathfrak{D}(G)$ put $D(G, f) = D(f) = D(f_+) - D(f_-)$, where $f_+(x) = \max(f(x), 0)$, $f_-(x) = \max(-f(x), 0)$. The function $D(f)$ is evidently a solution of the corresponding Dirichlet problem; the values of $D(f)$ will be denoted by $D(f, x)$. — Theorem 23 asserts:

Let G be open in E_m , $\emptyset \neq G \neq E_m$. Suppose that there exists, for each $b \in H(G)$, a hyperplane R and a closed sphere K with center in R such that $b \in R \cap K$, $R \cap K \cap G = \emptyset$. Then $G \in \mathfrak{G}$.

Now let $\mathfrak{G}_1^m = \mathfrak{G}_1$ be the system of all $G \in \mathfrak{G}$ such that $D(G, 1, x) = 1$ ($x \in G$); further put $\mathfrak{G}_0^m = \mathfrak{G}_0 = \mathfrak{G} - \mathfrak{G}_1$. In accordance with Exercise 12 we have $\mathfrak{G}_1^2 = \mathfrak{G}^2$; each bounded set $G \in \mathfrak{G}^m$ (m arbitrary) evidently belongs to \mathfrak{G}_1^m . If $m > 2$, then, according to Theorem 35, each set $G \in \mathfrak{G}^m$ with bounded complement belongs to \mathfrak{G}_0^m . — According to Sections 17–19 and 24–31, the following theorems hold:

If $G \in \mathfrak{G}_0$, then $\inf_{x \in G} D(f, x) = 0$ for each non-negative function $f \in \mathfrak{D}(G)$.

If $G \in \mathfrak{G}_1$, then there exists, for each bounded continuous function f on $H(G)$, a unique bounded solution F of the corresponding Dirichlet problem, namely $F = D(f)$.

Let φ be an isometrical mapping of E_m into E_m . If $G \in \mathfrak{G}$ (resp. $G \in \mathfrak{G}_0$), then $\varphi(G) \in \mathfrak{G}$ (resp. $\varphi(G) \in \mathfrak{G}_0$).

If $G_1 \in \mathfrak{G}_0$, $G_2 \in \mathfrak{G}$, $G_1 \subset G_2$, then $G_2 \in \mathfrak{G}_0$.

Suppose that $U \in \mathfrak{G}^m$ and that there exists, for each $b \in H(U)$, a hyperplane R and a closed sphere K with center in R such that $b \in R \cap K$, $R \cap K \cap U = \emptyset$. Then $U \times E_1 \in \mathfrak{G}^{m+1}$. If, moreover, $U \in \mathfrak{G}_1^m$, $A = E_m - U$,) $G \in \mathfrak{G}^{m+1}$, $G \cap (A \times \langle 0, \infty \rangle) = \emptyset$, then $G \in \mathfrak{G}_1^{m+1}$.*

Theorem 37 has the following intuitive sense:

Suppose that $G \in \mathfrak{G}$ and that $f \in \mathfrak{D}(G)$. Let K be a large open sphere; let g be a continuous function on $H(K \cap G)$, which vanishes on $H(K)$ and approximately

*) If, for example, $m = 2$ and if A is a segment, then the set $U = E_2 - A$ fulfils all the conditions.

equals f on $H(G)$. Then the function $D(K \cap G, g)$ is approximately equal to $D(G, f)$ on the set $\overline{K \cap G}$.

Theorem 39 asserts that $D(f)$ depends continuously on f :

If $G \in \mathfrak{G}$, $f, f_0, f_1, \dots \in \mathfrak{D}(G)$ and if $f_n(x) \rightarrow f_0(x)$, $|f_n(x)| \leq f(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) for each $x \in H(G)$, then $D(f_n, x) \rightarrow D(f_0, x)$ for each $x \in \overline{G}$.

Section 40 contains the definition of a system \mathfrak{M} , the elements of which are functions on \overline{G} ($G \in \mathfrak{G}$) and which has the following property: For each $f \in \mathfrak{D}(G)$ there exists a unique solution F of the corresponding Dirichlet problem such that $F \in \mathfrak{M}$, namely $F = D(f)$.