

# Jarník, Vojtěch: Scholarly works

---

Vojtěch Jarník

Über einen Satz von A. Khintchine, 2. Mitteilung

Acta Arith. 2 (1936), pp. 1--22

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/500755>

## Terms of use:

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

# Über einen Satz von A. Khintchine. Zweite Mitteilung<sup>1)</sup>.

Von

Vojtěch Jarník (Praha).

---

## § 1. Einleitung.

Es sei  $s$  ganz,  $s \geq 1$ ; es seien  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  reelle Zahlen<sup>2)</sup>. Dann gelten folgende wohlbekanntete Sätze, die sehr einfach mit Hilfe des Dirichletschen Fächerprinzips zu beweisen sind:

I. Es gibt unendlichviele verschiedene Systeme ganzer Zahlen  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$  mit

$$x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|) > 0, \left| \sum_{i=1}^s x_i \theta_i + x_{s+1} \right| < \frac{1}{x^s}.$$

II. Es gibt unendlichviele verschiedene Systeme ganzer Zahlen  $p_1, p_2, \dots, p_s, q$  mit

$$q > 0, \left| \theta_i - \frac{p_i}{q} \right| < \frac{1}{q^{1 + \frac{1}{s}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Wir führen nun folgende Definition ein: *Gegeben sei ein System  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  von reellen Zahlen ( $s \geq 1$ ). Dann sei*

---

<sup>1)</sup> Die erste Mitteilung ist in *Prace Matematyczno-Fizyczne* 43 (1936), S. 151–166 erschienen; die vorliegende Abhandlung ist ganz unabhängig von der 1. Mitteilung lesbar.

<sup>2)</sup> Alle Zahlen dieser Abhandlung sind reell; nur die Zahlen  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  im Beweis des Hauptsatzes für  $\beta = 0$  brauchen nicht reell zu sein.

$$\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$$

die obere Grenze derjenigen Zahlen  $\alpha$ , für welche die Ungleichungen

$$x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|) > 0, \left| \sum_{i=1}^s x_i \theta_i + x_{s+1} \right| < \frac{1}{x^{s+\alpha}}$$

unendlichviele Lösungen in ganzen Zahlen  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$  besitzen. Analog sei

$$\beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$$

die obere Grenze derjenigen Zahlen  $\alpha$ , für welche die Ungleichungen

$$q > 0, \left| \theta_i - \frac{p_i}{q} \right| < \frac{1}{q^{1+\frac{1+\alpha}{s}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

unendlichviele Lösungen in ganzen Zahlen  $p_1, p_2, \dots, p_s, q$  besitzen.

Nach den angeführten Sätzen ist stets

$$0 \leq \beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \leq \infty, \quad 0 \leq \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \leq \infty.$$

Für  $s = 1$  ist trivialerweise  $\beta_1(\theta_1) = \beta_2(\theta_1)$ ; für  $s > 1$  hat Herr A. Khintchine bewiesen<sup>3)</sup>: stets ist

$$(1) \quad \beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \geq \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s).$$

$$(2) \quad \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \geq \frac{\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)}{(s-1)\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) + s^2}.$$

In der ersten Mitteilung habe ich bewiesen, dass die Ungleichung (2) für jeden vorgeschriebenen Wert von  $\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  scharf ist; hier soll dasselbe für die Ungleichung (1) bewiesen werden. Unser Ziel ist also gegeben durch den folgenden

**Hauptsatz.** Es sei  $s$  ganz,  $s > 1$ ,  $0 \leq \beta \leq \infty$ . Dann gibt es ein System reeller Zahlen  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  mit

$$\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta.$$

Um dem Leser das Nachschlagen zu ersparen, reproduziere ich zu-

<sup>3)</sup> A. Khintchine, Über eine Klasse linearer diophantischer Approximationen, Palermo-Rendiconti 50 (1926), 170—195; vgl. insb. S. 189—195.

<sup>4)</sup> Dabei soll

$$\frac{\infty}{(s-1)\infty + s^2} = \frac{1}{s-1}$$

gesetzt werden.

nächst den einfachen Beweis von (1)<sup>5)</sup>. Es sei also  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  ein System von  $s$  ( $s > 1$ ) reellen Zahlen. Gilt eine Beziehung

$$\sum_{i=1}^s x_i \theta_i + x_{s+1} = 0$$

mit ganzen, nicht sämtlich verschwindenden Zahlen  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$ , so ist offenbar  $\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \infty$ , also (1) wahr. Sonst sei  $-s < \beta < \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$ . Ist  $c > 0$ , so gibt es ganze Zahlen  $p_1, p_2, \dots, p_s, q$  mit

$$q > c, \left| \theta_i - \frac{p_i}{q} \right| < \frac{1}{q^{1 + \frac{1+\beta}{s}}}.$$

Nach dem Dirichletschen Fächerprinzip kann man leicht schliessen, dass die Kongruenz

$$\sum_{i=1}^s p_i x_i \equiv 0 \pmod{q}$$

mindestens eine Lösung in ganzen Zahlen  $x_1, x_2, \dots, x_s$  mit

$$0 < x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|) \leq q^{\frac{1}{s}}$$

besitzt; bei geeignetem ganzen  $x_{s+1}$  ist also

$$\sum_{i=1}^s \frac{p_i}{q} x_i + x_{s+1} = 0,$$

$$(3) \quad \left| \sum_{i=1}^s x_i \theta_i + x_{s+1} \right| < \frac{s x}{q^{1 + \frac{1+\beta}{s}}} \leq \frac{s}{x^{s+\beta}}.$$

Für  $c \rightarrow \infty$  strebt die nichtverschwindende linke Seite von (3) gegen Null, also durchläuft das System  $x_1, x_2, \dots, x_s$  unendlichviele verschiedene Systeme, also ist  $\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \geq \beta$  für jedes  $\beta < \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$ , also gilt (1).

Wir wollen noch gleich zwei einfache Fälle des Hauptsatzes erledigen. Für  $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_s = 1$  ist  $\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \infty$ , also ist der Hauptsatz wahr für  $\beta = \infty$ .<sup>6)</sup>

<sup>5)</sup> Schwieriger ist der Beweis von (2). Umgekehrt, der Beweis, dass diese Ungleichungen scharf sind, scheint mir für (1) schwieriger zu sein als für (2).

<sup>6)</sup> Man kann sogar auch *linear unabhängige* Zahlen  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  mit  $\beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \infty$  (also  $\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \infty$ ) konstruieren; vgl. O. Perron, Über diophantische Approximationen, Math. Annalen 83 (1921), 77—84.

Aber auch für  $\beta = 0$  ist der Hauptsatz bereits bekannt und leicht zu beweisen; wir geben hier einen einfachen Beweis, dessen Grundgedanke einer wichtigen Abhandlung des Herrn O. Perron<sup>7)</sup> entnommen ist. Es sei  $\theta_0$  eine reelle ganze algebraische Zahl  $(s+1)$ -ten Grades;  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s$  seien die zu  $\theta_0$  konjugierten Zahlen; es sei

$$M = \text{Max}(|\theta_0|, |\theta_1|, \dots, |\theta_s|), \quad a = (3sM^s)^{-s}.$$

Sind dann  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$  ganze Zahlen mit  $0 < x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|)$ , so ist

$$(4) \quad \left| \sum_{i=1}^s x_i \theta_0^i + x_{s+1} \right| \geq \frac{a}{x^s}.$$

Denn sonst wäre

$$\left| \sum_{i=1}^s x_i \theta_0^i + x_{s+1} \right| < \frac{a}{x^s},$$

also

$$|x_{s+1}| < s x M^s + 1 < 2 s x M^s,$$

also

$$\left| \sum_{i=1}^s x_i \theta_j^i + x_{s+1} \right| < 3 s x M^s \quad \text{für } j = 1, 2, \dots, s,$$

also

$$\left| \prod_{j=0}^s \left( \sum_{i=1}^s x_i \theta_j^i + x_{s+1} \right) \right| < a (3sM^s)^s = 1;$$

das geht aber nicht, da die linke Seite eine ganze rationale Zahl ist und nicht Null sein kann. Damit ist (4) bewiesen, also ist  $\beta_1(\theta_0, \theta_0^2, \dots, \theta_0^s) = 0$ , also nach (1) auch  $\beta_2(\theta_0, \theta_0^2, \dots, \theta_0^s) = 0$ .

Es genügt uns also, den Hauptsatz für  $0 < \beta < \infty$  zu beweisen. Der Beweis wird etwa folgendermassen geführt: Die Systeme  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  werden als Punkte eines  $s$ -dimensionalen cartesischen Raumes aufgefasst. Dann wird erstens eine im Würfel  $0 < \theta_i < 1$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ ) enthaltene abgeschlossene Menge  $E$  konstruiert, so dass für jeden Punkt von  $E$  die Ungleichung

$$\beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \geq \beta$$

gilt; zweitens wird eine Menge  $E_1$  konstruiert (im folgenden wird sie mit  $P_2 + P_3 + P_4 + \dots$  bezeichnet), welche alle diejenigen Punkte des Würfels  $0 < \theta_i < 1$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ ) enthält, für welche

<sup>7)</sup> L. c. 6).

$$\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) > \beta$$

ist und schliesslich wird bewiesen, dass  $E - E_1 \neq 0$  ist d. h., dass es einen Punkt von  $E$  gibt, der  $E_1$  nicht angehört. Damit wird der Beweis fertig sein, denn für jeden Punkt aus  $E - E_1$  ist  $\beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \geq \beta \geq \beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$ , also nach (1)  $\beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta$ .

Die bei dem Beweis benutzten Hilfsmittel sind äusserst elementar; der Beweis selbst ist aber nicht ganz einfach.

## § 2. Konstruktion der Menge $E$ .

Bis zum Schluss dieser Abhandlung sind fest gegeben: eine ganze Zahl  $s > 1$  und eine Zahl  $\beta > 0$ . Mit  $k_1, k_2, k_3, k_4, k_5$  bezeichnen wir positive absolute Konstanten, mit  $c_1, c_2$  positive Zahlen, die nur von  $s$  abhängen.

Der wichtigste Punkt dieses Paragraphen ist der Hilfssatz 3, dessen Grundgedanke von Herrn A. Khintchine<sup>8)</sup> stammt; ich habe übrigens schon einmal einen verwandten Hilfssatz benutzt<sup>9)</sup>. Die Hilfssätze 1, 2 sind trivial.

**Hilfssatz 1.** *Man kann die natürlichen Zahlen  $k_1$  und  $k_2$  derart bestimmen, dass es zu jedem  $Q > k_1$  eine Primzahl  $q$  mit  $2Q < q < k_2 Q$  gibt.*

**Beweis.** Ist  $\pi_r$  die  $r$ -te Primzahl, so ist bekanntlich

$$(5) \quad k_3 r \log r < \pi_r < k_4 r \log r$$

für  $r = 2, 3, \dots$ <sup>10)</sup>. Wird

$$k_1 > k_3 \log 2, k_2 > 3 \frac{k_4 \log 3}{k_3 \log 2}$$

gewählt und ist  $Q > k_1$ , so gibt es ein ganzes  $r \geq 3$  mit

$$k_3(r-1) \log(r-1) \leq 2Q < k_3 r \log r;$$

dann gilt (5), also

$$2Q < \pi_r < k_4 r \log r \leq 2Q \frac{k_4 r \log r}{k_3(r-1) \log(r-1)} \leq k_2 Q.$$

<sup>8)</sup> A. Khintchine, Zur metrischen Theorie der diophantischen Approximationen, Math. Zeitschr 24 (1926), 706 — 714, vgl. insb. den Hilfssatz 3.

<sup>9)</sup> V. Jarník, Über die simultanen diophantischen Approximationen, Math. Zeitschr. 33 (1931), 505 — 543, Hilfssatz 3.

<sup>10)</sup> (5) lässt sich elementar beweisen; vgl. z. B. E. Landau, Vorlesungen über Zahlentheorie I (Leipzig 1927), S. 68, Satz 113; den wesentlich tiefer liegenden Primzahlsatz brauchen wir nicht.

Für ganzes  $h > 0$  sei  $\varphi(h)$  die Anzahl der zu  $h$  teilerfremden Restklassen modulo  $h$ . Ist  $\varphi(h) > \frac{h}{8}$ , so heisse die Zahl  $h$  „normal“.

**Hilfssatz 2.** *Es gibt eine ganze Zahl  $k_5 > 0$ , so dass für jedes ganze  $n \geq k_5$  sich unter den Zahlen  $n, n+1, n+2, \dots, 2n-1$  mindestens  $\frac{n}{5}$  normale Zahlen befinden.*

**Beweis.** Bekanntlich ist <sup>11)</sup>

$$\sum_{h=1}^{n-1} \varphi(h) = \frac{3}{\pi^2} n^2 + O(n \log n);$$

wegen  $\frac{1}{4} < \frac{3}{\pi^2} < \frac{1}{3}$  gibt es ein ganzes  $k_5 > 0$ , so dass für jedes ganze  $n \geq k_5$  gilt

$$(6) \quad \sum_{h=n}^{2n-1} \varphi(h) > \frac{1}{4} (2n)^2 - \frac{1}{3} n^2 = \frac{2}{3} n^2.$$

Wäre nun die Behauptung für ein ganzes  $n \geq k_5$  falsch, so wäre (wegen  $\varphi(h) \leq h$ )

$$\sum_{h=n}^{2n-1} \varphi(h) < \frac{n}{5} \cdot 2n + \frac{1}{8} \cdot 2n \cdot n = \frac{13}{20} n^2 < \frac{2}{3} n^2,$$

im Widerspruch zu (6).

**Hilfssatz 3.** *Es gibt zwei Zahlen  $c_1 > 0, c_2 > 0$  und eine nur von  $s$  und  $Q$  abhängige Zahl  $d(Q) > 0$  mit folgender Eigenschaft:*

*Ist  $Q > c_1, z > d(Q)$  und sind  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  reelle Zahlen, so gibt es im  $s$ -dimensionalen cartesischen Raume der Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  eine endliche Punktmenge*

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(s, Q, z, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

*mit folgenden Eigenschaften: ist  $N$  die Anzahl der Punkte von  $\mathfrak{M}$  und sind  $P_1, P_2, \dots, P_N$  die Punkte von  $\mathfrak{M}$ , so gilt:*

$$1. \text{ Jeder Punkt } P_n (1 \leq n \leq N) \text{ hat die Gestalt } P_n = \left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right),$$

*wo jede Zahl  $p_i (i = 1, 2, \dots, s)$  ganz und zu der ganzen Zahl  $q$  teilerfremd ist; dabei ist*

<sup>11)</sup> F. Mertens, Über einige asymptotische Gesetze der Zahlentheorie, Journ. f. d. reine u. angew. Math. 77 (1874), 289–338, insbes. S. 289–291.

$$(7) \quad z \leq q \leq k_2 z Q^{\frac{1}{s+1}}.$$

2. Konstruiert man um jeden Punkt  $P_n$  ( $n = 1, 2, \dots, N$ ) einen abgeschlossenen Würfel<sup>12)</sup> von der Kantenlänge  $z^{-\frac{s+1}{s}}$ , so sind diesen Würfel paarweise fremd und liegen alle im Würfel

$$(8) \quad \frac{\alpha_i}{Q} \leq \theta_i \leq \frac{\alpha_i + 1}{Q} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

3.

$$(9) \quad N > c_2 \frac{z^{s+1}}{Q^s}.$$

**Beweis.** Wir wählen erstens  $c_1$  so, dass

$$(10) \quad c_1 > (3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3)^{s+1} > 16, c_1 > k_1^{13}).$$

Zu jedem  $Q > c_1$  wählen wir ein  $d(Q)$ , so dass für  $z > d(Q)$  folgendes gilt:

$$(11) \quad \begin{cases} z > k_2 k_5 Q; \quad z^{\frac{1}{s}} > \frac{(k_2 Q)^{\frac{1}{s+1}}}{32 \cdot 2 \cdot 3}; \\ \frac{1}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{z}{(k_2 Q)^{\frac{s}{s+1}}} > \text{Max}(k_5, k_2 Q); \end{cases}$$

endlich setzen wir

$$(12) \quad c_2 = \left( \frac{1}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} \right)^{s+1} \cdot \frac{1}{10 k_2^s} \cdot \frac{1}{16^s}.$$

Es sei nun  $Q > c_1$ ,  $z > d(Q)$  und es seien  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  reelle Zahlen. Man wähle zunächst eine Primzahl  $q$  mit

$$(13) \quad 2Q < q < k_2 Q$$

(vgl. (10) und Hfs. 1) und man setze

$$(14) \quad b = \left[ \frac{1}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{z}{q^{\frac{s}{s+1}}} \right];$$

nach (11), (13), (14) ist ( $k_5$  ist ganzzahlig)

<sup>12)</sup> Unter einem Würfel verstehe ich stets einen  $s$ -dimensionalen Würfel, dessen Kanten den Koordinatenachsen parallel sind.

<sup>13)</sup> Der Punkt bedeutet stets das Multiplikationszeichen.

$$(15) \quad b \geq k_5 \geq 1, b+1 > k_2 Q > q, 2b+1 \leq 3b \leq \frac{1}{32 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{z}{q^{s+1}}.$$

Wegen  $\frac{q}{Q} > 2$  gibt es ganze Zahlen  $a_1, a_2, \dots, a_s$  mit

$$\alpha_i \frac{q}{Q} < a_i < a_i + 1 < (\alpha_i + 1) \frac{q}{Q},$$

also

$$(16) \quad \frac{\alpha_i}{Q} < \frac{a_i}{q} < \frac{a_i + 1}{q} < \frac{\alpha_i + 1}{Q} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Es sei nun  $\mathfrak{B}$  die Menge aller Punkte

$$(17) \quad \left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right),$$

welche folgende Eigenschaften besitzen:

1.)  $q = \bar{q}q, \bar{q}$  ganz,

$$(18) \quad b+1 \leq \bar{q} \leq 2b+1.$$

2.) Jede Zahl  $p_i (i = 1, 2, \dots, s)$  ist ganz und zu  $q$  teilerfremd.

3.)

$$(19) \quad \frac{a_i}{q} \leq \frac{p_i}{q} < \frac{a_i + 1}{q} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Da  $(p_i, q) = 1, q = \bar{q}q > q$ , so kann man statt (19) auch

$$(20) \quad \frac{a_i}{q} < \frac{p_i}{q} < \frac{a_i + 1}{q} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

schreiben<sup>14)</sup>.

Wir bemerken zuerst: aus (18), (15), (13), (11) folgt

$$(21) \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{\bar{q}q} \geq \frac{1}{(2b+1)q} \geq \frac{32 \cdot 2 \cdot 3}{z q^{s+1}} > \frac{1}{z \frac{s+1}{s}}.$$

Konstruiert man also um jeden Punkt von  $\mathfrak{B}$  als Mittelpunkt einen

<sup>14)</sup> Bis zum Schluss des Beweises des Hilfssatzes 3. machen wir folgende Verabredung: Wird ein Punkt in der Gestalt  $\left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right)$  oder  $\left( \frac{p_1'}{q'}, \frac{p_2'}{q'}, \dots, \frac{p_s'}{q'} \right)$  geschrieben, so wird dabei stillschweigend folgendes vorausgesetzt:  $q, q', p_i, p_i'$  ganz,  $(p_i, q) = (p_i', q') = 1 (i = 1, 2, \dots, s)$ ;  $q = \bar{q}q, q' = \bar{q}'q'$ ;  $\bar{q}, \bar{q}'$  ganz,  $b+1 \leq \bar{q} \leq 2b+1, b+1 \leq \bar{q}' \leq 2b+1$ .

abgeschlossenen Würfel von der Kante  $z^{-\frac{s+1}{s}}$ , so sind wegen (16), (20), (21) alle diese Würfel im Würfel (8) enthalten. Weiter folgt aus (18), (14), (15), (13), (10):

$$\begin{aligned} z < z \frac{c_1^{\frac{1}{s+1}}}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} < z \frac{1}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} < q = \\ = \bar{q} \eta &\leq \frac{z}{32 \cdot 2 \cdot 3} \eta^{\frac{1}{s+1}} < \frac{z}{32 \cdot 2 \cdot 3} (k_2 Q)^{\frac{1}{s+1}} < k_2 z Q^{\frac{1}{s+1}}. \end{aligned}$$

Um den Hilfssatz 3 zu beweisen, genügt es also, eine Teilmenge  $\mathfrak{M}$  von  $\mathfrak{B}$  zu konstruieren, welche folgende Eigenschaften besitzt:

A. Sind

$$\left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right), \left( \frac{p_1'}{q'}, \frac{p_2'}{q'}, \dots, \frac{p_s'}{q'} \right)$$

zwei verschiedene Punkte von  $\mathfrak{M}$ , so gilt mindestens eine von den  $s$  Ungleichungen

$$\left| \frac{p_i}{q} - \frac{p_i'}{q'} \right| > \frac{1}{z^{\frac{s+1}{s}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

B. Ist  $N$  die Anzahl der Punkte von  $\mathfrak{M}$ , so gilt (9).

Zu diesem Zweck definieren wir  $\mathfrak{M}$  folgendermassen:  $\mathfrak{M}$  ist eine Teilmenge von  $\mathfrak{B}$  und ein Punkt (17) gehört dann und nur dann *nicht* zu  $\mathfrak{M}$ , wenn es in  $\mathfrak{B}$  einen von (17) verschiedenen Punkt

$$(22) \quad \left( \frac{p_1'}{q'}, \frac{p_2'}{q'}, \dots, \frac{p_s'}{q'} \right)$$

gibt, so dass folgende  $s$  Ungleichungen gelten:

$$(23) \quad \left| \frac{p_i}{q} - \frac{p_i'}{q'} \right| \leq \frac{1}{z^{\frac{s+1}{s}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Dann besitzt  $\mathfrak{M}$  die Eigenschaft A und es bleibt noch zu zeigen, dass die Anzahl  $N$  der Punkte von  $\mathfrak{M}$  die Ungleichung (9) erfüllt.

Wir bemerken zunächst: sind (17), (22) zwei verschiedene Punkte aus  $\mathfrak{B}$  und gilt (23), so ist  $q \neq q'$ ; denn sonst wäre für mindestens ein  $i$  (vgl. (21))

$$\left| \frac{p_i}{q} - \frac{p_i}{q} \right| \geq \frac{1}{q} > \frac{1}{z^{\frac{s+1}{s}}};$$

also ist für jedes  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ )

$$\frac{p_i}{q} - \frac{p_i'}{q'} \neq 0,$$

denn links stehen zwei irreduzible Brüche mit verschiedenen Nennern. Wir können also in der Definition von  $\mathfrak{M}$  die Ungleichungen (23) durch die Ungleichungen

$$(24) \quad 0 < \left| \frac{p_i}{q} - \frac{p_i'}{q'} \right| \leq \frac{1}{z^{\frac{s+1}{s}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

ersetzen.

Es sei nun  $\bar{q}$  ganz,  $b+1 \leq \bar{q} \leq 2b+1$ ;  $t(\bar{q})$  sei die Anzahl derjenigen Punkte aus  $\mathfrak{B}$ , für welche die Darstellung (17) mit  $\bar{q} = q\eta$  gilt; die Anzahl derjenigen unter diesen Punkten, die *nicht* zu  $\mathfrak{M}$  gehören, werde mit  $v(\bar{q})$  bezeichnet. Nun ist nach (19)  $t(\bar{q})$  gleich der Anzahl derjenigen Systeme ganzer Zahlen  $p_1, p_2, \dots, p_s$ , welche den Beziehungen

$$(25) \quad a_i \bar{q} \leq p_i < a_i \bar{q} + \bar{q}, \quad (p_i, \bar{q}) = 1, \quad (p_i, q) = 1$$

für  $i = 1, 2, \dots, s$  genügen. Bei jedem  $i$  ist die Anzahl derjenigen  $p_i$ , für welche (25) gilt, mindestens gleich  $\varphi(\bar{q}) - \frac{\bar{q}}{16}$ ; denn die Anzahl der durch die Primzahl  $q$  teilbaren Zahlen unter  $\bar{q}$  konsekutiven ist höchstens

$$\frac{\bar{q}}{q} + 1 \leq \frac{2\bar{q}}{q} < \frac{\bar{q}}{16}$$

(denn aus (18), (14), (13), (11), (10) folgt

$$\bar{q} > \frac{1}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{z}{(k_2 Q)^{\frac{s}{s+1}}} > k_2 Q > q, \quad q > 2c_1 > 32).$$

Ist also insbesondere  $\bar{q}$  eine *normale Zahl*,  $b+1 \leq \bar{q} \leq 2b+1$ , so ist

$$(26) \quad t(\bar{q}) \geq \left( \varphi(\bar{q}) - \frac{\bar{q}}{16} \right)^s > \frac{\bar{q}^s}{16^s} \geq \frac{(b+1)^s}{16^s}.$$

Sind  $\bar{q}, \bar{q}'$  ganze Zahlen mit

$$b+1 \leq \bar{q} \leq 2b+1, \quad b+1 \leq \bar{q}' \leq 2b+1,$$

so sei  $w(\bar{q}, \bar{q}')$  die Anzahl derjenigen modulo  $\bar{q}$  verschiedenen ganzen Zahlen  $p$ , zu welchen es ein ganzes  $p'$  mit

$$(27) \quad 0 < \left| \frac{p}{q \eta} - \frac{p'}{q' \eta} \right| \leq \frac{1}{z^{\frac{s+1}{s}}}$$

gibt; dann ist (vgl. (24)) offenbar

$$(28) \quad v(\bar{q}) \leq \sum_{q'=b+1}^{2b+1} w^s(\bar{q}, \bar{q}').$$

Aus (27) folgt

$$0 < |p\bar{q}' - p'\bar{q}| \leq \frac{9b^2\eta}{z^{\frac{s+1}{s}}},$$

also

$$p\bar{q}' \equiv a \pmod{\bar{q}}, \text{ wo } 0 < |a| \leq \frac{9b^2\eta}{z^{\frac{s+1}{s}}}.$$

Dabei haben wir also, falls  $(\bar{q}, \bar{q}') = g$  gesetzt wird, für  $a$  höchstens  $\frac{18b^2\eta}{z^{\frac{s+1}{s}}}$  Möglichkeiten (denn  $a$  muss durch  $g$  teilbar sein) und bei gegebenem  $a$  hat die Kongruenz  $p\bar{q}' \equiv a \pmod{\bar{q}}$  genau eine Lösung modulo  $\frac{\bar{q}}{g}$ , also genau  $g$  Lösungen modulo  $\bar{q}$ ; daher ist

$$w(\bar{q}, \bar{q}') \leq \frac{18b^2\eta}{z^{\frac{s+1}{s}}}$$

und daher (vgl. (28), (14))

$$v(\bar{q}) \leq \frac{2^s \cdot 3^{2s} (b+1) b^{2s} \eta^s}{z^{s+1}} \leq \frac{2^s \cdot 3^{2s} (b+1) b^{s-1} z^{s+1} \eta^s}{z^{s+1} (3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3)^{s+1} \eta^s} < \frac{(b+1)^s}{3 \cdot 16^s}.$$

Daraus und aus (26) folgt: ist  $\bar{q}$  normal,  $b+1 \leq \bar{q} \leq 2b+1$ , so ist

$$(29) \quad t(\bar{q}) - v(\bar{q}) > \frac{(b+1)^s}{2 \cdot 16^s}.$$

Nach der Definition ist aber  $t(\bar{q}) - v(\bar{q})$  genau die Anzahl derjenigen Punkte aus  $\mathfrak{M}$ , welche bei der Darstellung (17) im Nenner genau

die Zahl  $q = \bar{q} \eta$  besitzen. Nach (15) ist  $b+1 > k_5$ ; nach Hilfssatz 2 gibt es also unter den Zahlen  $b+1, b+2, \dots, 2b+1$  mindestens  $\frac{1}{5}(b+1)$  normale Zahlen; also ist nach (29), (14), (13), (12)

$$N > \frac{1}{10 \cdot 16^s} (b+1)^{s+1} > \frac{1}{10 \cdot 16^s} \cdot \left( \frac{1}{3 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 3} \right)^{s+1} \cdot \frac{z^{s+1}}{(k_2 Q)^s} = c_2 \frac{z^{s+1}}{Q^s},$$

womit der Hilfssatz 3 bewiesen ist<sup>15)</sup>.

Man setze nun

$$(30) \quad G = 8s^3(s+1)^{s-1}3^{s-1}(2s+3)2^\beta \cdot \beta^{-1}$$

und wähle eine Folge

$$f < z_1 < z_2 < z_3 < \dots$$

mit folgenden Eigenschaften:

$$(31) \quad f > e^e, f > c_1, z_1 > d(f), z_{n+1} > d\left(z_n \frac{s+1+\beta}{s}\right) \quad (n=1, 2, \dots);$$

$$(32) \quad z_{n+1} > e^{z_n}, z_n^{\frac{\beta}{s}} > 2(s+1)(\log \log z_n)^{s+1+\beta} > s+1 \quad (n=1, 2, \dots);$$

$$(33) \quad z_n^{\frac{1}{2s}} > e \log \log z_n \quad (n=1, 2, \dots);$$

$$(34) \quad (\log \log z_{n+1})^{s+1} > \beta z_n^{\frac{\beta}{s}} \log z_n \quad (n=1, 2, \dots);$$

$$(35) \quad G \frac{(\log \log z_n)^\beta}{\log z_n} < \frac{c_2^{n+1}}{2^{n+1} f^s (z_1 z_2 \dots z_{n-1})^\beta} \quad (n=1, 2, \dots);$$

das ist offenbar möglich.

Wir definieren nun für jedes ganze  $n \geq 1$  Punkte, Würfel und vergrößerte Würfel  $n$ -ter Ordnung<sup>17)</sup>. Ein Würfel  $n$ -ter Ordnung (bzw. ein vergrößerter Würfel  $n$ -ter Ordnung) ist dabei ein abgeschlossener

<sup>15)</sup> Zu einem zulässigen System von Zahlen  $s, Q, z, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  kann es mehrere (aber offenbar nur endlichviele) Mengen  $\mathfrak{M}(s, Q, z, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$  mit den im Hilfssatz 3 geforderten Eigenschaften geben; man kann aber offenbar eine Vorschrift angeben, durch welche jedem solchen System  $s, Q, z, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  *eindeutig* eine solche Menge  $\mathfrak{M}(s, Q, z, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$  zugeordnet wird; ebenso lässt sich freilich auch  $c_1$  (als Funktion von  $s$ ) und  $d(Q)$  (als Funktion von  $s$  und  $Q$ ) von vornherein eindeutig feststellen.

<sup>16)</sup> Für  $n=1$  soll  $z_1 \cdot z_2 \dots z_{n-1} = 1$  gesetzt werden.

<sup>17)</sup> Wir arbeiten stets im  $s$ -dimensionalen cartesischen Raume der Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$ .

Würfel von der Kantenlänge  $z_n^{-\frac{s+1+\beta}{s}}$  (bzw.  $z_n^{-\frac{s+1}{s}}$ ), dessen Mittelpunkt ein Punkt  $n$ -ter Ordnung ist. Die Punkte (und daher auch die Würfel und die vergrößerten Würfel)  $n$ -ter Ordnung werden schliesslich folgendermassen definiert:

Man wähle eine Zahl  $a$  mit  $0 < \frac{a}{f} < \frac{a+1}{f} < 1$ ; dann gibt es wegen (31) nach dem Hilfssatz 3. (mit  $Q=f$ ,  $z=z_1$ ,  $\alpha_i=a$ ) eine Menge  $\mathfrak{M}$  von mehr als

$$c_2 \frac{z_1^{s+1}}{f^s}$$

Punkten, welche folgende Eigenschaft besitzen: Jeder Punkt von  $\mathfrak{M}$  hat die Gestalt

$$\left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right); p_1, p_2, \dots, p_s, q \text{ ganz}; z_1 \leq q \leq k_2 z_1 f^{\frac{1}{s+1}};$$

konstruiert man um jeden Punkt von  $\mathfrak{M}$  als Mittelpunkt einen abgeschlossenen Würfel von der Kante  $z_1^{-\frac{s+1}{s}}$ , so sind diese Würfel paarweise fremd und liegen sämtlich im Würfel

$$\frac{a}{f} \leq \theta_i \leq \frac{a+1}{f} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Die Punkte von  $\mathfrak{M}$  mögen die Punkte erster Ordnung sein.

Ist  $n$  ganz,  $n > 1$  und sind die Punkte (und also auch Würfel und vergrößerte Würfel)  $(n-1)$ -ter Ordnung definiert, so definiere man Punkte  $n$ -ter Ordnung folgendermassen. Es seien  $W_1, W_2, \dots, W_r$  die Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung. Zu jedem Würfel  $W_h$  ( $1 \leq h \leq r$ ) gibt es nach Hilfssatz 3 (mit  $Q=z_{n-1}^{-\frac{s+1+\beta}{s}}$ ,  $z=z_n$  und mit geeigneten  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ; vgl. (31)) eine Menge  $\mathfrak{M}_h$  von mehr als

$$c_2 \frac{z_n^{s+1}}{z_{n-1}^{s+1+\beta}}$$

Punkten, die folgende Eigenschaften haben: Jeder Punkt von  $\mathfrak{M}_h$  hat die Gestalt

$$\left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right); p_1, p_2, \dots, p_s, q \text{ ganz}; z_n \leq q \leq k_2 z_n z_{n-1}^{\frac{s+1+\beta}{s(s+1)}};$$

konstruiert man um jeden Punkt von  $\mathfrak{M}_h$  als Mittelpunkt einen abge-

geschlossenen Würfel von der Kante  $z_n^{-\frac{s+1}{s}}$ , so sind diese Würfel paarweise fremd und liegen sämtlich im Würfel  $W_h$ . Die Punkte von  $\mathfrak{M}_1 + \mathfrak{M}_2 + \dots + \mathfrak{M}_r$  mögen die Punkte  $n$ -ter Ordnung sein<sup>18)</sup>.

Damit sind also Punkte, Würfel und vergrösserte Würfel aller Ordnungen definiert. Sie haben offenbar folgende Eigenschaften:

A 1. Jeder Punkt  $n$ -ter Ordnung hat die Gestalt

$$\left( \frac{p_1}{q}, \frac{p_2}{q}, \dots, \frac{p_s}{q} \right)$$

mit ganzen  $p_1, p_2, \dots, p_s, q$ , wo

$$z_1 \leq q \leq k_2 z_1 f^{\frac{1}{s+1}}, \text{ wenn } n = 1,$$

$$z_n \leq q \leq k_2 z_n z_{n-1}^{\frac{s+1+\beta}{s(s+1)}}, \text{ wenn } n > 1.$$

A 2. Die Würfel  $n$ -ter Ordnung bzw. die vergrösserten Würfel  $n$ -ter Ordnung sind genau diejenigen abgeschlossenen Würfel von der Kantenlänge  $z_n^{-\frac{s+1+\beta}{s}}$  bzw.  $z_n^{-\frac{s+1}{s}}$ , deren Mittelpunkte Punkte  $n$ -ter Ordnung sind.

A 3. Je zwei vergrösserte Würfel derselben Ordnung sind fremd.

A 4. Jeder vergrösserte Würfel  $(n+1)$ -ter Ordnung ( $n = 1, 2, \dots$ ) liegt in genau einem Würfel  $n$ -ter Ordnung.

A 5. Alle vergrösserten Würfel aller Ordnungen liegen im offenen Würfel

$$0 < \theta_i < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

A 6. Die Anzahl aller Punkte erster Ordnung ist grösser als

$$c_2 \frac{z_1^{s+1}}{f^s} > 0.$$

A 7. In jedem Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung ( $n > 1$ ) liegen mehr als

$$c_2 \frac{z_n^{s+1}}{z_{n-1}^{s+1+\beta}} > 0$$

Punkte (also auch Würfel und vergrösserte Würfel)  $n$ -ter Ordnung.

<sup>18)</sup> Die Anwendung des Auswahlaxioms bei der Wahl von  $\mathfrak{M}_h$  ist nur scheinbar; vgl. die Fussnote<sup>15)</sup>.

Es sei  $V_n$  die Vereinigungsmenge aller Würfel  $n$ -ter Ordnung; nach A 4 ist  $V_1 \supset V_2 \supset V_3 \supset \dots$

Man setze

$$E = V_1 V_2 V_3 \dots;$$

$E$  ist abgeschlossen und liegt nach A 5 im offenen Würfel  $0 < \theta_i < 1$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ ). Weiter: in jedem Würfel  $h$ -ter Ordnung liegt nach A 7 mindestens ein Würfel  $(h+1)$ -ter Ordnung. Ist also  $W$  ein Würfel  $n$ -ter Ordnung ( $n \geq 1$ ), so ist  $W V_h \neq 0$  für  $h \geq n$ ; da die Mengen

$$W V_n \supset W V_{n+1} \supset W V_{n+2} \supset \dots$$

abgeschlossen, beschränkt und nicht leer sind, so ist auch ihr Durchschnitt

$$E W = W V_n \cdot W V_{n+1} \cdot W V_{n+2} \dots$$

nicht leer; mit anderen Worten: Jeder Würfel  $n$ -ter Ordnung ( $n \geq 1$ ) enthält mindestens einen Punkt von  $E$ .

### § 3. Beweis des Hauptsatzes für $0 < \beta < \infty$ .

Im folgenden soll stets

$$x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|)$$

gesetzt werden. Sind  $M$  und  $N$  zwei Mengen, so soll die Aussage „ $M$  schneidet  $N$ “ oder „ $M$  wird von  $N$  geschnitten“ bedeuten, dass  $MN \neq 0$ .

**Hilfssatz 4.** Es sei  $n$  ganz,  $n \geq 2$ ;  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$  ganz;

$$(36) \quad \frac{z_{n-1}^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_{n-1}} \leq x < \frac{z_n^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_n},$$

$M$  sei die Menge aller Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  mit

$$0 < \theta_i < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, s), \quad |x_1 \theta_1 + x_2 \theta_2 + \dots + x_s \theta_s + x_{s+1}| < \frac{1}{x^{s+\beta} \log x}.$$

**Behauptung:** die Menge  $M$  schneidet höchstens

$$2s(s+1)^{s-1} \frac{z_n^{s+1}}{z_{n-1}^{\frac{\beta(s-1)}{s}}} \left( \frac{1}{x^{s+1+\beta} \log x} + \frac{1}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} \right)$$

Würfel  $n$ -ter Ordnung.

**Beweis.** Man wähle zunächst ein ganzes  $j$  ( $1 \leq j \leq s$ ) mit  $x_j = x^{19}$ .

<sup>19)</sup> Man kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit  $x_j > 0$  voraussetzen; sonst ändere man das Vorzeichen von  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$ .

Wir zeigen zuerst, dass die Menge  $M$  höchstens

$$(37) \quad (s+1)^{s-1} z_{n-1}^{\frac{(s+1)(s-1)}{s}}$$

Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung schneidet.

Es sei  $P = (y_1, y_2, \dots, y_s)$  ein Punkt  $(n-1)$ -ter Ordnung.  $W$  bzw.  $W'$  der ihn enthaltende Würfel bzw. vergrößerte Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung. Ist  $MW \neq 0$ , so gibt es einen Punkt  $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s)$  von  $M$  mit

$$(38) \quad \begin{aligned} |\xi_i - y_i| &\leq \frac{1}{2 z_{n-1}^{\frac{s}{s+1+\beta}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s), \\ |x_1 \xi_1 + \dots + x_s \xi_s + x_{s+1}| &< \frac{1}{x^{s+\beta} \log x}. \end{aligned}$$

Wegen (32) ist dann auch

$$(39) \quad |\xi_i - y_i| < \frac{1}{2(s+1) z_{n-1}^{\frac{s}{s+1}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Man setze  $\lambda_i = \xi_i$  für  $1 \leq i \leq s$ ,  $i \neq j$  und wähle  $\lambda_j$  so, dass

$$(40) \quad x_1 \lambda_1 + \dots + x_s \lambda_s + x_{s+1} = 0.$$

Dann ist nach (38) und wegen  $x_j = x$

$$|\lambda_j - \xi_j| < \frac{1}{x^{s+1+\beta} \log x};$$

nach (36), (33) ist  $x > e$ , also ist nach (36), (32)

$$\frac{1}{x^{s+1+\beta} \log x} < \frac{1}{x^{s+1+\beta}} \leq \frac{(\log \log z_{n-1})^{s+1+\beta}}{z_{n-1}^{\frac{s}{s+1+\beta}}} < \frac{1}{2(s+1) z_{n-1}^{\frac{s}{s+1}}};$$

also ist

$$(41) \quad |\lambda_i - y_i| < \frac{1}{(s+1) z_{n-1}^{\frac{s}{s+1}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

Es sei  $A$  die Menge aller Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  mit

$$(42) \quad x_1 \theta_1 + \dots + x_s \theta_s + x_{s+1} = 0,$$

$$(43) \quad |\theta_i - \lambda_i| < \frac{1}{2(s+1) z_{n-1}^{\frac{s}{s+1}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s, i \neq j).$$

Ist  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  ein Punkt von  $A$ , so ist nach (40), (42), (43) und wegen  $x_j = x$

$$|\theta_j - \lambda_j| < \frac{s-1}{2(s+1)z_{n-1}^{\frac{s+1}{s}}},$$

also wegen (41), (43)

$$|\theta_i - y_i| < \frac{1}{2z_{n-1}^{\frac{s+1}{s}}}, \quad (i = 1, 2, \dots, s),$$

also ist  $A \subset W'$ . Es sei  $B$  die Menge aller Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  mit

$$0 < \theta_i < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, s), \quad x_1 \theta_1 + \dots + x_s \theta_s + x_{s+1} = 0;$$

dann ist (man beachte, dass  $W'$  im Würfel  $0 < \theta_i < 1$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ ) liegt)

$$A \subset B W'.$$

Nun hat aber die Projektion von  $A$  auf die Hyperebene  $\theta_j = 0$  das  $(s-1)$ -dimensionale Volumen

$$(44) \quad \frac{1}{(s+1)(s-1)^s};$$

wird also  $W$  von  $M$  geschnitten, so hat die Projektion von  $B W'$  ein  $(s-1)$ -dimensionales Volumen, welches mindestens dem Ausdruck (44) gleich ist. Nun sind aber je zwei vergrößerte Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung fremd und verschiedene Punkte von  $B$  haben auch verschiedene Projektionen; endlich ist das  $(s-1)$ -dimensionale Volumen der Projektion von  $B$  höchstens gleich Eins. Daher ist die Anzahl der von  $M$  geschnittenen Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung höchstens gleich dem reziproken Wert von (44), d. h. höchstens gleich (37).

Es sei nun  $Q = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s)$  ein Punkt  $n$ -ter Ordnung,  $U$  bzw.  $U'$  der ihn enthaltende Würfel bzw. vergrößerte Würfel  $n$ -ter Ordnung; es sei  $M U \neq 0$ . Dann gibt es also einen Punkt  $(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_s)$  von  $M$  mit

$$|\nu_i - \mu_i| \leq \frac{1}{2z_n^{\frac{s+1+\beta}{s}}}, \quad |x_1 \nu_1 + \dots + x_s \nu_s + x_{s+1}| < \frac{1}{x^{s+\beta} \log x}.$$

Ist nun  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  ein Punkt aus  $U'$ , so ist

$$|\theta_i - \mu_i| \leq \frac{1}{2z_n^{\frac{s+1}{s}}}, \quad (i = 1, 2, \dots, s),$$

also

$$|\theta_i - \nu_i| < \frac{1}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} \quad (i = 1, 2, \dots, s),$$

also

$$(45) \quad |x_1 \theta_1 + \dots + x_s \theta_s + x_{s+1}| < \frac{1}{x^{s+\beta} \log x} + \frac{s x}{z_n^{\frac{s+1}{s}}}.$$

Also: Es sei  $N$  die Menge aller Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  mit (45); ist  $U$  ein Würfel  $n$ -ter Ordnung, ist  $U'$  derjenige vergrößerte Würfel  $n$ -ter Ordnung, welcher  $U$  enthält und ist  $MU \neq 0$ , so ist  $U' \subset N$ .

Es sei nun  $W$  ein Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung; die Anzahl  $\rho$  der in  $W$  liegenden und von  $M$  (also von  $MW$ ) geschnittenen Würfel  $n$ -ter Ordnung ist nach dem eben bewiesenen höchstens gleich der Anzahl der in  $W$  liegenden und in  $N$  (also in  $NW$ ) enthaltenen vergrößerten Würfel  $n$ -ter Ordnung. Nun ist aber das Volumen eines vergrößerten Würfels  $n$ -ter Ordnung gleich  $z_n^{-s-1}$ ; dagegen ist das Volumen von  $WN$  höchstens gleich

$$\frac{1}{z_{n-1}^{\frac{(s+1+\beta)(s-1)}{s}}} \left( \frac{2}{x^{s+1+\beta} \log x} + \frac{2s}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} \right)^{20);$$

daher ist

$$\rho \leq \frac{2s z_n^{s+1}}{z_{n-1}^{\frac{(s+1+\beta)(s-1)}{s}}} \left( \frac{1}{x^{s+1+\beta} \log x} + \frac{1}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} \right).$$

Da aber die Anzahl der von  $M$  geschnittenen Würfel  $(n-1)$ -ter Ordnung höchstens gleich dem Ausdruck (37), ist, so ist Hilfssatz 4. bewiesen.

Sind  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$  ganze Zahlen mit  $x > 0$ , so werde die Menge aller Punkte  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$ , welche den Bedingungen

$$(46) \quad 0 < \theta_i < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, s), \quad |x_1 \theta_1 + x_2 \theta_2 + \dots + x_s \theta_s + x_{s+1}| < \frac{1}{x^{s+\beta} \log x}$$

<sup>20)</sup> Denn jedes  $\theta_i$  ( $i = 1, 2, \dots, s, i \neq j$ ) durchläuft höchstens ein Intervall von der Länge  $z_{n-1}^{-\frac{s+1+\beta}{s}}$ ; bei gegebenen  $\theta_i$  ( $i = 1, 2, \dots, s, i \neq j$ ) durchläuft aber  $\theta_j$  (wegen (45) und wegen  $x_j = x$ ) höchstens ein Intervall von der Länge

$$\frac{2}{x^{s+1+\beta} \log x} + \frac{2s}{z_n^{\frac{s+1}{s}}}.$$

genügen, mit  $M(x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1})$  bezeichnet. Ist  $n$  ganz,  $n \geq 2$ , so be-  
deute  $P_n$  die Vereinigungsmenge aller Mengen  $M(x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1})$ ,  
welche der Bedingung

$$(47) \quad \frac{z_{n-1}^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_{n-1}} \leq x < \frac{z_n^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_n}$$

genügen.

**Hilfssatz 5.** *Es sei  $n$  ganz,  $n \geq 2$ ;  $\tau_n$  sei die Anzahl der von der  
Menge  $P_n$  geschnittenen Würfel  $n$ -ter Ordnung. Dann ist*

$$\tau_n \leq G \frac{z_n^{s+1}}{z_{n-1}^\beta} \frac{(\log \log z_{n-1})^\beta}{\log z_{n-1}},$$

wo  $G$  durch (30) definiert ist.

**Beweis.** Für ganzes  $m > 0$  sei

$$v_m = \frac{z_m^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_m};$$

nach (33) ist

$$(48) \quad v_{n-1} > e > 2, \quad v_{n-1} > z_{n-1}^{\frac{1}{2s}}.$$

Ist eine ganze Zahl  $j$  mit  $1 \leq j \leq s$  und eine ganze Zahl  $x$  mit (47),  
d. h. mit  $v_{n-1} \leq x < v_n$  gegeben, so ist die Anzahl aller nichtleeren  
Mengen  $M(x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1})$  mit

$$x_j = x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|)$$

höchstens gleich

$$(2x + 1)^{s-1} (2sx + 3) \leq 3^{s-1} (2s + 3) x^s$$

(denn für  $i \neq j$ ,  $1 \leq i \leq s$  soll  $|x_i| \leq x$  sein und wegen (46), (48) soll

$$|x_{s+1}| < |x_1| + |x_2| + \dots + |x_s| + \frac{1}{x^{s+\beta} \log x} < sx + 1$$

sein). Daher ist nach Hilfssatz 4<sup>21)</sup>

$$\begin{aligned} \tau_n &\leq s \cdot 3^{s-1} (2s + 3) \cdot 2s \cdot (s + 1)^{s-1} \frac{z_n^{s+1}}{z_{n-1}^{\frac{\beta(s-1)}{s}}} \sum_{v_{n-1} \leq x < v_n} \left( \frac{1}{x^{s+\beta} \log x} + \frac{x^s}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} \right) \\ &\leq s^2 \cdot 3^{s-1} \cdot 2 \cdot (2s + 3) \cdot (s + 1)^{s-1} \frac{z_n^{s+1}}{z_{n-1}^{\frac{\beta(s-1)}{s}}} \left( \frac{1}{\beta (v_{n-1} - 1)^\beta \log v_{n-1}} + \frac{v_n^{s+1}}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} \right). \end{aligned}$$

<sup>21)</sup> Vgl. die Fussnote 19).

Nach (48) ist  $v_{n-1} - 1 > \frac{1}{2} v_{n-1}$ , also nach (48)

$$\frac{1}{\beta (v_{n-1} - 1)^\beta \log v_{n-1}} < \frac{2^\beta \cdot 2s (\log \log z_{n-1})^\beta}{\beta z_{n-1}^{\frac{\beta}{s}} \cdot \log z_{n-1}};$$

nach (34) ist

$$\frac{v_n^{s+1}}{z_n^{\frac{s+1}{s}}} = \frac{1}{(\log \log z_n)^{s+1}} < \frac{2^\beta \cdot 2s (\log \log z_{n-1})^\beta}{\beta z_{n-1}^{\frac{\beta}{s}} \cdot \log z_{n-1}}$$

(denn der Zähler rechts ist  $> 1$  wegen (31)).

Daher ist

$$\tau_n \leq \frac{8s^3 \cdot 3^{s-1} \cdot (2s+3) \cdot (s+1)^{s-1} \cdot 2^\beta \cdot z_n^{s+1}}{\beta} \cdot \frac{(\log \log z_{n-1})^\beta}{z_{n-1}^\beta \cdot \log z_{n-1}},$$

womit wegen (30) der Hilfssatz 5. bewiesen ist.

**Hilfssatz 6.** *Es sei  $n$  ganz,  $n \geq 1$ ;  $\Gamma_n$  sei die Anzahl der von der Menge  $P_2 + P_3 + \dots + P_n$  nicht geschnittenen Würfel  $n$ -ter Ordnung (für  $n=1$  soll  $P_2 + P_3 + \dots + P_n$  die leere Menge bedeuten).*

*Dann ist*

$$(49) \quad \Gamma_n \geq \frac{c_2^n z_n^{s+1}}{2^n (z_1 \cdot z_2 \dots z_{n-1})^\beta f}$$

(für  $n=1$  soll  $z_1 \cdot z_2 \dots z_{n-1} = 1$  gesetzt werden), also insbesondere  $\Gamma_n > 0$ .

**Beweis.** (49) ist wahr für  $n=1$ ; denn  $\Gamma_1$  ist gleich der Anzahl aller Würfel erster Ordnung; nach A 6 (vgl. den Schluss des § 2) ist also

$$\Gamma_1 > \frac{c_2 z_1^{s+1}}{f^s}.$$

Es sei nun  $n$  ganz,  $n \geq 1$  und (49) wahr. Nach A 7, A 4 und dem Hilfssatz 5 ist dann

$$\begin{aligned} \Gamma_{n+1} &\geq \Gamma_n \cdot c_2 \frac{z_{n+1}^{s+1}}{z_n^{s+1+\beta}} - \tau_{n+1} \\ &\geq \frac{c_2^{n+1} z_{n+1}^{s+1}}{2^n (z_1 \cdot z_2 \dots z_n)^\beta f^s} - G \frac{z_{n+1}^{s+1} (\log \log z_n)^\beta}{z_n^\beta \log z_n}; \end{aligned}$$

nach (35) folgt daraus

$$\Gamma_{n+1} \geq \frac{c_2^{n+1} z_{n+1}^{s+1}}{2^{n+1} (z_1 \cdot z_2 \dots z_n)^\beta f^s},$$

womit der Hilfssatz 6. bewiesen ist.

**Beweis des Hauptsatzes für  $0 < \beta < \infty$ .**

Ich behaupte erstens:

$$(50) \quad E - \sum_{n=2}^{\infty} P_n \neq 0$$

( $E$  ist am Schluss des § 2,  $P_n$  vor dem Wortlaut des Hilfssatzes 5. definiert).  $E$  ist nämlich beschränkt und abgeschlossen,  $P_n$  ist offen. Wäre

$$(51) \quad E \subset \sum_{n=2}^{\infty} P_n,$$

so gäbe es nach dem Borelschen Überdeckungssatz eine ganze Zahl  $m \geq 2$  mit

$$E \subset \sum_{n=2}^m P_n.$$

Da aber jeder Würfel  $m$ -ter Ordnung mindestens einen Punkt von  $E$  enthält, so müsste die Menge  $\sum_{n=2}^m P_n$  jeden Würfel  $m$ -ter Ordnung schneiden, also wäre  $\Gamma_m = 0$  im Widerspruch gegen den Hilfssatz 6. Also gilt nicht (51), also gilt (50).

Es sei nun  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  ein Punkt, der in  $E - \sum_{n=2}^{\infty} P_n$  liegt; es gibt einen solchen Punkt. Sind  $x_1, x_2, \dots, x_s, x_{s+1}$  ganze Zahlen mit

$$x = \text{Max}(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_s|) \geq \frac{z_1^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_1},$$

so gibt es — wegen  $z_n^{\frac{1}{s}} (\log \log z_n)^{-1} \rightarrow \infty$  — eine ganze Zahl  $n \geq 2$  mit

$$\frac{z_{n-1}^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_{n-1}} \leq x < \frac{z_{n-1}^{\frac{1}{s}}}{\log \log z_n}.$$

Da  $0 < \theta_i < 1$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ ) und da der Punkt  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  nicht in  $P_n$  liegt, ist

$$|x_1 \theta_1 + x_2 \theta_2 + \dots + x_s \theta_s + x_{s+1}| \geq \frac{1}{x^{s+\beta} \log x}.$$

also

$$(52) \quad \beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \leq \beta.$$

Andererseits: ist  $n$  ganz,  $n \geq 2$ , so liegt  $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s)$  in einem Würfel  $n$ -ter Ordnung. Nach A 1, A 2 gibt es also ganze Zahlen  $p_1, p_2, \dots, p_s, q$  mit

$$(53) \quad \left| \theta_i - \frac{p_i}{q} \right| \leq \frac{1}{2 z_n \frac{s+1+\beta}{s}} \quad (i = 1, 2, \dots, s), \quad z_n \leq q \leq k_2 z_n z_{n-1}^{\frac{s+1+\beta}{s(s+1)}}.$$

Wird also  $\frac{s+1+\beta}{s(s+1)} = \sigma$  gesetzt, so ist nach (32), (53)

$$z_n \leq q \leq k_2 z_n (\log z_n)^\sigma \leq k_2 z_n (\log q)^\sigma.$$

also

$$\left| \theta_i - \frac{p_i}{q} \right| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{k_2 (\log q)^\sigma}{q} \right)^{\frac{s+1+\beta}{s}} \quad (i = 1, 2, \dots, s),$$

also

$$(54) \quad \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) \geq \beta.$$

Nach (1), (52), (54) ist aber

$$\beta_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_s) = \beta.$$

w. z. b. w.

Praha, den 24. September 1935. <sup>22)</sup>

(Eingegangen am 4. Oktober 1935.)

---

<sup>22)</sup> Zusatz bei der Korrektur: Herr Mahler wird demnächst einen sehr einfachen Beweis von (2) veröffentlichen.